

第一单元

1. 以下各项中不适合采取第一级预防的是

- A. 职业病
- B. 糖尿病
- C. 心血管疾病
- D. 病因不明的疾病
- E. 脑卒中

【答案】E

近似考题:《2015 年临床执业医师资格考试历年真题解析及拓展》P332 第 4 题

2. 医学道德评价的首要标准是:是否有利于

- A. 患者疾病的缓解和康复
- B. 医疗机构的发展
- C. 人类生存和环境保护及改善
- D. 医学科学发展和社会进步
- E. 医务人员社会地位的提升

【答案】A

【解析】医学道德评价的标准是:①是否有利于患者疾病的缓解和康复;②是否有利于人类生存和环境的保护和改善;③是否有利于优生和人群的健康长寿;④是否有利于医学科学的发展和社会的进步。其中,“是否有利于患者疾病的缓解和康复”是首要、至上标准。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P569——医学道德评价的标准

3. 下列关于某食物中毒的发病特点叙述正确的是

- A. 人与人之间有传染性
- B. 发病曲线
- C. 发病与某种食物有关
- D. 潜伏期较长
- E. 临床症状完全不同

【答案】C

【解析】食物中毒的发病潜伏期短,发病与特定食物有关,临床表现基本相似,无传染性。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P502——食物中毒

近似考题:《2015 年临床执业医师资格考试历年真题解析及拓展》P345 第 27 题

4. 依据个体的心理和行为是否符合其社会生活环境与行为规范来判断心理是否健康的研究角度属于

- A. 认知学角度
- B. 经验学角度
- C. 文化学角度
- D. 生理学角度
- E. 行为学角度

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P524——心理健康的研究角度

5. 下列属于自身免疫反应直接引起组织损伤的机制是

- A. 表位扩展
- B. 隐蔽抗原的释放
- C. T 细胞杀伤
- D. 自身抗原的改变
- E. 分子模拟

【答案】D

【解析】自身免疫性疾病实际上是由自身抗体,自身反应性 T 淋巴细胞或二者共同引起的针对自身抗原的超敏反应性疾病。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P257——自身免疫的组织损伤机制

6. 与胃 MALT 淋巴瘤发病相关的病原体是

- A. HBV
- B. Hp
- C. CMV
- D. EBV
- E. HIV

【答案】B

【解析】幽门螺杆菌抗原的存在与胃黏膜相关性淋巴组织结外边缘区淋巴瘤(胃 MALT 淋巴瘤)发病有密切关系,抗幽门螺杆菌治疗可改善其病情,幽门螺杆菌可能是该淋巴瘤的病因。

7. 不属于青霉素 G 不良反应的是

- A. 荨麻疹
- B. 赫氏反应
- C. 听力减退
- D. 过敏性休克
- E. 用药局部红肿

【答案】C

【解析】青霉素的不良反应有变态反应、赫氏反应、其他不良反应。其中变态反应在各种药物中占首位,以皮肤过敏(荨麻疹、药疹等)和血清病样反应较多见,最严重的是过敏性休克。其他不良反应有局部疼痛、红肿或硬结、水电解质紊乱等。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P432——青霉素的不良反应

8. 有权同时对具有完全民事行为能力且意识清醒的患者施行特殊治疗的人员是

- A. 医院伦理委员会主任
- B. 患者本人
- C. 院长
- D. 科主任
- E. 经治医生

【答案】E

9. 患者在患病后变得以自我为中心、兴趣狭窄、依赖性增强,并过分关注自己的机体功

能,这种心理反应属于

- | | |
|--------|--------|
| A.猜疑加重 | B.行为退化 |
| C.感情淡漠 | D.焦虑增强 |
| E.情绪低落 | |

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P527——心理社会因素与心身疾病的发生

10.已获得的知识、技能和方法对解决新问题会产生影响的心理现象称为

- | | |
|------|--------|
| A.暗示 | B.功能固着 |
| C.保持 | D.迁移 |
| E.创造 | |

【答案】D

11.在活体的心脏或血管内,血液发生凝固或血液中某些有形成分互相聚集形成的固体质块是

- | | |
|------|------|
| A.血栓 | B.栓塞 |
| C.淤血 | D.栓子 |
| E.凝血 | |

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P286——血栓的形成

近似考题:《2015 年临床执业医师资格考试历年真题解析及拓展》P388 第 2 题

12.医学心理学的基本观点不包括

- | | |
|-----------|--------------|
| A.心身统一的观点 | B.主动适应与调节的观点 |
| C.认知评价的观点 | D.情绪影响的观点 |
| E.道德约束的观点 | |

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P514——医学心理学的基本观点

近似考题:《2015 年临床执业医师资格考试历年真题及拓展》P311 第 34 题

13.维系 DNA 双链间碱基配对的化学键是

- | | |
|-------|---------|
| A.氢键 | B.磷酸二酯键 |
| C.肽键 | D.疏水键 |
| E.糖苷键 | |

【答案】A

【解析】DNA 双链间形成氢键,使两条链的碱基相互配对,从而起到稳定螺旋的作用。故维系 DNA 双链间碱基配对的化学键是氢键。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P8—DNA 的结构与功能

14. 基础代谢率低于正常范围的疾患是

- | | |
|-----------|----------|
| A. 白血病 | B. 库欣综合征 |
| C. 垂体性肥胖症 | D. 中暑 |
| E. 糖尿病 | |

【答案】C

【解析】基础代谢率明显降低见于甲减、艾迪生病、肾病综合征、垂体性肥胖症、病理性饥饿。基础代谢率明显升高见于甲亢、糖尿病、红细胞增多症、白血病、伴有呼吸困难的心脏病、发热。

近似考题:《2015 年临床执业医师资格考试历年真题解析及拓展》P373 第 2 题

15. 葡萄球菌感染灶内浸润的主要炎症细胞是

- | | |
|-----------|----------|
| A. 单核细胞 | B. 中性粒细胞 |
| C. 嗜酸性粒细胞 | D. 淋巴细胞 |
| E. 嗜碱性粒细胞 | |

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P293——炎症细胞的种类和主要功能

16. 医患沟通中的非语言沟通形式不包括

- | | |
|---------|---------|
| A. 面部表情 | B. 人际距离 |
| C. 引导话题 | D. 身段姿态 |
| E. 目光接触 | |

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P538——医患交往的两种形式

17. 大肠癌最好发的部位是

- | | |
|---------|--------|
| A. 升结肠 | B. 直肠 |
| C. 乙状结肠 | D. 横结肠 |
| E. 降结肠 | |

【答案】B

【解析】大肠癌以直肠最多见,乙状结肠次之,大肠腺瘤和溃疡性结肠炎为主要的结肠癌癌前病变。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P322——大肠癌的病理类型和病理变化

18. 属于《疫苗流通和预防接种管理条例》规定的预防接种异常反应情形是

- A. 心理因素发生的群体心因性反应
- B. 实施规范接种后造成受种者的损害
- C. 与受种者疾病偶合出现的损伤
- D. 疫苗质量不合格给受种者造成的损害
- E. 接种医生违反接种程序造成的损害

【答案】B

【解析】预防接种异常反应,是指合格的疫苗在实施规范接种过程中或者实施规范接种后造成受种者机体组织器官、功能损害,相关各方均无过错的药品不良反应。

下列情形不属于预防接种异常反应:因疫苗质量不合格给受种者造成的损害;因接种单位违反预防接种工作规范、免疫程序、疫苗使用指导原则、接种方案给受种者造成的损害;受种者在接种时正处于某种疾病的潜伏期或者前驱期,接种后偶合发病;因心理因素发生的个体或者群体的心因性反应。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P654——预防接种异常反应的处理

命中考题:《2015 年临床执业医师资格考试历年真题解析及拓展》P366 第 4 题

19. 医生与患者的交谈原则应具有

- A. 隐蔽性
- B. 情绪性
- C. 广泛性
- D. 指令性
- E. 针对性

【答案】E

20. 孕期出现巨幼细胞性贫血主要是由于缺乏

- A. 维生素 B₁₂
- B. 泛酸
- C. 叶酸
- D. 蛋白质
- E. 铁

【答案】C

21. 执业医师的权利是

- A. 依法参与所在机构的民主管理
- B. 宣传卫生保健知识
- C. 保护患者隐私
- D. 努力钻研业务
- E. 遵守技术操作规范

【答案】A

【解析】执业医师的权利,共七项:①按本人注册的执业范围内诊查、调查、处置,选择合理方案,出具医学证明;②相应的基本工作条件权;③开展研究,参加学术交流,参加学术交流、学术团体权;④参加培训与继续教育权;⑤执业活动中,人格尊严、人身安全受到保护权;⑥获得工资、津贴、福利待遇权;⑦提出意见建议权及参与民主管理权。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P576——医师的权利

命中考题:《2015 年临床执业医师资格考试历年真题解析及拓展》P359 第 12 题

22. 与肿瘤免疫逃逸无关的因素是

- A. 肿瘤细胞缺乏少共刺激信号
B. 肿瘤细胞分泌抑制性细胞因子
C. 肿瘤细胞 MHC 分子表达下调
D. 不能诱导有效抗体应答
E. 肿瘤相关抗原免疫原性弱

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P264——与肿瘤细胞有关的因素

23. 可释放组胺引起哮喘反应的白细胞是

- A. 单核细胞
B. 嗜酸性粒细胞
C. 中性粒细胞
D. 淋巴细胞
E. 嗜碱性粒细胞

【答案】E

24. 由于医务人员医疗水平对患者安全威胁的因素属于

- A. 医院服务因素
B. 医院专业因素
C. 医院管理因素
D. 医院社会因素
E. 医院环境因素

【答案】B

25. 医学上主要用于空气灭菌的电磁辐射是

- A. 紫外线
B. 红外线
C. γ 射线
D. 可视线
E. 微波辐射

【答案】A

26. 苯急性中毒作用主要影响

- A. 造血系统
B. 消化系统
C. 中枢神经系统
D. 呼吸系统
E. 内分泌系统

【答案】C

命中考题:《2015 年临床执业医师资格考试历年真题解析及拓展》P344 第 17 题

27. 不属于糖皮质激素类药物抗休克作用的是

- A. 增强心肌收缩力
B. 抑制炎症细胞因子释放
C. 中和细菌外毒素
D. 扩张痉挛收缩的血管
E. 稳定溶酶体膜

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P424——抗休克

28. 每张中成药处方可以开具的药品种类最多的是

- A.5 种
 C.3 种
 E.2 种
- B.7 种
 D.6 种

【答案】A

命中考题:《2015 年临床执业医师资格考试历年真题解析及拓展》P365 第 11 题

29.可承载生物遗传信息的分子结构是

- A.多不饱和脂肪酸的双键位置
 C.脂蛋白的脂质组成
 E.胆固醇的侧链碳原子
- B.氨基酸的侧链基团
 D.核酸的核苷酸序列

【答案】D

【解析】DNA 的一级结构是核酸中核苷酸的排列顺序,而遗传信息记录在碱基排列顺序里面。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P8——DNA 的结构与功能

30.普萘洛尔与硝酸酯类合用治疗心绞痛的协同作用是

- A.减低心肌耗氧量
 C.增加心室容积
 E.松弛血管平滑肌
- B.保护缺血心肌细胞
 D.加强心肌收缩力

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P403——抗心绞痛药

31.医疗保险基金主要由雇主和雇员按一定比例缴纳,政府适当补贴。这种模式属于

- A.商业医疗保险
 C.储蓄医疗保险
 E.社会医疗保险
- B.补充医疗保险
 D.国家医疗保险

【答案】E

【解析】社会医疗保险是国家通过立法形式强制实施,由雇主和个人按一定比例缴纳保险费,建立社会医疗保险基金,支付雇员医疗费的一种医疗保险制度。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》第 509 页——医疗保险(主要医疗保险模式)

32.患者感染病原微生物后,血清中最早出现的特异性免疫球蛋白是

- A.IgM
 C.IgG
 E.IgE
- B.IgD
 D.IgA

【答案】A

【解析】IgM 是初次体液免疫应答中最早出现的抗体,是机体抗感染的“先头部队”;血清中检出 IgM,提示新近发生感染,可用于感染的早期诊断。故选 A。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P222——IgM 的特性和功能

33.不符合我国人类精子库管理伦理原则要求的是

- A.捐精者有权随时停止捐精
- B.捐精行为应完全自愿
- C.捐精者有权知道捐精的用途
- D.禁止同一捐精者的精子使 5 名以上妇女受孕
- E.捐精者应与精子库的医务人员保持互盲

【答案】E

【解析】供精者对所供精液的用途、权利和义务完全知情并签订供精知情同意书,供精者和实施人类辅助生殖技术的医务人员应保持互盲。

34.患者经抗肿瘤治疗后尿检发现大量葡萄糖和氨基酸,推测其肾单位受损部位是

- A.近端小管
- B.肾小球
- C.集合管
- D.髓袢升支粗段
- E.远端小管

【答案】A

【解析】近球小管是大部分物质的主要重吸收部位,滤过液中约 67% Na^+ 、 Cl^- 、 K^+ 和水被重吸收,还有 85% 的 HCO_3^- 以及全部的葡萄糖、氨基酸都在此被重吸收。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P105——近端小管

35.流行病学中与发病相关的常用指标除了发病率外还包括

- A.死亡率、续发率
- B.死亡率、流行率
- C.死亡率、病死率
- D.病死率、流行率
- E.罹患率、患病率

【答案】E

【解析】患病率是反映人群中现患病频度的指标。罹患率的指标和发病率一样,也是人群新病例数的指标。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P468——疾病分布的常用测量指标

36.最容易刺激机体产生抗体的物质是

- A.寡糖
- B.蛋白质
- C.单糖
- D.核苷酸
- E.脂类

【答案】B

【解析】蛋白质的分子量很大,一般在一万以上。分子量越大,表面的抗原决定簇就越多,化学结构也较稳定;不易被机体破坏或排除,在体内停留时间也较长,有充分的机会与产生抗体的细胞接触,刺激机体产生免疫反应。相反,小分子物质很容易被排泄掉,与产生抗体的细胞的接触机会也少。

37.与获得性免疫缺陷发生无关的因素是

- A.病毒感染
- B.胸腺发育不全
- C.肿瘤放疗和化疗
- D.重度营养不良
- E.长期使用免疫抑制剂

【答案】B

【解析】免疫缺陷病包括原发性免疫缺陷病和获得性免疫缺陷病,原发性免疫缺陷病包括 T 细胞缺陷、B 细胞缺陷和联合免疫缺陷,获得性免疫缺陷病是由病毒、细菌感染、营养不良、肿瘤、使用免疫抑制剂、化疗、放疗等因素造成的。

38.高血压患者遵从医嘱服药的强化因素是

- A.经济条件足以支付较高的医药费
- B.在按医嘱服药后血压得到有效控制
- C.能方便地就医、取药
- D.对治疗高血压采取积极态度
- E.知晓服药能有效控制血压

【答案】B

39.发热 1 周疑似伤寒的患者,此时阳性率最高的微生物学检查方法是

- A.胆汁培养
- B.粪便培养
- C.肥达反应
- D.血培养
- E.尿液培养

【答案】D

【解析】①血培养:是诊断的依据,在病程 1~2 周阳性率最高;②骨髓培养:骨髓培养阳性率较血培养高,尤适合于已用抗生素药物治疗,血培养阴性者;③粪便培养:潜伏期即可阳性,第 3~4 周可高达 70%;④尿培养:病程后期阳性率可达 25%,但应避免粪便污染;⑤肥达反应:对伤寒有诊断价值,但可出现假阳性和假阴性反应。

40.在心理评估中,向被试者呈现一幅简单的几何图形,并要求被试者临摹,以观察其视觉空间能力,这种方法属于

- A.会谈法
- B.投射法
- C.问卷法
- D.观察法
- E.作业法

【答案】B

41.在 DNA 重组试验中使用 DNA 连接酶的目的是

- A.催化质粒与噬菌体的连接
- B.获得较小的 DNA 片段
- C.扩增特定 DNA 序列
- D.使 DNA 片段与载体结合
- E.鉴定重组 DNA 片段

【答案】D

42.用力牵拉肌肉时,肌张力突然降低的原因是

- A.肌梭抑制
- B.拮抗剂抑制

- C. 骨骼肌疲劳
E. 腱器官兴奋

D. 协同肌兴奋

【答案】E

【解析】当肌肉受到牵拉时,首先兴奋肌梭而发动牵张反射,导致受牵拉的肌肉收缩;当牵拉进一步加大时,兴奋腱器官,使牵张反射受到抑制,这样可避免牵拉的肌肉受到损伤。

43.《医疗机构从业人员行为规范》中“以人为本,践行宗旨”的具体要求不包括

- A. 积极维护社会公益,促进人类健康
B. 坚持救死扶伤,防病治病的宗旨
C. 发扬大医精诚理念
D. 以患者为中心,全心全意为人民健康服务
E. 发扬人道主义精神

【答案】A

【解析】以人为本,践行宗旨包括:坚持救死扶伤、防病治病的宗旨,发扬大医精诚理念和人道主义精神,以病人为中心,全心全意为人民健康服务。

44.可引起毒性休克综合征的细菌是

- A. 肺炎链球菌
B. 脑膜炎奈瑟菌
C. 甲型溶血性链球菌
D. 铜绿假单胞菌
E. 金黄色葡萄球菌

【答案】E

45.目前临床常用的戒烟药物包括

- A. 去甲替林
B. 可乐定
C. 阿司匹林
D. 肾上腺素
E. 尼古丁贴片

【答案】E

【解析】常用的戒烟药物有尼古丁贴片、咀嚼胶、鼻喷剂、吸入剂和舌下含片以及盐酸安非他酮。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P488——常用戒烟药物

46.医疗卫生机构发现重大食物中毒事件后,应当在规定的时限内向所在地县级卫生行政部门报告,该时限是

- A. 2 小时
B. 1 小时
C. 4 小时
D. 12 小时
E. 24 小时

【答案】A

命中考题:《2015 年临床执业医师资格考试历年真题解析及拓展》P346 第 39 题

47.将骨骼肌中生成的氨转运至肝的主要氨基酸是

- A. 亮氨酸
B. 缬氨酸

- C. 甘氨酸
E. 丙氨酸
- D. 脯氨酸

【答案】E

【解析】肌肉中的氨以无毒的丙氨酸形式运输到肝,丙氨酸脱下的氨在肝合成尿素,脱氨后形成的丙酮酸异生成葡萄糖经血液循环运回肌肉。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P33——氨的转运

48. 脂肪变性最常发生的器官是

- A. 肺
C. 肝
E. 脾
- B. 脑
D. 肾

【答案】C

【解析】脂肪变性多见于感染、酗酒、缺氧、中毒、糖尿病、肥胖及营养不良等。脂肪变性主要见于肝、心、肾、骨骼肌等实质器官。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P277——肝脂肪沉积的病因及发病机制

49. 下列乳腺癌类型中常表现为粉刺癌的是

- A. 浸润性小叶癌
C. 导管内原位癌
E. 髓样癌
- B. 浸润性导管癌
D. 小叶原位癌

【答案】C

【解析】导管内原位癌根据组织学上肿瘤有无坏死分为粉刺癌和非粉刺型导管内原位癌。粉刺癌的大体观切面可见扩张的导管内含灰黄色软膏样坏死物质,挤压时可由导管内溢出,状如皮肤粉刺。

50. 由载体介导的易化扩散发生饱和现象的机制是

- A. 跨膜浓度梯度降低
C. 跨膜电位梯度降低
E. 载体转运达极限
- B. 载体特异性较差
D. 物质转运能量不足

【答案】E

【解析】由于细胞膜中载体的数量和转运速率有限,当被转运的底物浓度增加到一定程度时,底物的扩散速度便达到最大值,不再随底物浓度的增加而增加。

51. 对涉及人的生物医学研究进行伦理审查的根本目的是

- A. 保护受试者的尊严和权利
C. 尊重研究者的基本权利
E. 维护研究机构的科研利益
- B. 保护受试者的经济利益
D. 确保医学科研的规范性

【答案】A

【解析】涉及人的伦理审查主要是保护受试者的尊严和权利。

52. 饥饿时分解代谢可产生酮体的物质是

- A. 维生素
B. 核苷酸
C. 葡萄糖
D. 氨基酸
E. 脂肪酸

【答案】E

【解析】脂肪分解主要产生酮体。

53. 以疾病发展的自然过程为基础的、综合的、一体化的保健和费用支付体系称为

- A. 健康维护计划
B. 病例管理
C. 疾病管理
D. 需求管理
E. 残疾管理

【答案】C

54. 在医务人员之间人际关系的特点中，“比、学、赶、超”体现的是

- A. 协作性
B. 独立性
C. 一致性
D. 竞争性
E. 同一性

【答案】D

55. 农业生产中主要职业危害不包括

- A. 矽尘引起的肺部疾患
B. 谷物粉尘引起的肺部疾患
C. 农药中毒
D. 化肥中毒
E. 窑内气体中毒

【答案】A

56. 最常引起血道转移的癌是

- A. 甲状腺乳头状癌
B. 肺鳞状细胞癌
C. 乳腺浸润性导管癌
D. 直肠未分化癌
E. 子宫绒毛膜癌

【答案】E

【解析】绒毛膜癌简称绒癌，是来自滋养层细胞的高度恶性肿瘤，易经血行转移，转移至肺、脑等。

命中考点：《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P334——绒毛膜癌

57. 下列哪项不是表示疾病流行强度的指标

- A. 暴发
B. 大流行
C. 短期波动
D. 散发
E. 流行

【答案】C

【解析】流行强度包括散发、暴发、流行和大流行。

命中考点：《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P469——疾病流行的强度

58. 医师在执业活动中违反卫生行政规章制度造成严重后果的, 卫生行政部门可以责令其暂停一定期限的执业活动, 该期限是

- A. 6 个月以上 1 年以下
 B. 1 年以上 1 年半以下
 C. 1 年以上 2 年以下
 D. 1 个月以上 3 个月以下
 E. 3 个月以上 6 个月以下

【答案】A

【解析】医师在执业活动中, 违反本法规定, 有下列行为之一的, 由县级以上人民政府卫生行政部门给予警告或者责令暂停六个月以上一年以下执业活动: ①违反卫生行政规章制度或者技术规范, 造成严重后果的; ②由于不负责任延误急危患者的抢救和诊治, 造成严重后果的; 造成医疗事故; ③未经亲自诊查、调查, 签署诊断、治疗、流行病学等证明文件或者有关出生、死亡等证明文件的; ④隐匿、伪造或者擅自销毁医学文书及有关资料的; 使用未经批准使用的药品、消毒药剂和医疗器械的; ⑤不按照规定使用麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品和放射性药品的; ⑥未经患者或者其家属同意, 对患者进行实验性临床医疗的; 泄露患者隐私, 造成严重后果的; ⑦利用职务之便, 索取、非法收受患者财物或者牟取其他不正当利益的。

59. 不属于肉芽肿性炎的疾病是

- A. 梅毒
 B. 伤寒
 C. 淋病
 D. 血吸虫病
 E. 结核病

【答案】C

【解析】淋病为化脓性炎。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P295——慢性肉芽肿性炎症

命中考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P92 第 4 题

60. 动脉粥样硬化性心脏病患者的膳食原则不包括

- A. 提高植物性蛋白的摄入, 少吃甜食
 B. 食盐摄入在 6~10g 之间
 C. 供给充足的微量营养素和膳食纤维
 D. 限制总能量摄入, 保持理想体重
 E. 限制脂肪和胆固醇的摄入

【答案】B

【解析】①限制热能, 以维持理想体重, 最好少量多餐, 每天 4~5 餐; ②限制脂肪摄入; ③限制胆固醇摄入; ④碳水化合物占总热能的 65% 左右为宜, 高甘油三酯血症者应控制在 55% 左右; 宜选用多糖类碳水化合物, 多选粗粮、蔬菜、水果等含纤维素高的食物, 应限制含单糖和双糖高的食品; ⑤冠心病膳食蛋白质占总热能 13%~15%, 或按 2g/kg 供给, 动物蛋白占蛋白总量的 20%~30%, 不宜超过 50%; 宜多选黄豆及其制品; ⑥供给充足维生素和矿物质, 多食用新鲜蔬菜和水果, 海带、紫菜、发菜及黑木耳等食物富含蛋氨酸、钾、镁、铜、碘, 均有利于冠心病治疗; ⑦禁烟、禁酒。

61. 具有麻醉药品处方资格的执业医师违反规定开具麻醉药品造成严重后果的, 卫生行政部门依法对其作出的处理是

- A. 暂停执业半年
- B. 吊销执业证书
- C. 取消麻醉药品的处方资格
- D. 警告
- E. 罚款

【答案】B

【解析】执业医师未按照临床应用指导原则的要求使用第二类精神药品或者未使用专用处方开具第二类精神药品，造成严重后果的，由原发证部门吊销其执业证书。

命中考点：《2015 年临床执业（含助理）医师核心考点全攻略》P618——具有麻醉药品和第一类精神药品处方资格医师的法律责任。

62. 不能补充血糖的生化过程是
- A. 食物中糖类的消化吸收
 - B. 肌糖原分解
 - C. 糖异生
 - D. 肝糖原分解
 - E. 葡萄糖在肾小管的重吸收

【答案】B

63. 卫生服务需求形成的条件是
- A. 消费者的便利程度和购买愿望
 - B. 消费者的购买愿望和服务提供者的水平
 - C. 消费者的支付能力和便利程度
 - D. 消费者的支付能力和服务提供者的水平
 - E. 消费者的购买愿望和支付能力

【答案】E

64. 关于大气二次污染物的说法，不正确的是
- A. 经化学或光化学作用生成
 - B. 与一次污染物的化学性质不同的新污染物
 - C. 毒性往往比一次污染物更大
 - D. 光化学烟雾是二次污染物
 - E. 沉降的污染物因刮风再次进入大气是二次污染

【答案】E

近似考题：《2015 年临床执业医师资格考试历年真题解析及拓展》P344 第 11 题

65. 不存在于人体蛋白质分子中的氨基酸是
- A. 鸟氨酸
 - B. 丙氨酸
 - C. 谷氨酸
 - D. 甘氨酸
 - E. 亮氨酸

【答案】A

66. 关于体内酶促反应特点的叙述，错误的是
- A. 具有高催化效率
 - B. 温度对酶促反应速度没有影响
 - C. 可大幅降低反应活化能
 - D. 只能催化热力学上允许进行的反应

E. 具有可调节性

【答案】B

【解析】酶的化学本质主要是蛋白质,在某些理化因素,如高温、高压、强酸、强碱等都会使酶丧失活性。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P14——酶促反应的特点

67. 磷酸吡哆醛作为辅酶参与的反应是

A. 转氨基反应

B. 酰基化反应

C. 转甲基反应

D. 过氧化反应

E. 磷酸化反应

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P15——辅酶与酶辅助因子的关系

68. 行胃大部切除的患者不会发生的功能变化是

A. 胃蛋白酶原的分泌减少

B. 铁的吸收减少

C. 胰液中 HCO_3^- 的分泌减少

D. 维生素 B_{12} 的吸收减少

E. 食物蛋白的消化减弱

【答案】C

【解析】胃大切后主细胞、壁细胞减少,分泌的胃蛋白酶原、盐酸、内因子减少,盐酸有助铁的吸收,内因子促进维生素 B_{12} 在回肠吸收,可见 ABDE 都会发生。

69. 哮喘发作时,肺通气功能指标中下降最明显的是

A. 功能余气量

B. 肺活量

C. 用力肺活量

D. 补呼气量

E. 补吸气量

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P668——肺功能检查

70. 使亚铁血红蛋白转化为高铁血红蛋白,造成机体组织缺氧的食物中毒是

A. 组胺中毒

B. 河豚鱼中毒

C. 毒蕈中毒

D. 瘦肉精中毒

E. 亚硝酸盐中毒

【答案】E

71. 有关肝细胞性黄疸患者血尿中胆红素变化的描述,错误的是

A. 血清间接胆红素含量升高

B. 尿胆红素阴性

C. 血清直接胆红素含量升高

D. 直接胆红素含量低于间接胆红素

E. 血清总胆红素含量升高

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1674——辅助检查

72.提出“人命至重,有贵千金,一方济之,德逾于此”观点的是

- A.孙思邈
- B.扁鹊
- C.李时珍
- D.张仲景
- E.华佗

【答案】A

【解析】这句话出自孙思邈《备急千金要药》里的一句话“人命至重,有贵千金,一方济之,德逾于此”。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P545——医学伦理学的历史发展。

73.根据《传染病防治法》规定,需按照甲类传染病采取预防控制措施的乙类传染病是

- A.疟疾
- B.肺炭疽
- C.登革热
- D.梅毒
- E.肺结核

【答案】B

【解析】需按照甲类传染病采取预防控制措施的乙类传染病有:非典、肺炭疽、高致病性禽流感。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P598——特别提醒

74.健康管理的首要步骤一般是

- A.收集健康信息
- B.人群的健康体检
- C.健康维护计划的制定
- D.健康维护计划的实施
- E.疾病危险度评估

【答案】A

75.实施脑死亡标准的直接伦理目的是

- A.减轻家属的身心痛苦
- B.促进人体器官移植
- C.维护死者的尊严
- D.节约卫生资源
- E.尊重患者死亡的权利

【答案】C

76.仅含一种类型核酸的病原体是

- A.单纯疱疹病毒
- B.结核分枝杆菌
- C.衣氏放线菌
- D.沙眼衣原体
- E.白假丝酵母菌

【答案】A

【解析】病毒是非细胞型微生物,核酸类型只能为 DNA 或 RNA 其中一种。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P178——病毒的结构与功能

77.男,67岁,反复咳嗽、咳痰、喘息5年,再发加重1周。查体:嗜睡,口唇发绀,两肺可闻及哮鸣音和湿性啰音,心率120次/分,动脉血气分析 pH 7.10, PaO₂ 54mmHg, PaCO₂ 103mmHg,该患者发生呼吸衰竭最主要的机制是

- A.肺泡通气量减少
- B.无效腔通气减少
- C.呼吸中枢抑制
- D.胸廓扩张受限
- E.弥散功能障碍

【答案】A

【解析】根据血气分析,患者为 II 型呼衰,II 型呼衰主要发病机制是肺泡通气不足。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P704——发病机制

78.男,46岁,确诊急性白血病1年,拟行异基因造血干细胞移植。有利于提高移植存活最重要的措施是

- A.HLA 配型相同
- B.血型相同
- C.输注血液制品前辐照
- D.输注间充质干细胞
- E.适时应用免疫抑制药物

【答案】A

【解析】同种异体器官移植成败主要取决于供、受体之间的组织相容性,而 HLA 等位基因的匹配程度尤为重要。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1154——骨髓移植

79.南方某村,居民以玉米为主食,某年秋天突然有 10 余人出现发热、呕吐、厌食、黄疸,随后出现腹水、浮肿,因抢救及时未出现死亡病例,经医生诊断排除传染性肝炎,分析原因与居民主食玉米有关,该情况最可能是

- A.污水灌甜引起玉米中镉超标
- B.玉米晾晒过程被多环芳烃污染
- C.玉米有农药残留
- D.玉米被黄曲霉毒素污染
- E.玉米中混进了有毒植物种子

【答案】D

【解析】花生和玉米是最容易被黄曲霉污染的粮食,曲霉毒素是剧毒物质,仅次于肉毒霉素,是目前已知霉菌中毒性最强的。它的毒害作用主要变化是肝脏,呈急性肝炎、出血性坏死、肝细胞脂肪变性和胆管增生。脾脏和胰脏也有轻度的病变。居民出现呕吐、黄疸、腹水浮肿,以肝功能急剧损害表现为主,诊断为黄曲霉毒素急性中毒。

80.张某是某医院的主管护师,在平常工作中,十分重视对患者的心理护理,能根据不同患者的不同心理问题制定相应的计划进行干预,其心理护理所遵循的原则是

- A.启迪性原则
- B.针对性原则
- C.保密性原则
- D.稳定性原则

E.自我管理原则

【答案】B

81.女,30岁,甲状腺右叶包块3年,无不适症状,包块增大缓慢。B超见包块内有点状钙化。行甲状腺右叶和峡部全切,左叶次全切除术。根据术后病理报告判断为预后良好的一种恶性肿瘤,但需终身服用甲状腺素片治疗。病理诊断的主要依据是

- A.有复杂分支乳头样结构
B.可见印戒细胞
C.腺腔高度扩张呈囊状
D.含大量黏液
E.癌巢少而间质纤维组织多

【答案】A

【解析】甲状腺癌以乳头状癌预后最好。

82.某医师随机抽取性别、病情严重程度等条件相近的红斑狼疮患者28例,随机等分为两个治疗组。一个疗程后检测dsDNA抗体滴度(倒数)资料如下:

抗体滴度(倒数)	甲组	乙组
阴性	1	1
10	1	—
40	1	2
60	2	—
80	1	—
120	1	5
320	1	—
480	1	2
560	2	2
1240	1	2
1240~	2	—

该资料分析可选用

- A. X^2 检验
B.秩和检验
C.t检验
D.Z检验
E.方差分析

【答案】C

【解析】方差分析是对定量资料的统计分析,用于两个或两个以上样本均数的比较,从而判断不同样本所代表的总体均数是否相同,本题两组的病例来自同一总体,故不选E。A和D都用于分类资料的统计分析,故不选。t检验常用于样本例数较小,总体标准差未知时样本与总体均数的比较,以及两个小样本均数的比较。秩和检验是非参数检验,用于分布类型未知、以等级做记录的资料的分析等。故选C。

83.男,22岁。饥饿性上腹痛伴泛酸1月余。2小时前呕吐咖啡色液体1次,量约200ml。近期体重无明显变化。否认慢性肝病史。查体:贫血貌,腹软,上腹部压痛,无反跳痛,肝脾肋下未触及。最合适的药物是

- A. 止血环酸
 B. 法莫替丁
 C. 奥美拉唑
 D. 凝血酶
 E. 垂体后叶素

【答案】C

【解析】饥饿痛提示十二指肠溃疡,而消化性溃疡所致出血首选的治疗措施是抑制胃酸的分泌。因血小板聚集及血浆凝血功能所诱导的止血作用需在 $\text{pH} > 6.0$ 时才能有效发挥,而且新形成的凝血块在 $\text{pH} < 5.0$ 的胃液中会迅速被消化。备选项中奥美拉唑抑制胃酸作用最强,故选 C。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P827——非手术治疗

84.男,78 岁。间断餐后上腹痛伴暖气 40 年,无反酸,曾行胃镜及病理检查提示重度萎缩性胃炎。近期出现乏力及消瘦。胃镜发现胃角巨大溃疡,周边不规则隆起,中心有较大血凝块附着,其余部位无出血病变。行手术治疗,术后病理最可能为

- A. 胃淋巴瘤
 B. 胃间质瘤
 C. 胃癌
 D. 胃溃疡
 E. 胃结核

【答案】C

【解析】老年患者,有重度萎缩性胃炎的病史,目前胃镜检查可见巨大溃疡及周边不规则隆起,均提示恶性溃疡,即溃疡型胃癌,故选 C。

85.女,66 岁。乏力 1 个月。既往高血压病史 4 年。查体:BP150/70mmHg,心率 67 次/分,律齐。腹软,腹部未闻及血管杂音。实验室检查:血钾 2.9mmol/L,血肾素水平降低,醛固酮水平增高。CT 示左侧肾上腺增生。该患者的最适宜降压药物是

- A. 氢氯噻嗪
 B. 美托洛尔
 C. 呋塞米
 D. 螺内酯
 E. 普萘洛尔

【答案】D

【解析】高血压合并低钾,诊断原醛症,药物首选螺内酯。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1218——原发性醛固酮增多症

86.女,4 岁。发热、呕吐 1 周,双眼呆滞 1 天。查体:消瘦明显,颈项强直。经治疗无效死亡。尸体解剖见脑膜血管扩张淤血,脑底蛛网膜下腔见灰白色胶样渗出物聚集,以脑桥、脚间池、视神经交叉处最明显,并见灰白色粟粒大小结节弥漫分布。镜下见渗出物中有淋巴细胞、单核细胞、纤维素及肉芽肿。最可能的诊断是

- A. 流行性乙型脑炎
 B. 化脓性脑脊髓膜炎
 C. 真菌性脑膜炎
 D. 结核性脑膜炎
 E. 多发性脑脓肿

【答案】D

【解析】结核性脑膜炎在脑桥、脚间池、视神经交叉及大脑外侧裂等处的蛛网膜下腔内，有多量灰黄色混浊的胶冻样渗出物积聚，脑室脉络丛及室管膜有时也可有结核结节形成。镜下可见软脑膜弥漫性炎细胞浸润，以单核、淋巴细胞为主。急性化脓性脑膜炎镜下应该以中性粒细胞为主。

87.女,58岁。纳差、上腹部不适3年。胃镜检查示:胃粘膜变薄,皱襞稀疏。血红蛋白86g/L,MCV 102 fl。该患者应主要补充的维生素是

- A.维生素 C
- B.维生素 A
- C.维生素 E
- D.维生素 K
- E.维生素 B₁₂

【答案】E

【解析】诊断慢性萎缩性胃炎合并巨幼细胞贫血,应补充维生素 B₁₂。

88.男,55岁,工程师。因膀胱癌入院准备接受手术治疗。在术前准备期间,患者一方面希望尽快恢复健康而配合各种检查和治疗,另一方面又担心自己主持的工程项目出问题而自行离院回单位开会。这种患者角色的状态属于

- A.角色行为强化
- B.角色行为异常
- C.角色行为适应
- D.角色行为缺如
- E.角色行为冲突

【答案】E

【解析】①角色行为减退:已进入角色的患者,由于更强烈的情感需要,不顾病情而从事力所不能及的活动,表现出对病、伤的考虑不充分或不够重视,而影响到疾病的治疗。②角色行为冲突:同一个体常常承担着多种社会角色。当患病需要从其他角色转化为患者角色时,患者一时难以实现角色适应。③角色行为缺如:即患者未能进入角色。虽然医生诊断为有病,但本人否认自己有病,根本没有或不愿意识到自己是患者。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P540——患者角色的转化

89.男,57岁。咳嗽、咯血2天,突发呼吸困难1小时。血D-二聚体明显升高,心电图见S_IQ_{III}T_{III},确诊为急性肺栓塞,经rt-PA 50mg溶栓治疗后症状改善。此时应采取的治疗措施是

- A.口服华法林
- B.皮下注射低分子肝素
- C.口服氯吡格雷
- D.维持rt-PA静脉注射
- E.口服阿司匹林

【答案】B

【解析】肺栓塞至少需要抗凝(不是抗血小板)3个月,华法林是长期抗凝药物,起效慢,不适用于肺栓塞急性期。低分子肝素起效快。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P702——抗凝治疗

90.女,36岁。因子宫肌瘤在县医院接受手术治疗,术后患者因对手术效果不满意诉

至法院。法院经审理认为医院存在《侵权责任法》规定的过错推定情形,判决医院败诉。该推定情形是

- A. 未尽到说明义务
- B. 未尽到与当时医疗水平相应的诊疗义务
- C. 伪造病历资料
- D. 泄露患者隐私
- E. 限于当时的医疗水平难以诊疗

【答案】C

【解析】患者有损害,因下列情形之一的,推定医疗机构有过错:违反法律、行政法规、规章以及其他有关诊疗规范的规定;隐匿或者拒绝提供与纠纷有关的病历资料;伪造、篡改或者销毁病历资料。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P627——推定医疗机构有过错的情形

91.男,65 岁。急性前壁心肌梗死 3 小时。既往有高血压、糖尿病史。平时血压 140~150/70~80mmHg。查体:BP 90/70mmHg,双肺呼吸音清,心率 85 次/分,律齐。该患者血压降低的最可能原因是

- A. 主动脉壁硬化
- B. 大动脉弹性降低
- C. 心脏每搏输出量降低
- D. 心率降低
- E. 外周阻力降低

【答案】C

92.主治医师为一名择期手术患者提交了临床用血申请,经上级医师核准后予以签发,依照《医疗机构临床用血管理办法》的规定,申请的备血量应是

- A. 1000 毫升
- B. 1200 毫升
- C. 1600 毫升
- D. 600 毫升
- E. 900 毫升

【答案】D

【解析】①同一患者一天申请备血量少于 800 毫升的,由具有中级以上专业技术职务任职资格的医师提出申请,上级医师核准签发后,提交至输血科备血。②同一患者一天申请备血量在 800 毫升至 1600 毫升的,由具有中级以上专业技术职务任职资格的医师提出申请,经上级医师审核,并经科室主任核准签发后,提交至输血科备血。③同一患者一天申请备血量达到或超过 1600 毫升的,由具有中级以上专业技术职务任职资格的医师填写《临床用血申请备案表》,科室主任核准签发后,报医务部门批准后,方可备血。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P639——临床用血申请

93.某企业职工因为冠心病在某三甲医院住院 6 天,共产生医药费用 9000 元。出院结算时,医院先扣除自费项目 1200 元,在剩下的 7800 元中,扣除起付标准 800 元后,对剩余部分医疗费用的 7000 元,由统筹基金按 90%的比例给予报销,其余的 10%由该职工本人

支付。这 7000 元的支付方式属于

- A. 封顶线
- B. 共同付费
- C. 起付比例
- D. 自费线
- E. 起付线

【答案】B

【解析】封顶线:最高支付限额,低于由医疗保险支付,超过的自负;共同付费:按比例分担,指医疗保险机构按合同或规定进行一定比例补偿,剩余比例自负;起付线:就是最低标准,低于要自负,超过的医疗费由医疗保险按规定支付。

94. 李某,因妊娠异常需行剖宫产术,经治医师在告知孕妇丈夫手术相关信息并取得签字后实施手术。胎儿被取出后发现产妇患有双侧卵巢畸胎瘤,遂告知其丈夫并建议切除双侧卵巢。李某丈夫立即打电话与其他家属商议,医师在尚未得到家属商议结果的情况下,继续手术并切除双侧卵巢,于是发生医患纠纷。此案例中,医师侵犯的患方权利是

- A. 疾病认知权
- B. 知情同意权
- C. 隐私保护权
- D. 生命权
- E. 健康权

【答案】B

95. 患者陈某因手术效果不佳与医院发生争议,要求复制病历资料。医院按照规定复制了病历资料,并告知陈某另有部分病历资料不予复制,只能在医患双方在场的情况下封存,这部分病历资料是

- A. 病程记录
- B. 医学影像检查资料
- C. 手术及麻醉记录单
- D. 住院志
- E. 医嘱单

【答案】A

【解析】发生医疗事故争议时,死亡病例讨论记录、疑难病例讨论记录、上级医师查房记录、会诊意见、病程记录应当在医患双方在场的情况下封存和启封。

96. 女,20 岁。咳嗽、胸闷 1 周。查体:右下肺呼吸音消失。胸部 X 线片示右侧大量胸腔积液。该患者肺通气功能检查最不可能出现的结果是

- A. 一秒量下降
- B. 残气量下降
- C. 肺总量下降
- D. 用力肺活量下降
- E. 一秒率下降

【答案】E

【解析】在哮喘等阻塞性肺疾病的患者,FEV₁的降低比 FVC 更明显,因而 FEV₁/FVC 变小,此外余气量也增大;而在肺纤维化等限制性肺疾病的患者中,FEV₁和 FVC 均下降,但 FEV₁/FVC(一秒率)仍可基本正常,并且余气量减少。胸腔积液属于限制性肺疾病,故一秒率基本正常,故选 E。

97. 根据一项包括 50 例病例和 50 例对照的调查结果,两组关于可能病因因素分布的差异没有统计学意义,可以据此得出结论

- A. 这个差异可能是抽样误差所致
- B. 病例和对照组的可比性已被证实
- C. 观察者或调查者的偏性已被消除
- D. 该因素与疾病可能有联系

E.这个差异临床上可能是显著的

【答案】A

98.女,22岁。每逢路过商店时就会有被售货员怀疑偷窃的想法,无法自制,十分痛苦。遂到心理门诊寻求帮助,心理治疗师指导其每当出现该想法时就用力拉弹手腕上的橡皮筋,使其产生疼痛,从而逐步消除其强迫症状。这种方法是

- A.厌恶疗法
B.系统脱敏疗法
C.习惯转换法
D.冲击疗法
E.代币疗法

【答案】A

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P535——厌恶疗法

99.为了解5年内城市人口高血压的患病情况,随机抽取城市人口的15%进行调查,为防止调查产生偏性,下列措施不正确的是

- A.对于那些检查血压时不肯合作的人应以较合作的人代替
B.对5年内死亡的调查人群的成员应追踪其死亡是否与高血压有关
C.应当使用统一的血压计
D.应反复多次对调查人群观察、测量

E.对5年期间调查人群中搬出该城市的那部分人应尽量查明新地址继续测量他们的血压变化情况

【答案】A

100.男,17岁。双下肢出血点伴关节痛2周,水肿1周。实验室检查:尿红细胞30~40/HP,尿蛋白4.2g/d,血浆白蛋白28g/L,肾免疫病理示IgA沉积于系膜区,其病因诊断为

- A.IgA肾病
B.狼疮肾炎
C.过敏性紫癜肾炎
D.乙肝病毒相关性肝炎
E.原发性肾病综合征

【答案】C

【解析】过敏性紫癜肾炎的临床表现为皮肤紫癜,4周内发现血尿,甚至表现为肾病综合征。肾活检:以IgA沉积为主。故答案选A。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P920——青少年继发性肾病综合征的原因及特点。

101.女,50岁。双下肢水肿10余年,晨轻暮重,无眼睑水肿和泡沫尿。查体:BP 130/70mmHg,双肺呼吸音清,心界不大,心率87次/分,律齐。腹软,肝脾肋下未触及,移动性浊音阴性,双下肢见凹陷性水肿,浅静脉呈蚯蚓状改变。该患者下肢水肿的最可能原因是

- A.下肢静脉压增高
B.血浆胶体渗透压降低
C.心肌收缩力降低
D.血浆晶体渗透压降低
E.淋巴液回流受阻

【答案】A

102.男,70岁。高热、咳嗽、咳脓血痰1周。糖尿病史10年。查体:T 39.5℃,精神差,双肺底可闻及湿性啰音。胸部X线片见双下肺斑片状影,多发小气囊腔。血 WBC $18.2 \times 10^9/L$,N 0.92。该患者最可能感染的病原体是

- A.肺炎克雷伯杆菌
- B.肺炎链球菌
- C.军团菌
- D.肺炎支原体
- E.金黄色葡萄球菌

【答案】E

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P681——葡萄球菌肺炎的临床表现

103.女,41岁。上腹胀痛10余年。常伴烧心,多在餐后约1小时发作,约1~2小时可自行缓解。秋冬及冬春季症状明显。胃镜下黏膜活检组织 Warthin—Starry 银染色阳性,提示细菌感染。这种致病菌的特点不包括

- A.尿素酶试验阳性
- B.至少需质子泵抑制剂加两种抗生素治疗
- C.培养时需要加入5%~10%羊血或马血
- D.革兰染色阳性
- E.培养3~7日可见针尖大小的菌落

【答案】D

【解析】根据题干,可推测该致病菌为幽门螺杆菌。幽门螺杆菌为革兰氏阴性菌,营养要求高,培养时需动物血清或血液,培养3~6天可见针尖状无色透明的菌落,尿素酶丰富,尿素酶试验阳性。治疗时需1种PPI+2种抗生素或1种铋剂+2种抗生素,疗程1~2周。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P826——幽门螺杆菌检查

104.某糖尿病患者为了控制血糖,在医生的建议下准备和营养师一起制定一份饮食计划。患者家属表示积极配合,本人也了解饮食控制的好处,但总认为无法管住自己,计划难以实施。对于这样的患者的干预重点是

- A.提高自我效能
- B.培养行为能力
- C.建立支持性环境
- D.提供社会支持
- E.提高结果预期

【答案】A

105.男,70岁。上腹痛1年,进食后加重,大便10次/天,可见脂肪滴。查体:上腹中部压痛(+).腹部B超:胰腺多发钙化灶。应给予的药物是

- A.胰酶制剂
- B.质子泵抑制剂
- C.钙通道阻滞剂
- D.H₂受体拮抗剂
- E.抗胆碱药物

【答案】A

106.男,75岁。反复上腹痛20余年,消瘦、黑便3个月。10余年前胃镜检查诊断为“慢性萎缩性胃炎”。本次胃镜检查示:胃皱襞减少,黏膜不平、黏膜下血管透见,胃窦可见直径2cm深溃疡,周边隆起,溃疡周边活检病理学检查,最不可能出现的病理改变是

- A.胃腺癌
B.胃窦黏膜异型增生
C.胃体黏膜主细胞数量减少
D.胃体黏膜壁细胞数量增加
E.胃窦黏膜肠上皮化生

【答案】D

107.男,60岁。诊断为重症肌无力。治疗过程中出现呼吸困难、多汗、流涎、瞳孔缩小,可能的原因是

- A.胆碱能系统亢进
B.肾上腺素能系统抑制
C.胆碱能系统抑制
D.肾上腺素能系统亢进
E.5-HT系统亢进

【答案】A

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1292——重症肌无力

108.男,70岁。右侧肢体动作迟缓伴震颤半年。查体:右侧肢体静止性震颤,肌张力齿轮样增高。病变可能的部位是

- A.大脑皮质
B.黑质
C.小脑
D.内囊
E.脑桥

【答案】B

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1283——帕金森病

109.女,30岁。腹痛、腹泻伴里急后重3天。最初为稀便,2天后为黏液脓血便,偶见片状灰白色膜状物排出。此病变最可能的炎症类型是

- A.纤维素性炎
B.变质性炎
C.浆液性炎
D.出血性炎
E.化脓性炎

【答案】A

【解析】急性细菌性痢疾是由痢疾杆菌所引起的一种假膜性肠炎。临床主要表现为腹痛、腹泻、里急后重、黏液脓血便。细菌性痢疾的炎症类型是纤维素性炎。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P295——纤维素性炎症

110.女,19岁。因急性白血病接受骨髓移植治疗,术后被安置于无菌病房中,根据病情,需限制亲属探视,在此期间患者常常出现心情烦躁、不安,针对此情况,心理治疗师指导其采用冥想结合深呼吸的方法来改善自己的情绪,这种应对方式属于

- A.取得社会支持
B.消除应激来源
C.调整认知评价
D.心理防御机制

E.自我调节放松

【答案】E

111.某电视台编辑求助于一家心理治疗中心,希望在该电视台上播放韦氏智力测验的具体内容,以引起公众对心理学的兴趣,但被心理中心的工作人员婉言拒绝,该工作人员遵循的原则是

A.保密原则

B.稳定性原则

C.标准化原则

D.回避原则

E.客观原则

【答案】A

112.男,56岁。上腹胀痛不适10年,常于进食后半小时加重,可自行缓解。近3个月来体重减轻5kg,胃镜检查示胃小弯侧直径3cm溃疡病灶,取活组织标本行病理检查。能够诊断溃疡病灶属恶性的病理形态学依据是

A.细胞浆出现空泡

B.胞浆黏液明显增多

C.细胞核大小一致

D.核仁清楚

E.细胞异型性明显

【答案】E

【解析】肿瘤细胞异型性大,并且出现病理性核分裂象。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P298——肿瘤异型性

113.男,13岁,学生。持续畏寒、发热1周,神志不清半天。病前有右足刺伤史。查体:T 39.5℃,P 123次/分,BP 65/45mmHg,右足跟部红肿,血常规 WBC $24.3 \times 10^9/L$,N 0.89,L 0.11。导致本病最可能的病原体是

A.革兰阴性菌

B.真菌

C.革兰阳性菌

D.病毒

E.寄生虫

【答案】C

【解析】考虑金葡菌引起的感染性休克。

114.女,40岁。右上腹胀痛伴畏寒、发热2天,巩膜黄染1天。查体:T 39℃,P 100次/分,右上腹部压痛、反跳痛及肌紧张明显,肝区叩击痛阳性,血 WBC $18.2 \times 10^9/L$,N 0.85。B超示胆囊及胆总管结石,该患者最可能感染的致病菌是

A.草绿色链球菌

B.大肠埃希菌

C.金黄色葡萄球菌

D.铜绿假单胞菌

E.肺炎链球菌

【答案】B

【解析】大肠埃希菌急性梗阻性化脓性胆管炎的常见致病菌。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P854——急性梗阻性化脓性胆管炎的病因

115.某村卫生室私自从“不法药贩”处购入药品用于患者的治疗,险些造成患者死亡。事发后,经有关部门调查检测,认定该药品为假药。该认定依据的事实是

- A.药品标签未标明有效期
 B.药品擅自添加着色剂
 C.直接接触药品的包装材料未经批准
 D.药品超过有效期
 E.药品所含成分与国家药品标准规定的成分不符

【答案】E

【解析】假药是指药品所含成分与国家药品标准规定的成分不符的,以及以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品的。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P613——禁止生产、销售假药

(116~117 题共用题干)

男,18 岁。双下肢及颜面水肿 1 周。尿沉渣镜检:RBC 0~2,尿蛋白定量 12.2g/d。血 Alb 18g/L,Scr 79,ANA(-),乙型肝炎病毒标志物均(-)。

116.该患者最可能的肾脏病理类型是

- A.毛细血管内增生性肾小球肾炎
 B.微小病变型肾病
 C.膜性肾病
 D.膜增生性肾小球肾炎
 E.局灶节段性肾小球硬化

【答案】B

【解析】由提干可知,该患者双下肢水肿,尿蛋白定量 $12.2\text{g/d} > 3.5\text{g/d}$,血 Alb $18\text{g/L} < 30\text{g/L}$,故诊断为肾病综合征。由于该患者年龄为 18 岁,故最可能的肾脏病理类型是微小病变型肾病。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P920——肾病综合征的分类和常见病因。

117.如果经足量糖皮质激素治疗 12 周无效,其病理类型最可能是

- A.毛细血管内增生性肾小球肾炎
 B.微小病变型肾病
 C.膜性肾病
 D.膜增生性肾小球肾炎
 E.局灶节段性肾小球硬化

【答案】D

【解析】微小病变型肾病多见于儿童,激素治疗效果明显;系膜增生性肾小球肾炎多见于青少年,激素治疗有效;膜增生性肾小球肾炎多见于儿童和青少年,激素治疗效果不明显。

(118~120 题共用题干)

用钼靶 X 线摄片检查方法做乳腺癌的筛检试验,分别检查了 100 名经活检确诊为乳腺癌的妇女和 100 名未患乳腺癌的妇女,结果如下表:

121. 依照《精神卫生法》对患者连某实施的约束行为的性质属于

- A. 治疗性措施
 B. 惩罚性措施
 C. 保护性医疗措施
 D. 诊断性措施
 E. 警告性措施

【答案】C

【解析】精神卫生法总则第四十条：精神障碍患者在医疗机构内发生或者将要发生伤害自身、危害他人安全、扰乱医疗秩序的行为，医疗机构及其医务人员在没有其他可替代措施的情况下，可以实施约束、隔离等保护性医疗措施。实施保护性医疗措施应当遵循诊断标准和治疗规范，并在实施后告知患者的监护人。禁止利用约束、隔离等保护性医疗措施惩罚精神障碍患者。

命中考点：《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P645——第四十条

122. 对患者连某实施身体约束而未告知其监护人的做法，侵犯的患方权利是

- A. 生命权
 B. 健康权
 C. 认知权
 D. 知情权
 E. 名誉权

【答案】D

【解析】《医疗机构管理条例实施细则》第 62 条规定：“医疗机构应尊重患者对自己的病情、诊断、治疗的知情权，在实施手术、特殊检查、特殊治疗时应当向患者做出必要的解释，因实施保护性医疗措施不宜向患者说明情况，应当将有关情况通知家属。”

123. 该案例中所形成的医患关系模式是

- A. 主动—被动型
 B. 指导—合作型
 C. 契约许可型
 D. 指导参与型
 E. 共同参与型

【答案】A

【解析】主动—被动型模式是反映患者置于被动地位，而医生处于主动的主导地位的一种模式，常用于手术、麻醉、抗感染治疗等技术。对休克、昏迷、某些精神疾病、智力严重低下等疾病，这种模式是适合的。在这种模式之下，医生为患者做某事，患者就好像是不能自助的婴幼儿，医生则形同他们的父母。

命中考点：《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P538——主动—被动型

(124~125 题共用题干)

男，40 岁。体检发现空腹血糖升高 2 个月。2 次查空腹血糖分别为 7.8mmol/L，7.4mmol/L。无口干、多饮、多食、多尿、体重下降。查体：身高 170cm，体重 90kg，BMI 31.1，余无异常。实验室检查：HbA1c 7.8%。

124. 该患者首选的治疗药物是

- A. 罗格列酮
 B. 胰岛素
 C. 阿卡波糖
 D. 二甲双胍

E. 格列苯脲

【答案】D

【解析】患者 BMI>23, 双胍类药物可降低体重, 适用于肥胖或超重的 2 型糖尿病患者。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1228——口服降血糖药物治疗

125. 药物治疗 2 个月后, 空腹血糖降至 6.2mmol/L, 餐后 2 小时血糖 9~10mmol/L, 拟采用药物联合治疗, 首选的治疗药物是

A. 罗格列酮

B. 格列苯脲

C. 胰岛素

D. 二甲双胍

E. 阿卡波糖

【答案】E

【解析】经药物治疗, 患者空腹血糖基本正常, 但餐后血糖仍较高。而阿卡波糖是 α -葡萄糖苷酶抑制剂, 可降低餐后血糖。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1229—— α -葡萄糖苷酶抑制剂

(126~127 题共用备选答案)

A. 阿卡波糖

B. 胰岛素

C. 格列美脲

D. 吡格列酮

E. 二甲双胍

126. 主要减少肝糖输出的药物是

【答案】E

【解析】双胍类药物主要通过减少肝脏葡萄糖的输出, 改善外周组织对胰岛素的敏感性、增加对葡萄糖的摄取和利用而降低血糖。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1228——双胍类药物

127. 属于过氧化物酶增殖体活化因子受体 γ 激动剂的是

【答案】D

【解析】磺脲类药物的名称是“格列~~”, 如格列喹酮; 非磺脲类促胰岛素分泌剂的名称是“~格列奈”, 如那格列奈; 噻唑烷二酮类药物, 作用于过氧化物酶增殖体活化因子受体, 药物名称是“~格列酮”, 如吡格列酮、罗格列酮。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1229——噻唑烷二酮类药物

(128~130 题共用备选答案)

A. 散点图

B. 圆图

C. 直条图

D. 直方图

E.线图

128.用于描述连续型变量资料频率分布的统计图是

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P461——统计图的类型、选择及制图通则

129.可用于描述两连续型变量之间相关的关系统计图是

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P461——统计图的类型、选择及制图通则

130.描述事物内部各组成部分所占比重宜使用

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P461——统计图的类型、选择及制图通则

(131~132 题共用备选答案)

A.支气管哮喘

B.血清病

C.药物过敏性休克

D.接触性皮炎

E.自身免疫性溶血性贫血

131.属于Ⅱ型超敏反应的疾病是

【答案】E

【解析】Ⅱ型超敏反应是由 IgG 或 IgM 抗体与靶细胞表面相应抗体结合后,在补体、吞噬细胞和 NK 细胞的参与下,引起的以细胞溶解和组织损伤为主的免疫反应,包括输血反应、新生儿溶血病、自身免疫性溶血性贫血、甲亢等。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P253——临床常见的Ⅱ型超敏反应性疾病

命中考题:《2015 年临床执业医师资格考试冲刺考题精析》P408 第 10 题

132.属于Ⅲ型超敏反应的疾病是

【答案】B

【解析】Ⅲ型超敏反应是由于免疫复合物沉积于局部或全身多处毛细血管基底膜后,通过激活补体、并在中性粒细胞等效应细胞的参与下引起的炎症反应。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P254——临床常见的Ⅲ型超敏反应性疾病

(133~135 题共用备选答案)

- A. 主要为收缩压升高
B. 收缩压与舒张压均升高
C. 主要为舒张压升高
D. 收缩压降低, 舒张压升高
E. 收缩压升高, 舒张压可降低

133. 严重甲状腺功能亢进患者的动脉血压变化特点是

【答案】E

【解析】甲亢时身体产热增加, 可导致皮肤等外周血管舒张而增加血流量, 加强体表散热, 此时体循环的外周阻力降低, 舒张压下降; 甲状腺激素可增强心肌收缩力, 增加心输出量, 收缩压升高。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1200——临床表现

134. 正常老年人动脉血压的生理性变化特点是

【答案】E

【解析】老年人大动脉的管壁硬化, 使其对血流的缓冲作用减小, 收缩压增高; 同时, 因大动脉的弹性储器作用减弱, 舒张压下降。

135. 以小动脉硬化为主的患者动脉血压变化特点是

【答案】C

【解析】小动脉硬化可导致外周血管阻力增加, 舒张期流向外周的血液减少, 舒张压升高; 此时存留在大动脉中的血液增多, 可导致收缩压增高, 但因血压增快可使血液较快流向外周, 故收缩压升高不明显。

(136~137 题共用备选答案)

- A. 列兵样排列
B. 形成管状结构
C. 形成乳头状结构
D. 有角化珠
E. 有假菊形团结构

136. 最符合小细胞癌组织学特点的是

【答案】E

【解析】小细胞癌过去称为小细胞未分化癌。是一种高度恶性肿瘤, 多为中央型, 男性多见, 生长快、转移早。镜下癌细胞小、呈圆形淋巴细胞样, 或短梭形似燕麦样, 胞质少似裸核, 称燕麦细胞癌, 可有假菊形团结构。电镜下可见神经内分泌颗粒。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P315——小细胞癌

137. 最符合高分化鳞癌组织学特点的是

【答案】D

【解析】典型的鳞癌显示细胞角化、角化珠形成, 以中央型肺癌多见, 有向管腔内生长的倾向, 早期常引起阻塞性肺炎。癌组织易变性坏死而形成空洞。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P695——鳞癌

(138~139 题共用备选答案)

- | | |
|--------------|---|
| A.氧化与磷酸化的偶联 | B.CO 对电子传递的影响 |
| C.能量的贮存与利用 | D.2H ⁺ 与 1/2O ₂ 的结合 |
| E.乳酸脱氢酶催化的反应 | |

138.与 ADP 和 ATP 相互转变相关的过程

【答案】C

139.与 ATP 生成有关的主要过程是

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P23——氧化磷酸化

(140~141 题共用备选答案)

- | | |
|-----------|------------|
| A.直肠息肉形成 | B.脾脏白色锥形病灶 |
| C.回盲部肠腔狭窄 | D.胃壁溃疡形成 |
| E.肝脏肿大 | |

140.肺外结核病最常引起的形态改变是

【答案】C

141.慢性肺淤血可引起的脏器改变是

【答案】E

(142~143 题共用备选答案)

- | | |
|---------|-------------|
| A.丙酮酸羧化 | B.乙酰 CoA 缩合 |
| C.糖原分解 | D.黄嘌呤氧化 |
| E.糖原合成 | |

142.生成酮体的中间反应是

【答案】B

【解析】酮体的生成以乙酰 CoA 为原料,反应的第一步是 2 分子的乙酰 CoA 缩合成乙酰 CoA。

143.三羧酸循环中草酰乙酸的来源是

【答案】A

【解析】丙酮酸在丙酮酸羧化酶的作用下可生成草酰乙酸。此外,D 选项黄嘌呤氧化生成尿酸。

(144~145 题共用题干)

- 开具抗菌药物处方牟取不正当利益
- 发生抗菌药物不良事件
- 出现开具抗菌药物超常处方 3 次以上且无正当理由
- 因紧急情况越级使用抗菌药物
- 使用的抗菌药物明显超出规定用量

144.医疗机构对医师提出警告并限制其特殊使用级抗菌药物处方权的情形

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P636——第四十五条

145. 医疗机构取消医师抗菌药物处方权的情形是

【答案】A

【解析】医疗机构取消医师抗菌药物处方权的情形包括:抗菌药物考核不合格的;限制处方权后,仍出现超常处方且无正当理由的;未按规定使用抗菌药物,造成严重后果的;未按规定开具抗菌药物处方,造成严重后果的;开具抗菌药物处方牟取不正当利益的。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P637——第四十六条

(146~148 题共用备选答案)

- | | |
|------------------|-----------------|
| A. 勇担风险, 团结协作 | B. 掌握手术指征, 动机纯正 |
| C. 以健康、稳定的情绪影响患者 | D. 对症下药, 剂量安全 |
| E. 减轻痛苦, 加速康复 | |

146. 手术后治疗的伦理要求是

【答案】E

【解析】B 属于手术前治疗的伦理要求, D 属于药物治疗的伦理要求, E 属于手术后的伦理要求。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P555——手术治疗的伦理要求

147. 心理治疗的伦理要求是

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P555——心理治疗的伦理

148. 临床急救的伦理要求是

【答案】A

【解析】临床急救的伦理要求是:①争分夺秒, 力争患者转危为安。②勇担风险, 团结协作。③满腔热情, 重视心理治疗。④全面考虑, 维护社会公益。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P556——临床急救的伦理要求

(149~150 题共用备选答案)

- | | |
|--------------|--------------|
| A. 抗-HBs | B. 抗-HBc IgM |
| C. 抗-HBc IgG | D. 抗-Hbe |
| E. 抗-HDV | |

149. 乙型肝炎的保护性抗体是抗-HBs

【答案】A

【解析】乙型肝炎病毒是一种 DNA 病毒,属嗜肝病毒科,抗-HBs 是一种保护性抗体,在疾病恢复期出现,临床上常作为判断急性乙型肝炎患者预后的指标。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1530——乙型肝炎病毒

150.提示体内乙型肝炎病毒处于复制状态的抗体是

【答案】B

【解析】乙型肝炎的核心抗原(HBcAg)存在于肝细胞内,不易检出;抗-HBc 是 HBcAg 相应的抗体,有抗-HBcIgM 和抗-HBcIgG 两型,抗-HBcIgM 是 HBV 感染后较早出现的抗体,抗-HBcIgM 阳性提示乙型肝炎的急性期或慢性乙型肝炎的急性发作期。

第二单元

1. 医院获得性肺炎中, 病原体进入肺组织引发肺炎最主要感染途径是

- A. 飞沫(气溶胶)吸入
- B. 血源性播散
- C. 胃食管反流物误吸
- D. 口咽部分泌物吸入
- E. 污染空气吸入

【答案】D

2. 男性骨盆合并泌尿系损伤, 最常见的损伤部位是

- A. 尿道阴茎
- B. 尿道球部
- C. 尿道膜部
- D. 尿道前列腺部
- E. 膀胱颈

【答案】C

【解析】骑跨伤常损伤尿道球部, 骨盆骨折常损伤尿道膜部。记忆方法为: “骑跨球”, “骨盆膜”。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P958——病理

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P306 第 2 题

3. 对确诊结核分枝杆菌感染最有价值的检查是

- A. 血清结核菌抗体
- B. γ -干扰素释放实验
- C. 痰结核菌 PCR
- D. 痰菌培养
- E. PPD

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P689——辅助检查

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P210 第 18 题

4. 下列疾病中纵膈向患侧移位的是

- A. 急性脓胸
- B. 慢性脓胸
- C. 张力性气胸
- D. 进行性血胸
- E. 血气胸

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P719——慢性脓胸

5. 鉴别急性与慢性肾衰首选的检查是

- A. 同位素肾动态显像
- B. 内生肌酐清除率
- E. 尿钠排泄分数
- D. 尿沉渣镜检
- E. 肾脏 B 超

【答案】E

【解析】肾脏 B 超显示肾脏缩小则可确定为慢性肾衰;如肾脏增大,则支持急性肾衰;但某些疾病导致的慢性肾衰也可表现为肾脏增大,如糖尿病肾病等。

6. COPD, 慢性肺源性心脏病患者发生 II 型呼吸衰竭时, 下列治疗措施中不恰当的是

- A. 无创通气
 B. 持续高浓度吸氧
 C. 静脉点滴糖皮质激素
 D. 雾化吸入支气管舒张剂
 E. 静脉点滴祛痰药物

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P706——治疗

7. 急性心肌梗死最常见并发症是

- A. 体循环栓塞
 B. 心肌梗死后综合症
 C. 肺动脉栓塞
 D. 心室膨胀瘤
 E. 心脏乳头肌功能失调或断裂

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P771——并发症

8. 采用 TNM 分期, 膀胱肿瘤浸润浅肌层的分期是

- A. T₁ 期
 B. T_{2b} 期
 C. T_{3a} 期
 D. T_a 期
 E. T_{2a} 期

【答案】E

【解析】T₂ 表示浸润肌层, 又分为 T_{2a} 浸润浅肌层, T_{2b} 浸润深肌层。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P943——病理

9. 治疗急性呼吸窘迫综合症最有效的措施是

- A. 应用呼气末正压通气
 B. 持续低浓度吸氧
 C. 持续高浓度吸氧
 D. 积极给与对症支持治疗
 E. 早期应用糖皮质激素

【答案】A

【解析】对于急性呼吸窘迫综合征机械通气治疗中最常使用的是呼气末正压通气, 维持肺泡的扩张状态, 从而减少死腔样通气, 促进弥散。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P710——治疗

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P217 第 9 题

10. 血肌酐超过 265 μmol/L 时慎用的降压药是

- A. 美托洛尔
 B. 氨氯地平
 C. 硝苯地平
 D. 阿替洛尔

E.依那普利

【答案】E

【解析】血肌酐大于 $265\mu\text{mol/L}$,慎用 ACEI 类药物。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P757——治疗

11.手外伤治疗的最终目的是

A.早期彻底清创

B.一期闭合创口

C.骨折解剖复位固定

D.组织修复

E.恢复手部运动功能

【答案】E

12.鉴别中央型腰椎间盘突出症与椎管内肿瘤最有意义的检查是

A.MRI

B.鞍区感觉检查

C.CT

D.X 线

E.肛门括约肌检查

【答案】A

13.符合甲状旁腺功能亢进症的实验室检查结果是

A.高血钙、高血磷和低尿钙

B.高血钙、低血磷和低尿钙

C.低血钙、低血磷和高尿钙

D.高血钙、低血磷和高尿钙

E.低血钙、高血磷和高尿钙

【答案】D

【解析】本题考查与钙、磷代谢调节有关的激素。降钙素可以降低血钙和血磷, $1,25-(\text{OH})_2\text{D}_3$ 升高血钙和血磷;甲状旁腺激素较特殊,对血钙和血磷的作用相反,升高血钙、降低血磷。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1214——诊断

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P384 第 2 题

14.肾绞痛发作时,首选治疗方法是

A.抗感染治疗

B.解痉止痛

C.局部热敷

D.口服中药

E.针灸

【答案】B

15.慢性肾衰竭患者出现下列检查结果,需要紧急透析治疗的是

A.血肌酐 $700\mu\text{mol/L}$

B.血钾 6.8mmol/L

C.血红蛋白 72g/L

D.血钠 130mmol/L

E.血钙 1.9mmol/L

【答案】B

【解析】当血钾 $>6.5\text{mmol/L}$,应及时给予血液透析治疗。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P967——治疗

16. 诊断肾病综合征必须具备的依据是

- A. 大量蛋白尿与血尿
 B. 高脂血症与水肿
 C. 大量蛋白尿与低蛋白血症
 D. 低蛋白血症与高血脂
 E. 水肿与低蛋白血症

【答案】C

【解析】肾病综合征中大量蛋白尿+低蛋白血症为诊断必备。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P920——诊断标准

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P491 第 6 题

17. 主要作用机制为控制支气管哮喘气道炎症的药物是

- A. H_1 受体拮抗剂
 B. 长效 β_2 受体激动剂
 C. M 受体拮抗剂
 D. 白三烯受体调节剂
 E. 茶碱

【答案】D

【解析】白三烯为重要炎症因子,故白三烯受体拮抗剂主要是控制气道炎症反应。

18. 可使肥厚型心肌病杂音减轻的药物是

- A. 美托洛尔
 B. 呋塞米
 C. 多巴胺
 D. 地高辛
 E. 硝酸甘油

【答案】A

【解析】杂音受心肌收缩力、左心室前负荷、后负荷的影响。心肌收缩力强、左心室前负荷低或左心室后负荷低均可导致杂音增强。应用 β 受体拮抗剂或下蹲位可以使杂音减轻,应用强心药、利尿剂、硝酸甘油或站立、行 Valsalva 动作(即深吸气后,在屏气状态下用力作呼气动作 10~15 秒,可增加胸腔内压力,显著减少静脉回流)均可使杂音增强。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P792——临床表现

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P245 第 3 题

19. 成人心肺复苏的合理顺序是

- A. 胸外按压—人工呼吸—开放气道
 B. 开放气道—胸外按压—人工呼吸
 C. 开放气道—人工呼吸—胸外按压
 D. 人工呼吸—胸外按压—开放气道
 E. 胸外按压—开放气道—人工呼吸

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P752——心搏骤停的外置和疗效判断

20. 膀胱 Ta 期乳头状癌的治疗方法首选

- A. 膀胱全切除术
 B. 膀胱部分全切除术
 C. 局部放疗
 D. 膀胱灌注化疗

E.经尿道膀胱肿瘤切除术

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P944——治疗

21.尺神经损伤的典型体征是

- A. Froment 征阳性
- B. 拇指对掌功能障碍
- C. 拇指感觉异常
- D. 垂腕
- E. Finkelstein 实验阳性

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1364——尺神经损伤的临床表现

22.经首次电除颤未消除心室颤动的最佳处理是

- A. 更高级别能量除颤 2 次
- B. 更高级别能量除颤 3 次
- C. 同样级别能量除颤 2 次
- D. 同样级别能量除颤 3 次
- E. 进行 2 分钟心肺复苏后再除颤

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P752——心搏骤停的处置和疗效判断

23.与脊柱结核有关的体格检查方法是

- A. 抽屈实验
- B. 直腿抬高试验
- C. “4”字实验
- D. 拾物试验
- E. 研磨试验

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1385——临床表现

24.心脏破裂的典型表现是

- A. 低血压,心音消失,无电活动
- B. 血压测不到,心音消失,无电活动
- C. 低血压,心音正常,有电活动
- D. 血压测不到,心音消失,有电活动
- E. 低血压,心音正常,无电活动

【答案】D

25.肾小球源性血尿的特点是

- A. 变形红细胞尿
- B. 终末血尿
- C. 尿痛伴血尿
- D. 初始血尿
- E. 有凝血块的尿

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P912——肾小球源性血尿与非肾小球源性血尿的鉴别

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P291 第 7 题

26. 发生肺血栓栓塞时, 应首先考虑溶栓的情况是

- | | |
|--------------|----------|
| A. 合并深静脉血栓形成 | B. 剧烈胸痛 |
| C. 严重低氧血症 | D. 持续低血压 |
| E. 明显咯血 | |

【答案】D

【解析】右心功能不全伴低血压的大块肺动脉栓塞患者应先行溶栓治疗。

27. 诊断早期股骨头坏死最敏感的检查是

- | | |
|---------|--------|
| A. B 超 | B. MRI |
| C. 血管造影 | D. CT |
| E. X 线 | |

【答案】B

28. 引起继发性肺动脉高压最常见的原因是

- | | |
|-------------|----------|
| A. 慢性阻塞性肺疾病 | B. 结缔组织病 |
| C. 肺结核 | D. 肺血栓栓塞 |
| E. 间质性肺炎 | |

【答案】A

29. 可升高 2 型糖尿病患者血中胰高血糖素样肽-1 (GLP-1) 水平的药物是

- | | |
|---------|---------|
| A. 二甲双胍 | B. 西格列汀 |
| C. 格列美脲 | D. 阿卡波糖 |
| E. 吡格列酮 | |

【答案】B

【解析】胃肠道摄入食物后会促进肠促胰岛素的分泌, 肠促胰岛素可以促进胰岛素的分泌, 抑制胰高血糖素的分泌, 调节摄食中枢等。肠促胰岛素包括胰高血糖素样肽 (GLP-1) 类似物。西格列汀可以减缓 GLP-1 的降解, 提高其血浆浓度。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1228——口服降血糖药物治疗

30. 最有助于提示室性心动过速的依据是

- | | |
|---------------|----------|
| A. QRS 波群宽大畸形 | B. 心律规则 |
| C. 心室夺获 | D. P 波消失 |
| E. ST 段下斜型压低 | |

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P746——室性心动过速

31. 双侧支气管扩张患者反复大咯血, 最佳的治疗手段是

- A. 长期口服抗生素预防感染
- B. 支气管动脉栓塞
- C. 手术切除病变肺组织
- D. 长期口服钙通道阻滞剂
- E. 支气管镜下介入治疗

【答案】B

【解析】病变局限的支扩大出血, 可考虑手术切除病变肺组织; 病变广泛者, 可考虑支气管动脉栓塞。

32. 慢性阻塞性肺疾病最主要的病理生理特征是

- A. 气道结构的重塑
- B. 肺泡通气量下降
- C. 持续性气流受限
- D. 肺泡弹性回缩力减退
- E. 明显的肺外效应

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P658——病理生理

33. 心包穿刺术的绝对禁忌证是

- A. 心脏压塞
- B. 化脓性心包炎
- C. 肿瘤性心包炎
- D. 结核性心包炎
- E. 主动脉夹层

【答案】E

【解析】主动脉夹层伴心包积血而未危及生命者, 在短时间内是心包穿刺的禁忌证(穿刺可使夹层血肿扩大), 该类患者应立即进行手术治疗。

34. 下列最常表现为吸气性呼吸困难的疾病是

- A. 胸腔积液
- B. 支气管哮喘
- C. 气管肿物
- D. 慢性阻塞性肺疾病
- E. 自发性气胸

【答案】C

【解析】A、E 为混合性呼吸困难, B、D 为呼气性呼吸困难, C 为吸气性呼吸困难。吸气性呼吸困难的患者常有刺激性干咳, 查体可见“三凹征”。

35. 转复长 QT 间期所致的尖端扭转型室速的最适宜药物是

- A. 肾上腺素
- B. 利多卡因
- C. 普罗帕酮
- D. 硫酸镁
- E. 胺碘酮

【答案】D

【解析】长 QT 间期所致的尖端扭转型室速治疗首选静脉注射镁盐。

36. 最有助于诊断风湿性心脏瓣膜病二尖瓣狭窄的体征是

- A. Graham—Steell 杂音
- B. 面颊部呈紫红色
- C. 心浊音界呈梨形
- D. 第二心音亢进
- E. 心尖部舒张期隆隆样杂音

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P776——临床表现

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P241 第 3 题

37. 影响骨折愈合的最重要因素是

- | | |
|----------|---------|
| A. 软组织损伤 | B. 神经损伤 |
| C. 静脉血栓 | D. 断端血供 |
| E. 健康状况 | |

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1329——影响骨折愈合的因素

38. 腰麻术后出现急性尿潴留,最常用的处理方法是

- | | |
|------------|----------------|
| A. 热敷 | B. 耻骨上膀胱穿刺抽吸尿液 |
| C. 耻骨上膀胱造瘘 | D. 导尿 |
| E. 针灸 | |

【答案】D

39. 心绞痛发作时疼痛的典型部位是

- | | |
|---------|--------|
| A. 左臂内侧 | B. 下颌 |
| C. 心前区 | D. 左肩部 |
| E. 胸骨后 | |

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P764——临床表现

40. 由下丘脑产生的激素是

- | | |
|----------|-------------|
| A. 泌乳素 | B. 促肾上腺皮质激素 |
| C. 血管紧张素 | D. 生长激素 |
| E. 血管加压素 | |

【答案】E

【解析】催乳素和生长激素由腺垂体产生,血管加压素和催产素由下丘脑产生并储存在神经垂体中。

41. 蛋白尿的定义是 24 小时尿蛋白超过

- | | |
|----------|----------|
| A. 150mg | B. 100mg |
| C. 200mg | D. 250mg |
| E. 300mg | |

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P913——概念

42. 治疗脆弱拟杆菌感染所致吸入性肺脓肿首选的抗菌药物是

- A. 万古霉素
B. 庆大霉素
C. 青霉素
D. 克林霉素
E. 红霉素

【答案】D

【解析】吸入性肺脓肿多为厌氧菌感染，一般均对青霉素敏感，仅脆弱拟杆菌对青霉素不敏感，但对林可霉素、克林霉素和甲硝唑敏感。

命中考点：《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P686——治疗

43. 库欣综合征分泌过多的激素是
- A. 醛固酮
B. 肾上腺素
C. 皮质醇
D. 去甲肾上腺素
E. 肾素

【答案】B

命中考点：《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1216——库欣综合征

近似考题：《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P44 第 8 题

44. 儿童化脓性骨髓炎的脓肿不易进入关节腔的原因是
- A. 关节囊对关节腔具有保护作用
B. 儿童关节对细菌的抵抗力强
C. 骺板起屏障作用
D. 脓液容易局限和吸收
E. 脓肿容易经由软组织溃破

【答案】C

45. 女, 55 岁, 风湿性心脏瓣膜病二尖瓣狭窄 15 年, 心房颤动 1 年, 无活动后心悸和气短。无夜间阵发性呼吸困难, 既往无高血压、糖尿病、脑血管疾病史。超声心动提示左房内径 5.3cm, 患者抗栓治疗的首选药物是

- A. 华法林
B. 潘生丁
C. 氯吡格雷
D. 阿司匹林
E. 替罗非班

【答案】A

【解析】房颤患者预防体循环栓塞首选华法林, 华法林能抑制维生素 K 参与的凝血因子 II、VIII、IX、X 的合成, 在体内发挥缓慢而持久的抗凝作用。阿司匹林有抗血小板的作用, 是冠心病患者预防心血管事件发生的首选药物。

命中考点：《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P74——心房颤动

46. 男, 56 岁, 咳嗽、胸闷、憋气 2 天, 持续不缓解。查体: 左侧呼吸运动减低, 叩诊呈鼓音, 首选的治疗措施是

- A. 呼吸机辅助呼吸
B. 低流量吸氧
C. 胸腔闭式引流
D. 胸腔穿刺排气
E. 解痉平喘

【答案】D

47.女,30岁。右肘关节外侧疼痛半年,查体:右侧 Mills 征阳性。X线检查未见异常。治疗和预防该病复发的关键是

- A.局部按摩
B.功能锻炼
C.早期手术
D.限制腕关节活动
E.药物治疗

【答案】D

【解析】Mills 征阳性提示肱骨外上髁炎,是由于腕部活动过度造成的慢性疾病,又称“网球肘”,在肱骨外上髁、桡骨头及二者之间有局限性、极敏锐的压痛。治疗和预防的关键是限制腕关节的活动。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1367——肱骨外上髁炎临床表现及诊断

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P438 第 5 题

48.男,25岁。1年来反复镜下血尿,相差显微镜检查为变形红细胞,尿蛋白 0.4g/d,无水肿、高血压及肾功能减退。应首先考虑的诊断是

- A.无症状性蛋白尿和(或)血尿
B.急性肾小球肾炎
C.泌尿系统肿瘤
D.慢性肾小球肾炎
E.尿路结石

【答案】A

【解析】成人尿蛋白量超过 150mg/d 称为蛋白尿,故该患者有蛋白尿。患者有蛋白尿和血尿,但无临床症状,符合无症状性蛋白尿和(或)血尿的诊断。故选 A。

49.男,32岁。车祸致左大腿受伤。X线片示坐骨皮质连续性中断。对诊断最有意义的临床表现是

- A.瘀斑
B.活动受限
C.压痛
D.肿胀
E.反常活动

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1324——临床表现

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P427 第 22 题

50.男孩,5岁。排尿困难,尿流中断,跑动或改变体位姿势后又可排尿。最可能的疾病是

- A.尿道狭窄
B.神经源性膀胱
C.前尿道结石
D.尿道瓣膜
E.膀胱结石

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P938——临床表现

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P300 第 4 题

51.男,73 岁。因脑梗死住院治疗 1 个月,病情基本稳定。3 天前受凉后出现发热,咳嗽,咳红色胶冻性粘痰,查体:T 38.7℃,呼吸急促,口唇发绀,右上肺叩诊浊音,可闻及支气管呼吸音和少量湿啰音,典型表现是咳砖红色痰,胸部 X 线片示右上肺大片状阴影,其中可见多个空洞。该患者最可能的诊断是

- A.真菌性肺炎
- B.肺炎链球菌肺炎
- C.肺炎克雷伯杆菌肺炎
- D.干酪性肺炎
- E.厌氧性肺炎

【答案】C

【解析】肺炎克雷伯杆菌肺炎常见于年老体弱、免疫力受损的患者,肺炎克雷伯杆菌可引起组织的液化和坏死,胸片可见肺叶实变、叶间隙下坠、蜂窝状脓肿。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P681——肺炎克雷伯杆菌肺炎临床表现

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P202 第 5 题

52.女,48 岁。风湿性心脏瓣膜病 10 年。喘憋 1 天。查体 BP 120/70mmHg,端坐位,双肺可闻及湿性啰音,心率 106 次/分,律齐,心尖部可闻及舒张期杂音,双下肢无水肿。缓解该患者喘憋的首选药物为

- A.美托洛尔
- B.胺碘酮
- C.呋塞米
- D.普罗帕酮
- E.地高辛

【答案】C

【解析】患者二尖瓣狭窄并发肺水肿,应首选扩张静脉系统、降低心脏前负荷的硝酸酯类药物,备选答案无。但呋塞米可利尿,并有扩张静脉的作用,有利于肺水肿的缓解,故选 C。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P778——治疗

53.女,55 岁。骨折术后卧床 3 天,突发呼吸困难。既往高血压病史 10 年,血压控制良好。查体:BP 120/80mmHg。下列体征对鉴别诊断肺栓塞和左心衰竭最有意义的是

- A.颈静脉怒张
- B.口唇发绀
- C.心动过速
- D.呼吸过快
- E.双下肢水肿

【答案】A

【解析】肺栓塞有颈静脉怒张的表现,而左心衰竭无。

54.男,68 岁,进行性排尿困难 5 年,夜尿 4~5 次。近期曾发生急性尿潴留 2 次,既往体健。心肺功能正常。前列腺 II 度肿大,血清 PSA 3.1μg/L,膀胱残余尿 80ml,首选的手

术方法是

- A. 双侧睾丸切除
 B. 经会阴前列腺切除
 C. 经尿道前列腺切除
 D. 耻骨上前列腺切除
 E. 耻骨后前列腺切除

【答案】C

55. 女, 15 岁, 双下肢及颜面水肿 2 周, 查尿蛋白 5.2g/d, 尿 RBC 0~2/HP, 血白蛋白 28g/L, Scr 90 μ mol/L, 抗核抗体阴性。应首选的治疗措施是

- A. 低分子肝素抗凝
 B. 静脉点滴白蛋白
 C. 口服 ACEI 药物
 D. 泼尼松联合环磷酰胺
 E. 泼尼松足量足疗程

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P921——糖皮质激素的应用

56. 男, 60 岁, 突发性心前区疼痛 2 小时, 既往有高脂血症和吸烟史, 无高血压和出血性疾病史。查体: BP 150/90mmHg。双肺呼吸音清。心率 89 次/分, 律齐。心电图示 II、III 和 aVF 导联 ST 段下斜型压低 0.2mv, V₁~V₆ 导联 ST 段弓背向上抬高 0.3~0.5mv。该患者最关键的治疗是

- A. 吸氧
 B. 口服硝苯地平控释片
 C. 再灌注治疗
 D. 口服速效救心丸
 E. 口服血管紧张素转换酶抑制剂

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P771——治疗

57. 女, 40 岁。颈肩痛 3 个月, 伴右手麻木, 无视物模糊, 行走不稳和眩晕, 查体: 颈部压痛, 伴右上肢放射痛, 压头试验阳性, 右手“虎口区”麻木, 右侧伸腕肌肌力减弱, Hoffmann 征阳性。考虑颈椎病, 最可能的类型是

- A. 神经根型
 B. 交感神经型
 C. 椎动脉型
 D. 脊髓型
 E. 复合型

【答案】A

【解析】患者有颈肩痛、右上肢放射痛, 压头试验阳性, 提示神经根型颈椎病。且临床中神经根型颈椎病发病率最高, 应首先考虑。Hoffmann 征阳性是脊髓型的提示, 但患者无行走不稳, 且题干中无脊髓型的其他表现, 故不选 E。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1370——临床表现

58. 女, 23 岁, 工人, 发热, 干咳 1 个月, 发病时胸部 X 线片示肺纹理增多, 先后使用“青霉素”“头孢菌素”抗感染治疗半月余症状未见好转。查体: T 39.8 $^{\circ}$ C, 消瘦, 双侧颈部可触

及多个成串小淋巴结,双肺未闻及干湿啰音。PPD 试验(一),胸部 X 线片示双肺弥漫分布直径约 2mm 的小结节影,该患者最可能的诊断是

- A. 真菌性肺炎
- B. 病毒性肺炎
- C. 过敏性肺炎
- D. 急性粟粒性肺结核
- E. 细菌性肺炎

【答案】D

【解析】急性粟粒性肺结核会导致机体免疫反应低下,故 PPD 实验阴性;其典型 X 线表现为双肺的大小、密度、分布三均匀的粟粒状阴影;且患者有颈部淋巴结结核的表现。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P690——诊断与鉴别诊断

59.女,72 岁,摔倒后左肩部着地受伤,肩部肿胀,疼痛,肩关节活动障碍。X 线片显示左侧肱骨外科颈骨皮质连续性中断,无明显移位,首选的治疗方法是

- A. 三角巾悬吊贴胸位固定
- B. 石膏外固定
- C. 切开复位内固定
- D. 小夹板外固定
- E. 尺骨鹰嘴骨牵引+夹板固定

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1336——分型及治疗

60.女,20 岁。活动后胸闷,气短 2 天。3 周前曾咳嗽持续发热 1 周。既往体健。查体:面色苍白、双肺呼吸音清,心界向左下扩大,心率 120 次/分,频发早搏,第一心音减弱, $P_2 > A_2$,心尖区可闻见 2/6 级收缩期杂音。实验室检查:血肌钙蛋白增高。该患者最可能的诊断是

- A. 病毒性心肌炎
- B. 急性心肌梗死
- C. 急性肺栓塞
- D. 慢性心力衰竭
- E. 感染性心内膜炎

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P794——诊断

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P246 第 7 题

61.女,45 岁。2 周前发热、咳嗽、咳黄痰、胸闷、胸痛,经抗炎治疗好转。现再次高热,咳嗽无痰,感胸闷。查体:T 38.5℃,P 115 次/分,R 25 次/分,气管明显左移,右肺语颤减弱、叩诊呈实音、呼吸音消失,血 WBC $22 \times 10^9/L$,N 0.89。该患者首先考虑的诊断是

- A. 肺脓肿
- B. 肺炎链球菌肺炎
- C. 阻塞性肺炎
- D. 脓胸
- E. 肺不张

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P719——急性脓胸

62.女,55 岁。咳嗽,咳脓血痰伴高热 2 天。糖尿病病史 8 年。胸部 X 线片示双肺多发团片状阴影,有空洞形成。查体:背部可见多个疖肿,双肺少量湿性啰音,心腹未见异常。最可能的诊断为

- A.大肠埃希菌肺炎
 B.军团菌肺炎
 C.血源性肺脓肿
 D.肺炎克雷伯杆菌肺炎
 E.肺结核

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P685——临床表现

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P207 第 7 题

63.男,68 岁。反复咳嗽,咳痰 15 年,加重伴发热 3 天。吸烟史 40 年,1 包/天。查体: T38.8℃,口唇发绀。桶状胸,双肺可闻及哮鸣音和湿啰音。血 WBC $10.3 \times 10^9/L$, N 0.85。该患者最可能的诊断是

- A.支气管肺癌
 B.肺血栓栓塞
 C.慢性阻塞性肺疾病
 D.支气管扩张
 E.支气管哮喘

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P658——临床表现、临床分型

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P193 第 14 题

64.男孩,2 岁。右腹股沟包块,卧位可消失,右侧阴囊内未触及睾丸。B 超示右侧睾丸位于右腹股沟。正确的治疗方法是

- A.腹股沟疝高位结扎术
 B.睾丸下降固定术
 C.右侧睾丸切除
 D.疝囊高位结扎+睾丸下降固定术
 E.绒毛膜促性腺激素治疗

【答案】D

【解析】1 岁以内睾丸有自行下降的可能,若 1 岁以后睾丸仍未下降,应给予绒毛膜促性腺激素治疗;激素治疗无效,应于 2 岁以前行睾丸下降固定术。患儿已 2 岁,且右侧睾丸表现为易复性腹股沟斜疝,应行疝囊高位结扎+睾丸下降固定术。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P960——治疗

65.男,43 岁。进行性活动后心悸、气短 5 年。1 周前受凉后咳嗽、咳黄痰,喘憋加重,夜间不能平卧。否认慢性咳嗽史,查体:BP 100/60mmHg,双肺可闻及细湿啰音,心界向左扩大,心率 115 次/分,律齐,P₂亢进。该患者喘憋的可能原因是

- A.心力衰竭
 B.急性心肌炎

C.慢性支气管炎急性发作

D.肺栓塞

E.支气管哮喘

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P733——临床表现

66.女,38岁,两周前突发颈前部疼痛,右侧尤甚,吞咽时疼痛加重,伴有午后低热,4周前曾有咳嗽、咽痛。查体:无突眼,甲状腺2度肿大,右侧可触及直径1厘米质硬结节,有触痛。实验室检查:FT₃升高,FT₄升高,TSH降低,TPOAb和TGAb均阴性,¹³¹I摄取率降低。最可能的诊断是

A.慢性淋巴细胞性甲状腺炎

B.甲状腺功能亢进症

C.亚急性甲状腺炎

D.甲状腺肿瘤

E.单纯性甲状腺肿

【答案】C

【解析】甲状腺激素水平增高,甲状腺摄碘能力降低,是亚急性甲状腺炎的典型表现。亚急性甲状腺炎由病毒感染引起,甲状腺滤泡结构破坏,释放出甲状腺激素,同时损伤的甲状腺细胞摄碘能力下降。甲状腺巨噬细胞浸润明显,轻中度肿大,质硬、有触痛。

67.男,18岁,发作性胸闷3年、再发两天。发作多以凌晨为著,无咯血和发热,发作时不经药物治疗可直接缓解。查体:双肺呼吸音清晰。该患者最可能的诊断是

A.慢性支气管炎

B.过敏性肺炎

C.左心衰竭

D.支气管哮喘

E.胃食管反流病

【答案】D

【解析】夜间及凌晨发作或加重是哮喘的重要临床特征,以胸闷为唯一症状的不典型哮喘称为胸闷变异性哮喘。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P667——临床表现

68.男,62岁,胸痛两个月。胸部X线片检查发现右上肺外周3.0cm×2.5cm阴影,下述检查对确定诊断最有价值的

A.肿瘤标志物检测

B.CT或超声引导下经胸壁活检

C.胸部MRI

D.胸部CT

E.支气管动脉造影

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P696——辅助检查

69.男,59岁。进食哽噎1月余,症状逐渐加重。近半年来左胸痛,服用“救心丸”无改善。为明确诊断,首选的检查是

A.胸部MRI

B.超声心电图

C.胃镜

D.心电图

E.胸部 CT

【答案】C**命中考点:**《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P820——辅助检查**近似考题:**《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P259 第 47 题

70.男,32 岁。右上臂被重物砸伤 2 小时。局部疼痛,肿胀,活动受限。查体:右中下部可见畸形及异常活动,垂腕,手指不可伸直,最可能合并损伤的神经

A.桡神经

B.正中神经

C.腋神经

D.肌皮神经

E.尺神经

【答案】A**命中考点:**《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1364——桡神经损伤的临床表现**近似考题:**《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P437 第 3 题

71.男,40 岁,性欲降低及勃起功能障碍 1 年,伴头痛,无视野缺损和视觉障碍,无乳腺增生,无药物服用史。查体:睾丸质软。实验室检查:血清泌乳素水平 $700\mu\text{g/L}$ (正常 $<15\mu\text{g/L}$)。头颅 MRI 发现蝶鞍部有一 $2.5\text{cm}\times 2.0\text{cm}\times 1.5\text{cm}$ 大小的肿物,位于视神经交叉下方 5mm,并延伸进入双侧海绵窦。此时该患者处理的最佳措施是

A.开颅手术切除肿瘤

B.口服溴隐亭

C.经蝶窦手术切除肿瘤

D.放射治疗

E.定期复查垂体 MRI

【答案】B

【解析】催乳素瘤的治疗首选多巴胺激动剂,如溴隐亭。当药物治疗时瘤体依然增大、垂体卒中、不能耐受药物治疗或药物治疗抵抗时,考虑手术治疗。故选 B。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1192——治疗

72.女,56 岁。两小时前不胜摔倒,左髋部疼痛,无法行走。X 线检查示左股骨颈中段骨折并有短缩完全移位,Pauwels 角为 60° 。该患者股骨颈骨折的类型是

A.外展型骨折

B.Garden I 型骨折

C.Garden III 型骨折

D.内收型骨折

E.Garden II 型骨折

【答案】D

【解析】Pauwels 角指远端骨折线与两侧髂嵴连线的夹角,大于 50° 为内收型骨折,此时骨折面接触少,属于不稳定骨折;小于 30° 为外展型骨折,骨折面接触多,属于稳定型骨折。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1345——临床表现

73.男性,22 岁。突发右胸痛 2 天,无发热、咳嗽。查体:T 37.2°C ,右胸廓稍饱满,语音

震颤减弱,叩诊呈鼓音,呼吸音消失。该患者最可能的诊断是

- A. 肺不张
- B. 胸腔积液
- C. 肺炎
- D. 肺气肿
- E. 气胸

【答案】E

【解析】题眼“鼓音”提示气胸,症状和其他体征均符合气胸。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P723——临床表现

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P221 第 3 题

74.男,26 岁。发现高血压 1 年。查体:双上肢血压 180/100mmHg,双下肢血压 140/80mmHg,BMI 20,腰围 80cm。正力体型。心尖区可闻及 2/6 级收缩期杂音,肩胛间区可闻及血管杂音,余瓣膜区未闻及杂音。该患者最可能的诊断是

- A. 嗜铬细胞瘤
- B. 皮质醇增多症
- C. 原发性醛固酮增多症
- D. 主动脉缩窄
- E. 肾动脉狭窄

【答案】D

【解析】主动脉缩窄是降动脉的先天性狭窄,表现为上肢血压高,下肢血压低,在胸骨左缘 2~3 肋间和背部肩胛区可闻及喷射性、收缩期杂音。此外,主动脉缩窄近端血压增高可引起左心室后负荷加重,左心室肥大,导致二尖瓣关闭不全,出现心尖区收缩期杂音。

75.男,56 岁。陈旧前壁心肌梗死 1 年。糖尿病病史 3 年,无高血压病史。有吸烟史,查体:BP 130/80mmHg,心率 67 次/分,律齐。该患者血低密度脂蛋白胆固醇的治疗目标值是低于

- A. 3.11mmol/L
- B. 3.37mmol/L
- C. 2.59mmol/L
- D. 4.14mmol/L
- E. 2.07mmol/L

【答案】E

76.男,70 岁。上、下楼梯时双膝关节疼痛 2 年。查体:双手远端指间关节背侧可见 Heberden 结节,双膝活动有摩擦感。实验室检查:ESR 正常,RF 15 IU/ml(正常 < 20 IU/ml)。最可能的诊断是

- A. 痛风性关节炎
- B. 风湿性关节炎
- C. 类风湿关节炎
- D. 骨关节炎
- E. 半月板损伤

【答案】D

【解析】题眼是 Heberden 结节,提示骨关节炎。此外,题干未涉及尿酸值,排除 A;RF 正常,排除 C;B 有游走性大关节疼痛;E 不会出现指间关节的结节。故选 D。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1377——临床表现

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P440 第 4 题

77.男,47岁。扩张型心肌病10年,活动后喘憋进行性加重,因病卧床半年。下床排便后喘憋突然加重1小时。查体:R 30次/分,BP 90/60mmHg,口唇紫绀,右下肺可闻及少许湿性啰音,心界向左扩大,心率90次/分,律齐,心音低钝,P₂亢进,双下肢无水肿。心电图示右束支传导阻滞。血气分析示 PaO₂ 48mmHg,PaCO₂ 35mmHg。该患者喘憋突然加重的最可能的原因是

- | | |
|----------|---------|
| A.急性心包炎 | B.肺血栓栓塞 |
| C.急性心肌梗死 | D.心绞痛 |
| E.肺炎 | |

【答案】B

【解析】题眼“卧床半年”、“突然加重”提示肺血栓栓塞。P₂亢进、右束支传导阻滞提示肺动脉和右心压力升高,结合低氧血症,故选B。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P700——临床表现

78.女,64岁。近2个月出现双下肢水肿。2型糖尿病病史10年。查体:BP 140/100mmHg,神志清楚,营养差,甲状腺无肿大,双肺未闻及干、湿性啰音,心率70次/分,律齐。肝脾未触及,双下肢明显凹陷性水肿。实验室检查:空腹血糖9.6mmol/L,血清总胆固醇7.6mmol/L,低密度脂蛋白胆固醇4.6mmol/L,血浆白蛋白28g/L。为明确水肿原因,首先应进行的检查是

- | | |
|---------|--------|
| A.肾功能 | B.肝功能 |
| C.尿蛋白定量 | D.双肾B超 |
| E.双肾CT | |

【答案】C

【解析】患者糖尿病10年后出现水肿,低蛋白血症,考虑糖尿病肾病应首先检查尿蛋白定量。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1226——糖尿病慢性并发症

79.男,70岁。咳嗽、咳痰30年,劳力性呼吸困难2年。加重伴双下肢水肿、尿少3天入院。胸部X线片检查最可能出现的心脏病特点是

- | | |
|--------|--------|
| A.靴形心 | B.梨形心 |
| C.烧瓶心 | D.心尖上翘 |
| E.普大形心 | |

【答案】D

【解析】肺心病可出现右心室肥大,心脏向左扩大,心尖上翘;左心室肥大则导致心脏向左下扩大。慢性肺心病由于缺氧、酸中毒等,也可导致左心室肥大,出现普大型心。题干问的是最可能出现的,故选D。

80.女,69岁,呼吸困难伴左胸痛2天。活动后呼吸困难加重,胸痛于吸气时加重,无咳嗽、咳痰、咯血和发热,结肠癌术后化疗中。查体:BP 110/75mmHg,口唇发绀,左下肺可闻

及少许细湿啰音,心率 96 次/分,律齐, $P_2 > A_2$,胸骨左缘第 5 肋间可闻及 2/6 级收缩期杂音。首先考虑的诊断是

- A.重症肺炎
- B.急性左心衰竭
- C.肺血栓栓塞
- D.急性心肌梗死
- E.结肠癌肺转移

【答案】C

【解析】无咳嗽、咳痰可排除 A 和 B。D 表现为胸骨后疼痛明显。患者正在结肠癌术后化疗中,不选 E;且结肠癌肺转移的症状没有题干表现的那么严重。C 表现为肺动脉和右心的压力增高,由于右心室的扩大可出现相对性三尖瓣关闭不全,三尖瓣听诊区出现收缩期杂音,即“胸骨左缘第 5 肋间可闻及 2/6 级收缩期杂音”,故选 C。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P700——临床表现

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P213 第 10 题

81.男,34 岁,咯鲜血半小时。就诊时仍有鲜血咯出。咳嗽不显著,无咳嗽及呼吸困难。既往有类似情况出现,自行停止,否认慢性心肺疾病史。查体:双肺呼吸音清晰。胸部 X 线片未见异常。为明确诊断,首先应进行的检查是

- A.上呼吸道检查
- B.支气管镜
- C.支气管动脉造影
- D.胸部 CT
- E.肺动脉造影

【答案】D

【解析】患者“干性支气管扩张”的可能性较大,高分辨胸部 CT 是确诊支气管扩张的重要依据,故选 D。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P674——诊断与鉴别诊断

82.男,38 岁。间断活动后尿色加深 1 周。既往反复痛风发作 2 年。查体:BP 120/80mmHg。尿常规:RBC 40~50/HP,WBC 3~5/HP,尿蛋白(-)。首选的进一步检查是

- A.尿脱落细胞检查
- B.肾脏增强 CT
- C.尿红细胞形态
- D.清洁中段尿培养
- E.肾穿刺活检

【答案】C

83.男,38 岁,发热 2 周,胸闷 5 天。无咳嗽、咳痰和咯血,曾使用“三代头孢菌素”抗感染治疗无效。查体:T 37.8℃,BP 140/90mmHg。右下肺呼吸音消失,语音共振减弱。胸部 X 线片示右下肺大片状密度增高影,上缘呈外高内低弧形,为明确诊断应首选的检查是

- A.超声心动图
- B.支气管镜
- C.胸部 CT
- D.胸腔穿刺抽液
- E.血肿瘤标志物

【答案】D

【解析】胸片提示胸腔积液,明确诊断首选穿刺抽液。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P715——诊断与鉴别诊断

84.男,25 岁。肉眼血尿、进行性尿量减少伴恶心、呕吐 1 周。查体:BP 160/90mmHg,双下肢中度凹陷性水肿,尿蛋白(++),尿 RBC 20~30/HP,血 Hb 90g/L,Scr 490 μ mol/L,B 超示双肾增大,最可能的临床诊断是

- | | |
|------------|---------------|
| A.急性肾盂肾炎 | B.慢性肾小球肾炎急性发作 |
| C.急性肾小球肾炎 | D.急性间质性肾炎 |
| E.急进性肾小球肾炎 | |

【答案】E

【解析】以急性肾炎综合征起病,并伴有早期出现少尿,肾功能恶化。考虑急进性肾小球肾炎。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P918——急进性肾小球肾炎

85.女,42 岁,阵发性心悸 3 年,无心跳间歇感。发作时按摩颈动脉心悸可突然终止。发作时心电图显示:心室率 190 次/分,逆行 P 波,QRS 波群形态与时限正常。该患者最可能的诊断是

- | | |
|-------------|--------------|
| A.窦性心动过速 | B.心房扑动 |
| C.阵发性室性心动过速 | D.阵发性室上性心动过速 |
| E.心房颤动 | |

【答案】D

【解析】无心跳间歇感提示无室性早搏后的代偿间歇。发作时按摩颈动脉心悸可突然终止、逆行 P 波和 QRS 波形态和时限正常提示阵发性室上性心动过速。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P745——阵发性室上性心动过速

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P229 第 3 题

86.男,70 岁。因咳嗽、咳痰 30 年,气短 5 年,近期加重前来体检。胸部 X 线片显示双肺透光度增加。其胸部查体最可能出现的体征是

- | | |
|---------|---------|
| A.叩诊过清音 | B.呼吸音增强 |
| C.叩诊实音 | D.语颤增强 |
| E.三凹征 | |

【答案】A

【解析】肺透光增强提示过度充气,叩诊呈过清音。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P658——临床表现、临床分型

87.男,70岁,咳嗽半年,声音嘶哑1个月。胸部X线片显示左肺门明显增大,胸部CT显示左肺上叶可见直径4cm的块状影,主动脉弓下及弓旁淋巴结明显肿大、融合。该患者最可能的诊断是

- A.阻塞性肺炎
B.肺脓肿
C.肺结核
D.纵膈淋巴瘤
E.肺癌

【答案】E

【解析】老年男性,首先考虑癌变,又肺叶可见块状影,可排除D,故选E。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P695——临床表现

近似考题:《2015年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P212第10题

88.男,33岁。咳嗽、痰中带血伴乏力2周。胸部X线片显示左上肺少量斑片状阴影,可见少许不规则透亮区,未见液平。为明确诊断宜首先采取的措施是

- A.痰涂片抗酸染色
B.痰细菌培养+药敏
C.痰细胞学检查
D.痰涂片找真菌
E.痰涂片找含铁血黄素细胞

【参考答案】B

【解析】青年男性,乏力、痰中带血,胸片有斑片状阴影及透亮区,提示浸润型肺结核。结核病诊断的“金标准”是培养法,故明确诊断应选痰细菌培养;但临床上首先采取的措施通常是痰涂片抗酸染色。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P689——辅助检查

89.女,34岁。风湿性心脏瓣膜病主动脉瓣狭窄9年,进行性活动耐力减低,近一年来,每于剧烈运动中发生晕厥。无高血压、糖尿病、高脂血症病史。查体:BP 100/70mmHg。心率78次/分,律齐,主动脉瓣区可闻及收缩期喷射性杂音。超声心动图提示左心室增大,LVEF 40%,主动脉瓣瓣口面积 1.1cm^2 ,平均压力阶差55mmHg,跨瓣峰速度5.4m/s。对该患者最恰当的处置是

- A.每日口服单硝酸异山梨酯
B.晕厥时硝酸甘油急救
C.避免竞技性运动,其他体力活动不受限制
D.口服阿托伐他汀
E.主动脉瓣置换术

【答案】E

【解析】轻中度主动脉狭窄可终生无症状,当出现症状时,主要表现为晕厥、心绞痛和呼吸困难。有症状即是瓣膜置换的手术指征。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P782——治疗

近似考题:《2015年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P242第10题

90.男,54岁,发作性胸痛3天,于劳累时发作,休息5分钟可以缓解,每天发作3~4次,最近2小时内上述症状发作2次,每次持续20分钟。该患者最恰当的处理措施是

- A. 立即收住院行运动负荷试验
- B. 门诊预约超声心动图检查
- C. 门诊预约动态心动图检查
- D. 立即收住院监测心电图和血肌钙蛋白
- E. 立即收住院行胸部 X 线片检查

【答案】D

【解析】由题干可知,该患者近期胸痛发作频率增高,持续时间较长,考虑不稳定型心绞痛不排除心肌梗死,应收住院检查心电图和肌钙蛋白。

91.男,20岁,闭合性胸外伤5小时。查体:口唇发绀,端坐呼吸,左侧胸壁触及皮下气肿,气管右偏,左侧呼吸音消失。正确的急救措施是

- A. 急诊开胸探查
- B. 心包穿刺
- C. 左胸腔穿刺排气
- D. 加压吸氧
- E. 气管插管

【答案】C

【解析】患者为张力性气胸,治疗首先穿刺排气缓解症状。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P723——治疗

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P221 第 6 题

92.男,68岁,陈旧性心肌梗死5年。规律服用培哚普利、美托洛尔、阿司匹林治疗,无胸痛发作。查体无异常。实验室检查:血 TC 5.0mmol/L, LDL-C 2.9mmol/L, TG 5.9mmol/L, HDL-C 0.9mmol/L。该患者目前首选的降脂药物为

- A. 瑞舒伐他汀
- B. 考来烯胺
- C. 依折麦布
- D. 非诺贝特
- E. 阿托伐他汀

【答案】D

【解析】高血脂以甘油三酯升高为主(TG>2.2mmol/L),治疗选择贝特类降脂药。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P763——血脂紊乱的分类、诊断及治疗

93.女,22岁,受凉后出现寒战、发热,咳嗽,咳少许黏痰3天,自服感冒药后热退,查体:T 39.5℃,急性病容,右肺呼吸音减弱,语音震颤增强,血 WBC $13.4 \times 10^9/L$, N 0.87,胸部 X 线片显示右下肺大片状模糊阴影。该患者抗感染治疗不宜首选的是

- A. 青霉素
- B. 左氧氟沙星
- C. 阿莫西林
- D. 头孢曲松
- E. 阿米卡星

【答案】E

【解析】患者考虑大叶性肺炎,治疗药物中阿米卡星对肺炎链球菌等革兰阳性球菌治疗效果差。

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P202 第 11 题

94.男,55 岁,间歇性全程无痛肉眼血尿 2 个月。静脉尿路造影可见右肾盂充盈缺损。首先考虑的疾病是

- A.肾盂肾炎
- B.肾结石
- C.肾结核
- D.肾癌
- E.肾盂癌

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P941——诊断与鉴别诊断

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P302 第 9 题

95.女,38 岁,右肩部外伤后疼痛、活动受限 2 小时。查体:右侧肩胛盂处有空虚感,Dugas 征阳性。X 线检查未见骨折,首选的治疗方法是

- A.外展支具固定
- B.肩部绷带固定
- C.三角巾悬吊固定
- D.切开复位
- E.麻醉下 Hippocrates 法复位

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1357——肩关节脱位治疗

96.男,46 岁,活动耐力进行性下降 5 年,近半年来平地步行 50 米左右即感呼吸困难。近日呼吸道感染后症状加重,伴夜间阵发性呼吸困难。查体:平卧位,颈静脉怒张,肝颈静脉回液征阳性,双肺可闻及细湿啰音,双下肢凹陷性水肿。目前该患者的心衰类型为

- A.急性左心衰竭
- B.全心衰竭
- C.急性右心衰竭
- D.慢性右心衰竭
- E.慢性左心衰竭

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P733——临床表现

97.男,68 岁,高血压 15 年,规律服用氢氯噻嗪和卡托普利降压,近三天来腹泻,呈稀水样便,尿量 300~400ml/d,实验室检查:肌酐 $158\mu\text{mol/L}$,血尿素氮 19mmol/L ,尿渗透压 $600\text{mOsm/kg}\cdot\text{H}_2\text{O}$ 。患者出现上述异常检测结果的最可能原因是

- A.急性间质性肾炎
- B.肾后性梗阻
- C.药物不良反应
- D.急性肾小管坏死
- E.血容量减低

【答案】E

【解析】利尿剂使用中出现急性腹泻导致的失液,血容量低导致肾前性肾功能不全。

98. 女孩, 3 岁。1 个小时前被牵拉右前臂后哭闹不安, 不肯用右手持物。查体: 右前臂处于半屈旋前位, 右肘部轻度压痛, 无明显肿胀。X 线检查未见明显异常。最可能的诊断是

- A. 桡骨头半脱位
 B. 桡神经损伤
 C. 正中神经损伤
 D. 肘关节脱位
 E. 尺神经损伤

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1357——临床表现及诊断

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P435 第 6 题

99. 男孩, 12 岁。诊断为左胫骨近端骨髓炎, 经局部引流后症状好转, 但目前局部仍有窦道流脓。X 线检查显示有大块死骨及新生骨, 有包壳形成。最主要的治疗措施是

- A. 清除病灶
 B. 间断应用抗生素
 C. 窦道刮除术
 D. 大剂量抗生素
 E. 石膏固定

【答案】A

【解析】有新生骨和包壳, 提示慢性骨髓炎, 此时治疗的关键是清除病灶和消灭死腔。C 只是清理了窦道, 但骨内的原发病灶仍存在。D 主要用于急性骨髓炎, 且在治疗后 2~3 天不能控制症状的应立即行骨皮质钻孔引流。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1382——治疗

100. 女, 60 岁。右髋部疼痛 20 余年, 近 2 年加重。步行 200 米即出现明显髋痛, 不能盘腿, 髋关节内外旋均受限。X 线检查示右髋骨关节间隙消失, 关节边缘骨质增生, 股骨头变扁, 头臼失去正常对合关系。首先的治疗方法是

- A. 关节镜清理术
 B. 人工全髋关节置换术
 C. 股骨近端截骨术
 D. 口服非甾体抗炎药
 E. 人工股骨头置换术

【答案】B

【解析】患者髋臼和股骨头均受累, 应行全髋关节置换术。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1369——治疗

101. 男, 42 岁。高血压 1 年, 乏力 1 周。未服药。查体: BP 160/100mmHg。心率 76 次/分, 律齐, 腹软, 全腹叩诊呈鼓音, 肠鸣音 1 次/分。实验室检查: 血钾 2.9mmol/L。腹部 B 超示左侧肾上腺腺结节 1.5cm×1.5cm。该患者最有助于明确诊断的筛查指标是

- A. 血气分析
 B. 血促肾上腺皮质激素水平
 C. 血浆游离间羟肾上腺素水平
 D. 血浆醛固酮/血浆肾素活性比值
 E. 血浆肾素水平

【答案】D

【解析】高血压、低钾伴有肾上腺结节考虑醛固酮增多症。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1218——临床表现

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P387 第 18 题

102.男,50 岁。劳累时胸痛 2 年,每于上 3 层楼梯时症状发作,含服硝酸甘油 1~3 分钟可缓解。既往高血压病史 5 年,糖尿病病史 4 年。可改善该患者预后的治疗措施是

- A. 冠状动脉支架植入术
- B. 皮下注射低分子肝素
- C. 长期口服营养心肌类药物
- D. 冠状动脉旁路移植术
- E. 长期口服他汀类药物

【答案】E

【解析】患者为典型的稳定型劳累性心绞痛:由运动所诱发的短暂的胸痛发作,休息或含硝酸甘油可缓解。只有药物可以改善预后,包括:阿司匹林、氯吡格雷、 β 受体阻滞剂、他汀类药物、ACEI/ARB。他汀类药物能有效降低低密度脂蛋白和胆固醇水平,还能抗炎、抑制血小板血栓的形成、改善血管内皮功能等。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P766——治疗

103.男,45 岁。1 年前发现血压 170/110mmHg,长期口服氨氯地平等药物治疗,2 个月前诊断为糖尿病,口服降糖药治疗,目前血压、血糖均在正常范围。该患者高血压诊断正确的是

- A. 高血压 3 级,高危
- B. 高血压 1 级
- C. 高血压 2 级,高危
- D. 高血压 3 级,很高危
- E. 高血压 2 级,很高危

【答案】D

【解析】舒张压 110mmHg,诊断为高血压 3 级。高血压 3 级的患者无危险因素为高危,伴有危险因素的均为很高危。患者伴有糖尿病,即为很高危。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P756——诊断与鉴别诊断

104.女,45 岁。尿频、尿急、尿痛 2 天,伴高热、寒战、腰痛半天。查体:T 39°C,BP 110/70mmHg,左肾区有叩击痛。尿常规:蛋白(+),RBC 2~5/HP,WBC 40~50/HP。最可能的诊断是

- A. 急性膀胱炎
- B. 肾肿瘤
- C. 肾结核
- D. 急性肾盂肾炎
- E. 慢性肾盂肾炎

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P924——诊断与鉴别诊断

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P297 第 6 题

105.男,40岁。查体发现“心动过缓”20余年。平时心率45~55次/分。无心悸,无头晕和乏力,无黑矇和晕厥。运动后心率可达到90次/分。该患者最适宜的处置是

- A.口服胺碘酮
 B.暂不治疗,定期随诊
 C.口服阿托品
 D.静脉注射异丙肾上腺素
 E.植入永久起搏器

【答案】B

【解析】心动过缓,无不适症状,暂不治疗,定期随诊。

106.女,52岁。进行性体重增加伴头晕、腰痛2年。查体:BP 180/112mmHg,多毛,面圆,有痤疮。实验室检查:尿糖(++),血浆皮质醇:早8时810nmol/L(正常165~441nmol/L),午夜12时770nmol/L(正常55~138nmol/L),初步诊断库欣综合征,为进一步明确诊断,应进行的检查是

- A.葡萄糖耐量试验
 B.ACTH兴奋剂试验
 C.螺内酯抑制试验
 D.酚妥拉明抑制试验
 E.地塞米松抑制试验

【答案】E

【解析】小剂量地塞米松抑制试验有助于各型库欣综合征的诊断,大剂量地塞米松抑制试验可以用于病因诊断,鉴别库欣病、肾上腺皮质腺瘤、肾上腺皮质腺癌等。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1217——诊断

近似考题:《2015年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P385第1题

107.女,60岁。一周前家人发现晨起不能唤醒,急诊查血糖2.1mmol/L,既往无糖尿病病史。查体:BP 120/85mmHg,心率105次/分,BMI 32。此时,该患者最有可能异常的激素是

- A.胰岛素
 B.生长激素
 C.胰高血糖素
 D.糖皮质激素
 E.甲状腺激素

【答案】A

【解析】患者血糖低于2.8mmol/L,且有脑功能障碍的表现,符合低血糖症的诊断。其最常见的病因是胰岛素瘤,故选A。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1230——病因

近似考题:《2015年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P390第22题

108.男,50岁。突发眼底出血1小时。高血压病史10年。规律服用降压药1年,平时血压140/95~100mmHg。查体:BP 210/120mmHg,结膜无出血、充血。双肺呼吸音清,心率90次/分,律齐,双下肢无水肿。治疗宜首选

- A.口服美托洛尔
 B.静脉滴注硝普钠
 C.口服卡托普利
 D.肌肉注射利血平
 E.口服氨氯地平

【答案】B

【解析】硝普钠可同时扩张动、静脉,用于高血压急症的治疗。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P757——治疗

(109~110 题共用题干)

男,20 岁。右胸刀刺伤 2 小时就诊。既往体健。查体:T 36.5℃,P 120 次/分,R 24 次/分,BP 80/60mmHg。面色苍白,皮肤潮湿,右胸腋前线第 5 肋间 2cm 伤口,有血液流出,右胸叩诊实音,呼吸音减弱。急行胸腔闭式引流,引流出血性液体约 600ml,1 小时内又引流出血性液体 300ml。

109.此时首先考虑的诊断是

- | | |
|---------|---------|
| A.凝固性血胸 | B.创伤性湿肺 |
| C.迟发性血胸 | D.心脏压塞 |
| E.进行性血胸 | |

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P717——临床表现

110.最有效的处置措施是

- | | |
|---------------|---------|
| A.气管插管呼吸机辅助呼吸 | B.开胸探查 |
| C.输液、输血 | D.镇静、吸氧 |
| E.调整引流管位置 | |

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P718——治疗

(111~112 题共用题干)

女,45 岁。无痛性肉眼血尿 1 个月,尿中偶有血块,伴膀胱刺激症状。B 超见膀胱右侧壁有一个 1cm×2cm 软组织影,有蒂。

111.应考虑的诊断是

- | | |
|--------|---------|
| A.膀胱结石 | B.腺性膀胱炎 |
| C.膀胱异物 | D.膀胱憩室 |
| E.膀胱肿瘤 | |

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P943——临床表现

112.为明确诊断,最有价值的检查方法是

- | | |
|------------|----------|
| A.尿细胞学检查 | B.盆腔 MRI |
| C.盆腔 CT | D.膀胱造影 |
| E.膀胱镜检查+活检 | |

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P943——诊断

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P303 第 15 题

(113~114 题共用题干)

女,38 岁。突发心悸伴烦躁和胸闷 30 分钟,四肢发凉,曾出现黑朦,收入急诊监护病房。查体:BP 70/50mmHg,心率 180 次/分,心律绝对不齐,心音强弱不等,心脏各瓣膜区未闻及杂音。心电图提示“预激综合征伴心房颤动”。

113.该患者最适宜的处理是

- | | |
|-------------|-------------|
| A. 静脉注射胺碘酮 | B. 静脉注射维拉帕米 |
| C. 电复律 | D. 静脉注射西地兰 |
| E. 静脉注射普罗帕酮 | |

【答案】C

【解析】对于房颤的患者,当心室率快出现心肌缺血、低血压或心力衰竭等症状,且药物治疗无效时;伴预激综合征患者出现心室率快或血流动力学不稳定时,均应尽快行电复律。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P743——治疗

114.在诊疗过程中,该患者突然意识丧失,全身青紫,肢体抽搐。血压测不到,心音消失。心电图 QRS-T 波完全消失,代之以大小不等,及不整齐的低小波。该患者需立即采取的治疗措施是

- | | |
|-------------|------------|
| A. 心室超速起搏治疗 | B. 同步直流电转复 |
| C. 非同步直流电除颤 | D. 植入永久起搏器 |
| E. 植入临时起搏器 | |

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P747——室颤

(115~116 题共用题干)

女,20 岁。1 型糖尿病病史 10 年,平时每日 4 次胰岛素强化治疗。近 2 日发热、咽痛,食欲不佳,摄食少,自行停用胰岛素。晨起家属发现患者答非所问,急诊就诊。查体:T 38.5℃,精神差,轻度脱水貌。实验室检查:血钾 4.8mmol/L,血钠 142 mmol/L,血糖 18.1 mmol/L,尿酮体(+++),血 pH 7.25,尿量 40~50ml/h。

115.目前该患者合理的胰岛素使用方案是

- | | |
|----------------------|--------------------|
| A. 改用 2 次预混胰岛素皮下注射治疗 | B. 恢复 4 次胰岛素皮下注射治疗 |
| C. 静脉小剂量短效胰岛素治疗 | D. 使用基础胰岛素皮下注射治疗 |
| E. 静脉大剂量短效胰岛素治疗 | |

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1225——糖尿病急性并发症

116.关于纠正电解质及酸碱平衡紊乱,应立即采取的治疗措施是

- A.补碱、补钾、补钠治疗
B.补钾、补钠治疗
C.补碱、补钠治疗
D.补钠治疗
E.补碱、补钾治疗

【答案】D

【解析】一般酮症酸中毒的患者经补液(给予生理盐水,即补钠治疗)和胰岛素治疗可纠正酸中毒和高血钾,不必补碱和补钾。重症患者如 $\text{pH} < 7.1$,血碳酸根 $< 5\text{mmol/L}$,应补碱。如治疗前血钾正常,每小时尿量 40ml 以上,可在输液和胰岛素治疗后开始补钾。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1225——糖尿病急性并发症

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P392 第 31 题

(117~119 题共用题干)

男,44 岁,建筑工人,6 小时前不慎从高处坠落摔伤,腰部疼痛,活动受限,不能站立行走。

117.为明确有无合并神经损伤,最有意义的体格检查是

- A.逐个棘突按压
B.椎旁肌按压
C.直腿抬高试验
D.腰部过伸过屈
E.上下肢感觉运动

【答案】E

118.为明确是否有腰椎骨折,首选的影像学检查是

- A.B 超
B.MRI
C.ECT
D.CT
E.X 线片

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1352——影像学检查

119.为明确神经损伤情况,首选的检查是

- A.肌电图
B.CT
C.MRI
D.ECT
E.B 超

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1352——影像学检查

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P433 第 12 题

(120~121 题共用题干)

男,35 岁,会阴部骑跨伤,受伤后尿道外口滴血,伴尿时疼痛加重,会阴部和阴囊处轻度肿胀,瘀斑。

124. 该患者最可能的诊断是

- A. 库欣综合征
B. 嗜铬细胞瘤
C. 1 型糖尿病
D. 原发性醛固酮增多症
E. 慢性肾小球肾炎

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1218——临床表现

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P386 第 16 题

125. 患者高血压的特效治疗药物是

- A. ARB
B. α 受体拮抗剂
C. β 受体拮抗剂
D. ACEI
E. 螺内酯

【答案】E

【解析】患者考虑醛固酮增多导致的高钠血症和低钾血症,高血压治疗选择螺内酯,具有醛固酮拮抗作用。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1219——治疗

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P386 第 16 题

(126~129 题共用题干)

男,40 岁。发现血尿、蛋白尿 5 年。查体:BP 150/90mmHg,双下肢轻度凹陷性水肿。实验室检查:尿蛋白 1.0~1.7g/d,尿红细胞 5~15/HP,Scr 100 μ mol/L。B 超示双肾大小正常。

126. 该患者首先考虑的临床诊断是

- A. 无症状性蛋白尿和(或)血尿
B. 急性肾小球肾炎
C. 慢性肾小球肾炎
D. 肾病综合征
E. 高血压肾损害

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P919——临床表现

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》p295 第 19 题

127. 该患者应首选的进一步检查项目是

- A. 肾活检病理检查
B. 尿找肿瘤细胞
C. 肾动脉造影
D. 24 小时尿钠测定
E. 双肾 CT 检查

【答案】A

【解析】为确诊慢性肾小球肾炎,最有意义的检查是病理检查。C 主要用于鉴别肾囊肿和肾血管瘤;D 无特异性;E 为影像学检查,不能确诊。

128. 该患者应首选的降压药物是

- A. 袪利尿剂
 B. 血管紧张素转换酶抑制剂
 C. 钙通道阻滞剂
 D. β 受体拮抗剂
 E. α 受体拮抗剂

【答案】B

【解析】ACEI 的使用前提是血肌酐 $< 265 \mu\text{mol/L}$, 本题符合。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P919——治疗

129. 其治疗的最终目标是

- A. 消除尿蛋白
 B. 消除水肿
 C. 延缓肾脏病进展
 D. 控制血压
 E. 消除血尿

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P919——治疗

(130~133 题共用题干)

女, 48 岁。反复咳嗽、胸闷、气喘 30 年。平素口服氨茶碱及“止咳祛痰”中药治疗, 症状控制不理想。近 1 周来症状再次出现。查体: P 86 次/分, R 24 次/分。双肺可闻及散在哮鸣音。诊断为“支气管哮喘”。动脉血气分析示: pH 7.46, PaCO_2 32mmHg, PaO_2 64mmHg, HCO_3^- 19.3mmol/L。

130. 该患者目前血气分析检测结果提示低氧血症合并

- A. 呼吸性碱中毒
 B. 代谢性酸中毒
 C. 代谢性碱中毒
 D. 呼吸性酸中毒
 E. 呼吸性碱中毒合并代谢性酸中毒

【答案】E

【解析】pH 7.46 $>$ 7.45 为碱血症, PaCO_2 32mmHg $<$ 35mmHg 为呼碱, HCO_3^- 19.3mmol/L $<$ 22mmol/L 为代酸。

131. 对该患者首选的药物治疗是

- A. 吸入短效 β_2 受体激动剂
 B. 联合吸入糖皮质激素及长效 β_2 受体激动剂
 C. 口服糖皮质激素
 D. 吸入长效 β_2 受体激动剂
 E. 口服氨茶碱类药物

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P671——治疗

132. 为密切监测器病情变化, 应首先推荐的方法是

- A. 定期复查肺功能
 B. 定期监测血氧饱和度
 C. 每日评价活动耐力
 D. 监测肺部体征变化

E. 监测呼气峰流速

【答案】D

133. 患者 2 小时前突发呼吸困难加重。查体：意识清楚，端坐呼吸，双肺呼吸音低，呼气相延长，可闻及低调哮鸣音，心率 120 次/分，律齐，未闻及杂音。动脉血气(鼻导管吸氧 5 升/分)示 pH 7.31, PaCO₂ 52 mmHg, PaO₂ 53 mmHg, HCO₃⁻ 23mmol/L。目前首先应采取的治疗措施是

A. 面罩吸氧(10 升/分)

B. 静脉滴注碳酸氢钠

C. 静脉滴注氨茶碱

D. 机械通气

E. 静脉滴注呼吸兴奋剂

【答案】D

(134~136 题共用题干)

男, 52 岁。2 年来每于剧烈活动时发作剑突下疼痛, 向咽部放射, 持续数分钟可自行缓解。2 周来发作频繁且有夜间睡眠中发作。2 小时前出现剑突下剧烈疼痛, 向胸部放射, 伴憋闷、大汗, 症状持续不缓解, 急诊平车入院。既往有高血压病史 10 年, 糖尿病病史 5 年, 有吸烟史。查体: T 36.2℃, BP 160/80mmHg。急性病容, 口唇无紫绀, 双肺呼吸音清, 心率 103 次/分, 律不齐, 早搏 15 次/分, A₂ > P₂, 腹软, 无压痛。

134. 接诊时首先需考虑的诊断是

A. 消化性溃疡

B. 急性胰腺炎

C. 急性心肌梗死

D. 急性肺栓塞

E. 急性胆囊炎

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P768——临床表现

135. 最可能引起该患者死亡的原因是

A. 感染中毒性休克

B. 弥漫性血管内凝血

C. 恶性心律失常

D. 上消化道出血

E. 急性腹膜炎

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P768——临床表现

136. 接诊该患者需首先完善的检查是

A. 急诊腹部 B 超

B. 急诊胃镜

C. 心电图

D. 血气分析

E. 血和尿淀粉酶测定

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P769——辅助检查

(137~138 题共用备选答案)

- A. 葱皮样骨膜反应
 B. 骨质破坏, 死骨形成
 C. 日光放射状骨膜反应
 D. 肥皂泡样骨质反应
 E. 干骺端圆形边界清楚的溶骨型病灶

137. 骨巨细胞瘤的典型 X 线表现是

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1391——骨巨细胞瘤临床表现

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P444 第 9 题

138. 骨肉瘤的典型 X 线表现是

【答案】C

【解析】A 是尤因肉瘤的 X 线表现; E 是骨软骨瘤的 X 线表现。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1392——骨肉瘤临床表现

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P444 第 13 题

(139~140 题共用备选答案)

- A. 减弱心肌收缩力
 B. 降低左心室后负荷
 C. 同时降低左心室前后负荷
 D. 降低左心室前负荷
 E. 增加心肌收缩力

139. 硝普钠的作用是

【答案】C

140. 呋塞米的作用是

【答案】D

(141~142 题共用备选答案)

- A. 依那普利
 B. 美托洛尔
 C. 氢氯噻嗪
 D. 特拉唑嗪
 E. 氨氯地平

141. 糖尿病合并高血压的患者首选的降压药物是

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P757——治疗

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P233 第 2 题

142. 高血压合并窦性心动过速的患者首选的降压药物是

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P757——治疗

(143~144 题共用备选答案)

- A. 白细胞管型
B. 红细胞管型
C. 透明管型
D. 颗粒管型
E. 蜡样管型

143. 慢性肾衰竭尿中最常见的管型为

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P913——管型尿分类

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P291 第 4 题

144. 急性肾盂肾炎尿中最常见的管型为

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P913——管型尿分类

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P291 第 4 题

(145~146 题共用备选答案)

- A. TSH
B. ACTH
C. LH
D. GH
E. FSH

145. 促进甲状腺激素分泌的激素是

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P121——腺垂体和神经垂体激素的种类

146. 促进皮质醇分泌的激素是

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P121——腺垂体和神经垂体激素的种类

(147~148 题共用备选答案)

- A. 前列腺穿刺活检
B. 直肠指检
C. 前列腺 MRI
D. 前列腺 B 超
E. 血清 PSA 检查

147. 确诊前列腺癌的检查是

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P945——诊断

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P302 第 6 题

148. 前列腺癌临床分期常用的检查是

【答案】C

(149~150 题共用备选答案)

- A. 心衰所致胸水
 B. 类肺炎性胸水
 C. 乳糜胸水
 D. 类风湿关节炎所致胸水
 E. 恶性胸水

149. 胸水检查示:胸水总蛋白 15g/L, LDH 56U/L, Glu 5.4mmol/L, ADA 23U/L。最可能的病因是

【答案】A

【解析】胸水总蛋白低,葡萄糖与血糖相近,符合漏出液的诊断。备选答案中只有 A 为漏出液。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P714——辅助检查

150. 胸水检查示:有核细胞 $2000 \times 10^6/L$, 单个核 0.94, 总蛋白 40g/L, LDH 475U/L, Glu 2.4mmol/L, ADA 12U/L。最可能的病因是

【答案】E

【解析】胸水中细胞数明显增高,蛋白增高,葡萄糖降低,符合渗出液的诊断。B 多表现为中性粒细胞,恶性胸水和结核性胸水表现为单个核细胞增多,但 $ADA < 50U/L$, 不符而结核性胸水,故选 E。

第三单元

1. 针对女性患者, 诊断淋病的金标准是

- A. 尿培养
- B. 血培养
- C. 宫颈管分泌物培养
- D. 血清学检查
- E. 阴道分泌物培养

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1570——诊断

2. 与电源直接接触所致电烧伤的主要特点是

- A. 损伤范围通常外小内大
- B. 电流“出口”处较“入口”处损伤重
- C. 伤后坏死范围一般不会再扩大
- D. 局部渗出较一般烧伤轻
- E. 有明显的坏死层面

【答案】A

【解析】入口处皮肤有碳化, 出口处无; 可损伤血管, 导致伤后因血管闭塞引起伤口扩大; 可呈夹心坏死, 无明显坏死层面。

3. 甲状腺大部分切除后 48 小时内, 需注意最危急的并发症为

- A. 喉上神经内侧支损伤
- B. 喉返神经单侧损伤
- C. 手足抽搐
- D. 呼吸困难和窒息
- E. 甲状腺危象

【答案】D

【解析】术后呼吸困难和窒息, 多发生在术后 48 小时内, 是术后最危急的并发症。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1206——手术治疗及术前准备

4. 急性机械肠梗阻引起的首要病理生理改变是

- A. 呼吸衰竭
- B. 感染
- C. 体液丧失
- D. 毒素中毒
- E. 休克

【答案】C

【解析】肠道每天分泌大量的消化液, 肠梗阻可导致其对消化液的吸收障碍。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P872——病理生理

5. 对危重急性中毒患者, 应立即采取的措施是

- A. 维持生命体征并终止毒物接触
- B. 吸氧, 保护脑组织
- C. 洗胃, 迅速排出消化道毒物
- D. 导泻, 迅速排出体内毒物

E.使用特效解毒药

【答案】A

【解析】对于危重急性中毒患者,应立即终止毒物的接触,迅速清除体内已经和未被吸收的毒物,并用特效解毒剂对症处理。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1614——治疗

6.门静脉高压症手术,术后最易发生肝性脑病的术式是

- | | |
|-------------|--------------|
| A.非选择性门体分流术 | B.食管下端胃底切除术 |
| C.限制性门体分流术 | D.远端脾—肾静脉分流术 |
| E.贲门周围血管离断术 | |

【答案】A

【解析】非选择性门体分流术是将入肝的血液完全转流入体循环,代表术式是门—腔静脉端侧分流、门—腔静脉侧侧分流等,止血尚可,易引起肝性脑病。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P841——治疗

7.系统性红斑狼疮治疗的基础用药是

- | | |
|---------|--------|
| A.硫唑嘌呤 | B.甲氨蝶呤 |
| C.羟氯喹 | D.环磷酰胺 |
| E.柳氮磺吡啶 | |

【答案】C

【解析】抗疟药已经成为 SLE 治疗的基础用药。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1399——治疗

8.青春期甲状腺Ⅱ度肿大最佳的治疗方法是

- | | |
|--------------|------------|
| A.多食含碘食物 | B.甲状腺次全切除术 |
| C.放射性碘治疗 | D.口服碘剂 |
| E.口服小剂量甲状腺素片 | |

【答案】A

【解析】青春期生理性甲状腺肿,宜多食含碘丰富的食物,如海带、紫菜等。

9.直肠肛管周围脓肿最常见的发病部位是

- | | |
|-----------|----------|
| A.骨盆直肠间隙 | B.肛门周围皮下 |
| C.肛管括约肌间隙 | D.坐骨肛管间隙 |
| E.直肠壁内 | |

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P887——诊断

10.诊断阵发性睡眠性血红蛋白尿最有意义的血细胞免疫标志是

- | | |
|-------------|-----------|
| A.CD19、CD20 | B.CD3、CD4 |
|-------------|-----------|

C. CD33、CD34

D. CD3、CD8

E. CD55、CD59

【答案】E

【解析】阵发性睡眠性血红蛋白尿(PNH)的诊断:①有 PNH 的临床表现,有肯定的血管内溶血实验室根据;②酸溶血、蛇毒因子或尿含铁血黄素试验中有任何两项试验检查阳性,或流式细胞术发现粒细胞或红细胞的 CD55 或 CD59 表达下降 $>10\%$ 即可诊断。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1149——阵发性睡眠性血红蛋白尿(PNH)的诊断及治疗

11. 描述传染病流行病学特征,不正确的是

A. 暴发

B. 流行

C. 隐性感染

D. 散发

E. 大流行

【答案】C

【解析】疾病流行的强度:散发、流行、大流行和暴发。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P468——流行病学资料的来源与疾病分布

12. 下列按伤情分类属于重伤的是

A. 肱骨骨折

B. 股骨干骨折合并肺脂肪栓塞

C. 脾被膜下破裂

D. 开放性胫腓骨骨折

E. 膀胱破裂

【答案】B

13. 符合肠易激综合征临床特点是

A. 与食物无明显关系

B. 症状多进行性加重

C. 可伴有精神心理障碍

D. 常出现明显的体重下降

E. 好发于老年男性

【答案】C

【解析】肠易激综合征的临床表现为腹痛、腹泻、便秘、腹胀、其他等。其中精神、饮食等因素常诱使症状复发或加重。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P870——临床表现

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P275 第 14 题

14. 机体发生创伤后,营养状况的评估指标中不包括的是

A. 血小板测定

B. 体重

C. 白蛋白测定

D. 皮褶厚度

E. 淋巴细胞测定

【答案】A

【解析】营养状况差可导致机体免疫功能下降,故淋巴细胞可减少。

15.预防气性坏疽的关键措施是

- | | |
|------------|-------------|
| A.纠正水电解质失调 | B.早期行筋膜切开减张 |
| C.早期应用抗生素 | D.应用高血氧 |
| E.尽早彻底清创 | |

【答案】E

【解析】紧急手术处理是气性坏疽最关键的治疗措施。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1593——气性坏疽的诊断与治疗

16.HIV 的感染途径不包括

- | | |
|---------|---------|
| A.输血制品 | B.呼吸道传播 |
| C.母婴传播 | D.不洁注射 |
| E.性接触传播 | |

【答案】B

【解析】艾滋病的传播途径主要是性传播、血液传播和母婴传播。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1565——流行病学

17.传染病的病原学检查方法不包括

- | | |
|------------|-----------|
| A.病毒分离 | B.细菌培养 |
| C.病原体核酸检测 | D.特异性抗原检测 |
| E.粪便涂片革兰染色 | |

【解析】病原学检查还包括特异性抗体的检测。E 只能判断细菌是革兰氏阳性还是阴性,不是病原学检查。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P148——标本的采集原则

18.腹股沟疝查体时,压迫腹股沟管深环的部位是

- | | |
|-----------------|-----------------|
| A.精索内前方 2cm | B.髂前上棘与耻骨结节连线中点 |
| C.腹股沟韧带中点上方 2cm | D.肿块隆起最明显处 |
| E.耻骨结节外侧 2cm | |

【答案】C

19.Calot 三角组成包括肝脏下缘、胆囊管和

- | | |
|-------|-------|
| A.右肝管 | B.左肝管 |
| C.副肝管 | D.肝总管 |
| E.胆总管 | |

【答案】D

【解析】Calot 三角是由胆囊管、肝总管及肝下缘所构成的三角区域。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P851——胆囊与肝外胆管的解剖

20. 预后最好的乳腺癌病理类型是

- A. 硬癌
- B. 单纯癌
- C. 导管内癌
- D. 黏液腺癌
- E. 髓样癌

【答案】C

【解析】导管内癌是非浸润性癌,此型属早期,预后较好。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1608——常见组织学类型(助理不考)

21. 下列有关动脉硬化性闭塞症临床特点的描述,错误的是

- A. 病变常位于小动脉
- B. 多合并高血压、高脂血症、糖尿病
- C. 多见于男性
- D. 一般无血栓性浅静脉炎病史
- E. 发病年龄多在 45 岁以上

【答案】A

【解析】动脉硬化性闭塞症即动脉粥样硬化性闭塞症,与高血脂、高血压、糖尿病等密切相关,因这三类疾病多见于男性且年龄偏大,故 C、E 不选;与血栓闭塞性脉管炎的鉴别是后者有血栓性浅静脉炎病史,受累血管是中小动静脉,而动脉硬化性闭塞症的受累血管是大中动脉。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P807——诊断与鉴别诊断

22. 诊断再生障碍性贫血的最重要依据是

- A. 抗贫血治疗无效
- B. 骨髓造血细胞减少
- C. 网织红细胞减少
- D. 无肝脾淋巴结肿大
- E. 全血细胞减少

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1146——诊断与鉴别诊断

23. 急性胰腺炎所致腹痛的常见放射痛部位是

- A. 左上臂内侧
- B. 左腰背部
- C. 下腰骶部
- D. 左下颌部
- E. 左肩部

【答案】B

【解析】腹痛是急性胰腺炎的主要表现,腹痛剧烈,多位于左上腹,向左肩及左腰背部

放射。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P858——临床表现

24. 破裂后液体进入腹腔引起腹膜刺激征最严重的腹部实质脏器是

- | | |
|--------|-------|
| A. 肾上腺 | B. 肾脏 |
| C. 肝脏 | D. 胰腺 |
| E. 脾脏 | |

【答案】D

25. 胰头癌最常见的临床表现是

- | | |
|---------------|---------------|
| A. 腹痛、黄疸和消瘦 | B. 腹痛、黄疸和呕吐 |
| C. 腹痛、黄疸和上腹包块 | D. 黄疸、消瘦和上腹包块 |
| E. 黄疸、消瘦和腹胀 | |

【答案】A

【解析】胰腺癌的患者多数在就诊时已晚期, 是因其临床表现不易察觉所致, 故排除上腹包块、呕吐这些明显的临床症状; 再比较 A 和 E, 因胰腺癌所致疼痛是非常剧烈的, 故选 A。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P861——临床表现

26. 关于伤寒病原学的叙述, 不正确的是

- | | |
|----------------------|-----------------|
| A. 革兰染色阴性 | B. “Vi”抗体有助于诊断 |
| C. 属于沙门菌属的 D 组 | D. 其内毒素是致病的重要因素 |
| E. 本菌有“O”、“H”和“Vi”抗原 | |

【答案】B

【解析】“Vi”抗体的检测主要用于调查伤寒带菌者。

27. 以下关于老年人胃溃疡特点的描述, 不正确的是

- | | |
|------------|-------------|
| A. 可无症状 | B. 溃疡常较大 |
| C. 易合并幽门梗阻 | D. 较多位于胃体上部 |
| E. 易误诊为胃癌 | |

【答案】C

【解析】老年人胃溃疡与典型胃溃疡有较大差异, 如典型胃溃疡多位于胃小弯、症状明显; 而老年人胃溃疡多位于胃体上部、症状轻微甚至无症状, 但溃疡面积较大, 易误诊为胃癌。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P825——临床表现

28. 慢性胃炎最主要的病因是

- | | |
|------------|---------|
| A. 刺激性食物 | B. 化学损伤 |
| C. 幽门螺杆菌感染 | D. 药物损伤 |
| E. 物理损伤 | |

【答案】C

【解析】慢性胃炎的病因包括 Hp 感染、十二指肠—胃反流、自身免疫,其中 Hp 感染是最主要的病因。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P823——病因和发病机制

29.临床上最易发生嵌顿的疝是

- | | |
|---------|--------|
| A.腹股沟直疝 | B.小儿脐疝 |
| C.腹股沟斜疝 | D.白线疝 |
| E.股疝 | |

【答案】E

【解析】股疝疝块位于腹股沟韧带下方,呈半球状,通常疝块较小,中年女性多见,因疝囊颈较狭小,较易嵌顿和绞窄。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P904——诊断

30.不宜行直肠指诊的疾病是

- | | |
|--------|-------|
| A.肛裂 | B.肛窦炎 |
| C.内痔 | D.肛瘘 |
| E.肛周脓肿 | |

【答案】A

31.急性弥漫性腹膜炎手术治疗的步骤不包括

- | | |
|--------------------|----------------|
| A.寻找引起腹膜炎的原发灶 | B.术后一般放置腹腔引流 |
| C.根据病变脏器的部位确定手术切口 | D.用生理盐水冲洗腹腔至清洁 |
| E.关腹前均在腹腔内用抗生素控制感染 | |

【答案】E

32.失血性休克扩张血容量首选的液体是

- | | |
|---------|-----------|
| A.全血 | B.中分子右旋糖苷 |
| C.平衡盐溶液 | D.血浆 |
| E.葡萄糖溶液 | |

【答案】C

【解析】失血性休克扩张血容量可快速滴注平衡盐溶液或人工胶体液。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P802——病因和发病机制

33.胃溃疡外科手术的适应证是

- | | |
|-------------|--------------|
| A.治愈后短期复发 | B.周期性发作 |
| C.年龄小于 45 岁 | D.溃疡直径小于 1cm |
| E.幽门螺杆菌反复感染 | |

【答案】A

【解析】胃溃疡外科治疗的适应证:①胃溃疡经过短期内科治疗无效或愈合后复发者;②经 X 线或胃镜证实为较大溃疡(直径 2.5cm 以上)或高位溃疡;③不能排除或已证实有恶变者;④以往有一次急性穿孔或大出血病史者。

34.急性肾衰竭(损伤)高钾血症选择血液透析,血钾浓度的下限是

- | | |
|--------------|--------------|
| A.6.0mmol/L | B.7.5 mmol/L |
| C.5.5 mmol/L | D.6.5 mmol/L |
| E.7.0 mmol/L | |

【答案】D

【解析】急性肾衰的透析指征:当 GFR 小于 10ml/min($Scr > 707 \mu\text{mol/L}$)并有明显尿毒症表现,则应进行肾脏替代治疗。对糖尿病肾病的患者,可适当提前至 GFR 10~15ml/min 安排替代治疗。此外,严重高钾血症($> 6.5\text{mmol/L}$)、代谢性酸中毒($\text{pH} < 7.15$)、容量负荷过重对利尿剂治疗无效、心包炎和严重脑病等都是透析治疗的指征。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P967——治疗

35.由红细胞膜异常引起的贫血性疾病是

- | | |
|--------------|------------|
| A.蚕豆病 | B.不稳定血红蛋白病 |
| C.遗传性球形细胞增多症 | D.镰状细胞贫血 |
| E.地中海贫血 | |

【答案】C

【解析】红细胞膜异常引起的贫血性疾病有:遗传性球形细胞增多症,系红细胞膜骨架蛋白异常;阵发性睡眠性血红蛋白尿,系克隆性疾病,因红细胞膜蛋白结构异常,红细胞对补体敏感而溶血。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1147——发病机制

36.急性结石性胆囊炎常见的致病菌是

- | | |
|----------|---------|
| A.铜绿假单胞菌 | B.大肠埃希菌 |
| C.厌氧菌 | D.幽门螺杆菌 |
| E.粪肠球菌 | |

【答案】B

37.提示存在消化道肿瘤的报警症状中,不包括

- | | |
|------|--------|
| A.黑便 | B.贫血 |
| C.消瘦 | D.吞咽困难 |
| E.嗝气 | |

【答案】E

38.以下关于急腹症手术适应证的描述最恰当的是

- A.急性胰腺炎,血淀粉酶不高者不考虑手术
 B.消化道穿孔不是剖腹手术的绝对适应证
 C.肠梗阻只有明确诊断绞窄时才可手术

- D. 粘连性肠梗阻不需要手术治疗
E. 先有发热的急性腹痛, 一般是外科急腹症, 均应考虑手术

【答案】B

39. 引起我国雨水洪水型钩端螺旋体病的主要钩体群是

- A. 七日群
B. 秋季群
C. 犬群
D. 黄疸出血群
E. 波摩那群

【答案】E

【解析】钩端螺旋体病常见的流行群是黄疸出血群、波摩那群、犬群、七日热群、流感伤寒群、秋季群、澳洲群、致热群及爪哇群等。其中波摩那群分布最广, 是引起雨水型、洪水型的主要菌群; 黄疸出血群毒力最强, 是稻田型的主要菌群, 引起的临床表现最重。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1542——流行病学

40. 对于腹部手术后切口化脓性感染, 错误的处理是

- A. 应用抗菌药物
B. 切口内放置引流条
C. 局部理疗
D. 拆除缝线, 敞开切口
E. 切开引流冲洗后立即缝合

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1597——治疗

41. 目前法定传染病的病原体中不包括的是

- A. 立克次体
B. 细菌
C. 原虫
D. 弓形虫
E. 病毒

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1528——基本特征

42. 下列关于类风湿因子(RF)与类风湿关节炎(RA)的描述。不正确的是

- A. 高滴度 RF 阳性对诊断次有意义
B. RF 高滴度是 RA 预后不良的指标之一
C. RF 阳性可见于 RA 以外的其他疾病
D. 部分 RA 患者的血清 RF 阴性
E. RF 阳性是诊断 RA 的必备条件

【答案】E

【解析】类风湿因子阴性不能排除 RA, 阳性不能诊断 RA。故选项 E 错误。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1400——实验室和其他检查

43. 缺铁性贫血患者因组织缺铁性而发生的临床表现不包括

- A. 口腔炎、舌炎
 B. 匙状甲
 C. 吞咽困难
 D. 头晕、乏力
 E. 皮肤干燥、皱缩

【答案】D

【解析】缺铁性贫血的患者因血红蛋白减少可出现头晕、乏力，皮肤、黏膜的苍白；因缺铁导致含铁酶的活性降低可引起黏膜损害如口炎、舌炎，咽下困难或咽下梗塞感，外胚叶组织营养缺乏导致的皮肤干燥、匙状甲等。

命中考点：《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1141——临床表现

44. 胃食管反流病的主要症状是

- A. 反酸
 B. 上腹痛
 C. 咽异物感
 D. 吞咽困难
 E. 嗝气

【答案】A

【解析】胃食管返流病的典型症状是反酸、烧心。

命中考点：《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P817——临床表现

45. 转移性腹痛最常见的疾病是

- A. 急性肠穿孔
 B. 急性阑尾炎
 C. 急性胃炎
 D. 急性胰腺炎
 E. 急性胆囊炎

【答案】B

【解析】转移性腹痛是急性阑尾炎的典型症状。

命中考点：《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P882——临床表现

46. 腹部手术后，原则上鼓励早期活动，其理由不包括

- A. 促进切口愈合
 B. 改善全身血液循环
 C. 减少深静脉血栓形成
 D. 减少肺部并发症
 E. 减少腹腔感染

【答案】E

47. 急性阑尾炎闭孔内肌试验阳性体位的位置是

- A. 盲肠后位
 B. 盆位
 C. 盲肠外位
 D. 回肠前位
 E. 回肠后位

【答案】B

【解析】闭孔内肌试验：屈曲右髋并被动内旋，引起右下腹疼痛者为阳性，说明阑尾靠近闭孔内肌。故其阳性体位的位置是盆位。

48. 最有助于自身免疫性胃炎诊断的试验检查是

- A. 血清壁细胞抗体检查
- B. 血清促胃液素测定
- C. 血清胃蛋白酶原定量
- D. 胃液中胃酸测定
- E. 胃液中胃蛋白酶定量

【答案】A

【解析】血清抗壁细胞抗体、内因子抗体及维生素 B₁₂ 水平测定有助于诊断自身免疫性胃炎。

命中考点：《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P823——临床表现

49. 回肠肠痿者所用的肠内营养制剂应该是

- A. 以肽类为主
- B. 以酯类为主
- C. 增加维生素
- D. 减少糖类
- E. 增加纤维素

【答案】A

【解析】消化道痿的患者可给予肠内营养和肠外营养，肠内营养应以肽类为主，以减轻对消化液分泌的刺激作用。

50. 女，36 岁。右侧颈部淋巴结肿大 1 月余，左侧颈部淋巴结亦肿大伴发热 1 周。既往体健。查体：T 38.1℃，双侧颈部可触及数个肿大淋巴结。左颈部淋巴结活检见淋巴结结构完全破坏，弥漫性大细胞浸润，免疫组化：CD20(+)，CD30(-)，CD50(-)。最可能的诊断是

- A. 滤泡性淋巴瘤
- B. 间变性大细胞淋巴瘤
- C. 套细胞淋巴瘤
- D. 弥漫性大 B 细胞淋巴瘤
- E. 霍奇金淋巴瘤

【答案】D

【解析】弥漫性大 B 细胞淋巴瘤为弥漫增生的大 B 细胞恶性肿瘤，是最常见的非霍奇金淋巴瘤类型。病理表现为正常的淋巴结结构或结外组织被弥漫性的形态单一、体积较大的异型淋巴细胞侵占取代。免疫表型为 CD19(+)、CD20(+)。

命中考点：《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P350——弥漫性大 B 细胞淋巴瘤

51. 女，25 岁，妊娠 35 周。头晕、乏力、心悸 2 个月。既往体健。血常规：Hb 80g/L，MCV 108fl，MCH 35pg，MCHC 33%，WBC $3.6 \times 10^9/L$ ，Plt $95 \times 10^9/L$ ，网织红细胞 0.02，为明确诊断，首先应进行的检查是

- A. 尿 Rous 试验
- B. 粪隐血试验
- C. 血清铁、铁蛋白测定
- D. Coombs 试验
- E. 血清叶酸、维生素 B₁₂ 测定

【答案】E

【解析】成人 MCV 的正常值是 80~100fl，大于 100fl 提示巨幼细胞性贫血，故选 E。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1144——实验室检查

52.男,58岁。3年前曾行直肠癌根治术,近3个月右上腹及背部胀痛,无发热,大便正常。查体:锁骨上未触及肿大淋巴结,腹平软,未触及肿物,肝肋下未触及。实验室检查:血 WBC $10 \times 10^9/L$,AFP 无升高。腹部 B 超示:肝右叶多个实性占位,最大直径约 3cm。首先应考虑的诊断是

- | | |
|----------|---------|
| A.阿米巴肝脓肿 | B.肝血管瘤 |
| C.多发肝囊肿 | D.原发性肝癌 |
| E.肝转移癌 | |

【答案】E

【解析】原发性肝癌 AFP 多升高,而转移性肝癌一般不升高,且患者有直肠癌的病史,故选 E。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P848——诊断与鉴别诊断

53.女,42岁。突发上腹剧痛6天,加重伴发热2天,查体:T 38°C ,BP 76/50mmHg,面色苍白。嗜睡,脉搏细速,尿少,中上腹压痛(+),伴反跳痛,上腹部可触及肿块,不活动。B 超示胰腺周围液性包块,直径 10cm。尿淀粉酶 10000 SomogyiU/L,血 WBC $18 \times 10^9/L$,引起该患者感染的致病菌最可能的是

- | | |
|---------|----------|
| A.肠球菌 | B.大肠埃希菌 |
| C.结核杆菌 | D.溶血性链球菌 |
| E.白色念球菌 | |

【答案】B

54.男,28岁。腰背及腹部挤压伤后1小时。查体:P 96次/分,BP 140/80mmHg。痛苦貌,腹部膨隆,轻压痛,无反跳痛,肠鸣音弱,腰部部可见瘀斑。急症剖腹探查见后腹膜完整,腹膜后见 $10\text{cm} \times 8\text{cm} \times 2\text{cm}$ 血肿,观察其大小无变化。该患者术后的治疗中最重要的

- | | |
|------------|--------|
| A.纠正水电平衡紊乱 | B.防治感染 |
| C.防治肝肾功能障碍 | D.纠正贫血 |
| E.纠正低蛋白血症 | |

【答案】B

55.男,33岁。右上腹外伤2小时。查体:P 120次/分,BP 90/60mmHg。全腹有压痛、反跳痛,以右上腹为主,移动性浊音(+).最有意义的辅助检查是

- | | |
|----------|--------------|
| A.腹部 B 超 | B.立位腹部 X 线平片 |
| C.腹部 CT | D.诊断性腹腔穿刺 |
| E.腹部 MRI | |

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P906——辅助检查

56.男,28岁。上腹部不适、腹泻伴消瘦半年,无发热。近2年有静脉吸毒史。胃镜检查见食管上覆白膜,慢性浅表性胃炎。实验室检查:血 WBC $3.8 \times 10^9/L$ 。最有助于明确诊断的检查是

- A.血糖
B. CD4⁺T 细胞计数
C. 抗-HIV
D. 免疫球蛋白水平
E. 血沉

【答案】C

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1566——诊断

57.女,55岁,垂体腺瘤切除术后1小时。查体:P 96次/分,R 30次/分,BP 110/55mmHg,神志清楚。可采取的体位是

- A. $15^\circ \sim 30^\circ$ 头高脚底斜坡卧位
B. 下肢抬高 $15^\circ \sim 20^\circ$
C. 侧卧位
D. 平卧位
E. 高半坐位

【答案】A

【解析】施行颅脑手术后,如无休克或昏迷,可取 $15^\circ \sim 30^\circ$ 头高脚低斜坡卧位;施行颈、胸手术后,多采用高半坐位卧式,以便于呼吸和有效引流。腹部手术后,多取低半坐位卧式或斜坡卧位,以减少腹壁张力。休克病人,应取下肢抬高 $15^\circ \sim 20^\circ$,头部和躯干抬高 $20^\circ \sim 30^\circ$ 的特殊体位。

58.男,38岁。患肝硬化3年。一周来畏寒发热,体温 38°C 左右,全腹痛,腹部明显膨胀,尿量 500ml/日。以下体征中对目前病情诊断最有意义的是

- A. 全腹压痛及反跳痛
B. 蜘蛛痣及肝掌
C. 腹部移动性浊音阳性
D. 脾肿大
E. 腹壁静脉曲张呈海蛇头样

【答案】A

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P895——临床表现

59.女,60岁。高温天气户外活动4小时,出现口渴、尿少,突然晕倒。最可能的原因是

- A. 稀释性低钠血症
B. 等渗性缺水
C. 急性肾衰竭
D. 高渗性缺水
E. 低渗性缺水

【答案】D

【解析】热衰竭常见于老年人,可有头痛、口渴、低血压、晕厥,实验室检查有血细胞比容增高、高钠血症,表现为高渗性缺水。热痉挛是由于大量出汗后补水充足而补盐不足所致,表现为四肢痉挛,实验室检查血钠浓度下降。

60.男,43岁。3天前自非洲回北京,回京后开始发冷、寒战,继之高热,持续3小时后出汗、热退,每两天发作1次。血涂片见疟原虫滋养体。应选择的治疗方案是

- A. 磺胺加乙胺嘧啶
B. 氯喹加伯氨喹

- C. 青蒿素加氯喹
D. 奎宁加伯氨喹
E. 乙胺嘧啶加伯氨喹

【答案】B

【解析】患者出现典型间日疟的三期表现,即寒战、高热、大汗,且血涂片见疟原虫滋养体,疟疾的诊断明确。控制发作首选氯喹,防止复发和传播首选伯氨喹。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1558——治疗与预防

61. 男, 60 岁。直肠癌切除术后 4 天,晨起时突发左下肢肿胀,左腿皮温增高,股三角区有深压痛。最可能的诊断是左下肢

- A. 血栓性浅静脉炎
B. 动脉栓塞
C. 深静脉血栓形成
D. 大隐静脉曲张
E. 淋巴水肿

【答案】C

【解析】肿瘤组织裂解产物可导致高凝,患者起病突然,左下肢肿胀,左腿皮温增高,股三角区有深压痛,符合髂一股静脉血栓形成的诊断。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P812——临床表现

62. 男, 58 岁。反复腹胀、尿少,双下肢水肿 2 年,加重伴腹痛 1 周。口服螺内酯及呋塞米后尿量无明显增加。慢性乙型肝炎病史 15 年。腹腔穿刺抽出淡黄色腹水,腹水白细胞 $750 \times 10^6 / L$,中性粒细胞 $580 \times 10^6 / L$ 。以下治疗措施中错误的是

- A. 腹水浓缩回输
B. 应用广谱抗生素
C. 限制钠盐摄入
D. 补充白蛋白
E. 腹腔穿刺放液

【答案】A

【解析】肝硬化腹水的患者应限制钠和水的摄入,联合使用利尿剂和输入白蛋白,并可给予腹腔穿刺术放液减压。因腹水是细菌的良好培养基,故患者常合并自发性腹膜炎,应给予广谱抗生素,不能回输腹水。

63. 女, 20 岁。头晕、心悸、乏力 3 个月。查体:贫血貌,浅表淋巴结未触及肿大,巩膜轻度黄染,心肺未见异常,腹平软,肝肋下 1cm,脾肋下 3cm。实验室检查:Hb 75g/L, RBC $2.5 \times 10^{12} / L$, WBC $8.2 \times 10^9 / L$, Plt $151 \times 10^9 / L$,网织红细胞 0.12, Coombs 试验(+)。患者最可能的诊断是

- A. 自身免疫性溶血性贫血
B. 巨幼细胞性贫血
C. Evans 综合征
D. 地中海贫血
E. 缺铁性贫血

【答案】A

【解析】Coombs 试验(+)提示自身免疫性溶血性贫血。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1148——自身免疫性溶血性贫血的分型、诊断及治疗

64.男,51岁。进食质硬食物后呕鲜血 500ml。查体:BP 70/48mmHg,胸前区可见蜘蛛痣,肝脏肋下未触及,脾脏肋下 3cm。目前应立即采取的措施是

- A.手术治疗
- B.液体复苏,抗休克治疗
- C.内镜治疗
- D.静脉注射止血环酸
- E.静脉注射 H₂受体拮抗剂

【答案】B

【解析】患者目前休克,应首选给予补液抗休克治疗。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P801——治疗

65.男,20岁。腰痛3年,膝关节痛2个月。查体:右膝肿胀、压痛,浮髌实验阴性。实验室检查:血尿酸正常,HLA-B27 阳性。X线:双侧髌髌关节骨侵蚀改变,伴间隙狭窄。最可能的诊断是

- A.痛风性关节炎
- B.反应性关节炎
- C.强直性脊柱炎
- D.银屑病关节炎
- E.感染性关节炎

【答案】C

【解析】题眼“HLA-B27 阳性”,提示强脊。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1402——发病机制

66.男,18岁。寒战、高热5天,伴右上腹痛、恶心、呕吐、全身乏力。血常规:WBC 18.6 × 10⁹/L, N 0.92。腹部B超示:肝内多发性暗区,最大直径为 1.5cm。目前最主要的治疗措施是

- A.腹腔镜引流术
- B.静脉抗生素治疗
- C.肝叶切除术
- D.脓肿穿刺引流术
- E.脓肿切开引流术

【答案】B

【解析】细菌性肝脓肿起病急骤,脓肿多为多发,应使用较大剂量的抗生素治疗。对于单个较大脓肿可经皮穿刺脓肿置管引流,对于有可能穿破的脓肿应切开引流,慢性局限的厚壁脓肿可行肝叶切除。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P847——治疗

67.女,68岁。上腹部不适1个月,伴皮肤黄染、食欲不振、厌油腻饮食,体重减轻 5kg。查体:巩膜明显黄染,肝肋下未触及,右肋缘下可触及肿大的胆囊底部,无触痛。实验室检查:血胆红素 340 μmol/L。首先考虑的诊断是

- A.肝癌
- B.胆总管结石
- C.胆囊结石
- D.胃癌
- E.胆管癌

【答案】E

【解析】胆管癌可表现为黄疸进行性加重,大便灰白,晚期可触及腹部肿块,实验室检查胆红素、碱性磷酸酶等均升高。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P855——临床表现

68.男,58 岁。反复腹胀、尿少 3 年,加重伴双下肢水肿、腹围明显增加 2 周。乙型肝炎病史 15 年。腹部查体中不可能出现的体征是

- | | |
|----------|-----------|
| A.腹式呼吸减弱 | B.尺压试验阳性 |
| C.全腹膨隆 | D.移动性浊音阳性 |
| E.液波震颤阳性 | |

【答案】B

【解析】尺压试验是鉴别卵巢囊肿和腹水的重要检查方法,尺压试验阳性提示卵巢囊肿。

69.女,48 岁。进大量肉食后上腹痛伴呕吐 6 小时。腹痛为持续性,阵发加重,向左腰背部放射,呕吐物为胃内容物,对明确诊断最有意义的实验室检查是

- | | |
|----------|--------|
| A.尿淀粉酶 | B.血淀粉酶 |
| C.血白细胞计数 | D.血胆红素 |
| E.尿常规 | |

【答案】B

【解析】题眼“左腰背部放射”提示胰腺疾病,根据病因及临床表现考虑急性胰腺炎,首选的实验室检查是血淀粉酶。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P859——辅助检查

70.女,20 岁。春天在花园中游玩时突然晕倒。入院时查体:脉搏细速,BP40/20mmHg,面色苍白,神志不清。其首要的救治措施是

- | | |
|---------------|-----------------|
| A.多巴胺 20mg 静滴 | B.地塞米松 15mg 静滴 |
| C.给氧、严密监护 | D.肾上腺素 1mg 皮下注射 |
| E.安定 10mg 静滴 | |

【答案】D

【解析】年轻女性春天在花园中游玩时突然晕倒,且 BP 40/20mmHg,考虑过敏性休克,其首选药物是肾上腺素,可以激动 α 受体,收缩小动脉和毛细血管前括约肌,降低毛细血管的通透性;还能激动 β 受体改善心功能、缓解支气管痉挛。

71.男,50 岁。右侧颈部肿块 3 个月。查体:右侧颈部胸锁乳突肌上部前缘处触及直径约 2cm 肿块,肿块有膨胀性搏动。下一步处理措施正确的是

- | | |
|-----------|-----------|
| A.局麻下手术活检 | B.穿刺细胞学检查 |
| C.局部热敷、按摩 | D.切开引流 |
| E.超声多普勒检查 | |

【答案】E

72.男,56 岁。全腹切除术后 3 天行肠内营养,第 4 天出现腹泻。分析其腹泻原因不

包括

- A. 营养液温度过低
- B. 营养液污染
- C. 小肠对脂肪耐受改变
- D. 肠腔内渗透压过高
- E. 营养液输注速度过慢

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1585——并发症

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P512 第 5 题

73. 男孩, 3 岁, 体重 16kg。双下肢被开水烫伤。查体: BP 85/60mmHg, 烦躁不安。双下肢(包括臀部)Ⅱ°烧伤。尿量 15ml/L。第一个 24 小时应补充胶体液的量为

- A. 500ml
- B. 400ml
- C. 800ml
- D. 600ml
- E. 700ml

【答案】B

【解析】Ⅱ°和Ⅲ°烧伤第一个 24 小时的补液量 = 体重 × 烧伤面积 × 1.5ml (小儿为 2ml) + 基础需水量 2000ml, 其中烧伤面积在 50% 以下的患者的补液成分为晶体: 胶体 = 2 : 1。小儿双下肢烧伤面积 = $9 \times 5 + 1 - (12 - \text{年龄}) = 37$ 。故第一个 24 小时应补充胶体液的量 = $16\text{kg} \times 37\% \times 2\text{ml} \times 1/3 = 395\text{ml}$ 。

74. 女, 65 岁。上腹痛一年。胃镜检查见胃窦 2cm 大小溃疡, 边缘不规则, 胃壁僵硬, 基底部白苔, 质脆, 易出血, 其最佳手术方法是

- A. 胃窦切除术
- B. 全胃切除术
- C. 根治性胃大部切除术
- D. 胃空肠吻合术
- E. 单纯胃大部切除术

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P832——治疗

75. 男, 63 岁。乏力、腹胀 3 个月, 加重伴尿少 1 个月。慢性肝炎病史 20 余年。查体: 巩膜轻度黄染, 肝肋下 4cm, 质硬, 脾肋下 3cm, 移动性浊音阳性, 双下肢水肿。对诊断最有意义的实验室检查是

- A. 腹水铁蛋白
- B. 血癌胚抗原
- C. 血甲胎蛋白
- D. 血 CA125
- E. 腹水腺苷脱氨酶

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P848——辅助检查

76. 女, 28 岁。甲状腺肿大 3 年, 性情急躁、怕热、多汗、心悸, 食欲强但消瘦。有哮喘史。拟行手术治疗, 其术前药物准备措施应首选的是

- A. 单用复方碘剂
- B. 单用硫脲类药物

- C.先用硫脲类药物,后加复方碘剂
 D.单用普萘洛尔
 E.应用普萘洛尔+硫脲类药物

【答案】C

【解析】患者有哮喘病史,不能用普萘洛尔;硫脲类药物抑制甲状腺素的合成,但导致甲状腺充血;复方碘可抑制甲状腺素的释放,减少甲状腺的血流量,使甲状腺变小变硬易于手术。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1205——手术治疗及术前准备

77.男,40 岁。右上腹胀痛伴间断发热 3 个月。1 年前曾因“腹泻、菌痢?”住院治疗缓解。腹部 B 超示:肝右叶单发直径 1.5 cm 囊肿。曾于粪便中发现有叶状伪足的滋养体。此病原体从肠道感染至肝的途径是

- A.从腹腔经淋巴系统入肝
 B.从胆道上行入肝
 C.从小肠经门静脉入肝
 D.从胃经门静脉入肝
 E.从结肠经门静脉入肝

【答案】E

【解析】阿米巴病的病变部位主要在盲肠和升结肠,其次为乙状结肠和直肠。

78.女,42 岁。烧心半年,无吞咽困难。胃镜检查提示慢性浅表性胃炎。为进一步明确诊断,应进行的检查是

- A.24 小时食管 pH 监测
 B.食管脱落细胞学检查
 C.胸部 CT
 D.食管 X 线钡剂造影
 E.动态心电图

【答案】A

【解析】内镜检查是诊断反流性食管炎最准确的方法,对于内镜下无异常改变的患者可给予 24 小时食管 pH 监测。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P817——辅助检查

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P257 第 27 题

79.男,30 岁。服毒自杀,被发现后急送医院。查体:昏迷状态,呼吸急促,皮肤湿冷,双侧瞳孔如针尖大小。使用阿托品治疗后,提示治疗效果不满意的指标是

- A.颜面潮红
 B.口干、皮肤干燥
 C.心率加快
 D.瞳孔大小无变化
 E.肺部湿啰音减少

【答案】D

【解析】阿托品为抗胆碱药,可以治疗急性有机磷中毒的毒蕈碱样作用。治疗时应达到阿托品化,即瞳孔较前扩大、口干、皮肤干燥、颜面潮红、心率加快、肺部湿啰音消失。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1616——治疗

80.女,30岁。里急后重伴排便不尽感2个月,大便带血近1个月。肛门见可复性肿物,直肠指诊于直肠侧壁触及柔软光滑有蒂包块。对于诊断最有意义的检查是

- A.经阴道 B超
B.结肠镜
C.结肠 X 线钡灌肠检查
D.盆腔 CT
E.经直肠 B 超

【答案】B

【解析】直肠息肉通过结肠镜做病理检查可以明确诊断。

81.男,45岁。呕血,便血2天。突然恶心,并呕出大量鲜血,头晕、四肢无力。乙肝病史24年。查体:腹部膨隆,肝肋下2cm,脾肋下4cm,移动性浊音(+)。最可能的出血原因是

- A.胆石病
B.门静脉高压症
C.胃癌
D.十二指肠溃疡
E.胃溃疡

【答案】B

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P841——临床表现

82.男,30岁。外伤性脾破裂脾切除术后3天。查体:BP 106/68mmHg,中心静脉压18 cmH₂O。此时应采取的治疗措施是

- A.利尿
B.舒张血管
C.收缩血管
D.适当补液
E.充分补液

【答案】B

【解析】血压正常,中心静脉压升高,提示容量血管过度收缩,应舒张血管。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P802——治疗

83.男,50岁。大便变细、次数增多3个月,伴肛门下坠感、里急后重,常有黏液血便,进行性加重。首先应进行的检查是

- A.腹部 B 超
B.直肠镜
C.下消化道 X 线钡剂造影
D.直肠指诊
E.大便隐血

【答案】D

【解析】大便隐血用于普查或高危人群的初筛手段,直肠指检是临床上首选的检查,直肠镜可以明确诊断。

84.男,70岁。腹部绞痛伴腹胀4小时,无呕吐。下消化道 X 线钡剂造影见直肠上段钡剂受阻,钡影尖端呈“鸟嘴”形。最可能的诊断是

- A.肠套叠
B.乙状结肠癌
C.乙状结肠扭转
D.直肠癌
E.小肠扭转

【答案】C

85.女,30岁。左手示指末节皮下感染5天,伴剧烈跳痛,肿胀明显,需切开引流。正确的切口应是

- A.经甲床切开
 B.经甲沟切开
 C.指末端鱼口状切口
 D.指侧面纵切口
 E.末节指腹横切口

【答案】D

【解析】脓性指头炎一旦出现跳痛,应立即做切开引流,在患指侧面做纵行切口或两侧对口引流。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1591——脓性指头炎的病因、临床特点和治疗

86.男,32岁。2天前饮酒后出现右上腹疼痛,向右肩部放射。查体:右上腹肌紧张,压痛(+),Murphy征(+)。最可能的诊断是

- A.十二指肠球部溃疡
 B.急性胃炎
 C.急性胆囊炎
 D.急性胰腺炎
 E.右肾结石

【答案】C

【解析】题眼“Murphy征(+)”,提示胆囊炎。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P852——临床表现。

87.女,25岁。白带增多5天。有不洁性交史。妇科检查:小阴唇内侧及外阴部见3个菜花状赘生物。为确诊应进行的辅助检查是

- A.宫颈刮片细胞学检查
 B.赘生物活组织检查
 C.阴道分泌物培养
 D.血常规、尿常规
 E.B超检查

【答案】B

【解析】题眼“菜花状赘生物”,提示癌性病变,确诊首选病理检查。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1088——诊断与鉴别诊断

88.女孩,9岁。发热、头痛、呕吐2天,烦躁不安1天,于2月20日入院。查体:T 39.8℃,BP 130/80mmHg,神志清,精神差,全身散在瘀点、瘀斑,颈抵抗(+),Kernig征(+),Babinski征(+)。实验室检查:血WBC $20 \times 10^9/L$,N 0.90。脑脊液检查:压力240mmH₂O,外观浮浊,WBC $1200 \times 10^9/L$,蛋白1.5g/L,糖1.5mmol/L,氯化物100mmol/L。最可能的诊断是

- A.钩端螺旋体
 B.中毒型细菌性痢疾
 C.流行性乙型脑炎
 D.结核性脑膜炎

E.流行性脑脊髓膜炎

【答案】E

【解析】脑膜刺激征阳性,脑脊液呈化脓性改变,提示流脑。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1518——辅助检查

89.男,50 岁。行胃癌根治术后 2 小时腹腔引流出不凝血 800ml。BP 86/60mmHg, CVP 由 8cmH₂O 降至 4cmH₂O。此时应采取的最恰当的措施是

- A.给予血管收缩药
B.补液观察
C.再次手术止血
D.内镜电凝血
E.输血观察

【答案】B

【解析】血压和中心静脉压均较低,提示血容量严重不足,应给予补液治疗。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P802——治疗

90.女,25 岁。上腹痛、腹胀 4 个月。3 周前上消化道 X 线钡剂造影未见异常。口服法莫替丁 20mg,每日 2 次,1 周后上腹痛缓解,仍觉餐后上腹胀。目前最适宜的治疗药物是

- A.铝碳酸镁
B.硫糖铝
C.西咪替丁
D.氢氧化铝
E.多潘立酮

【答案】E

【解析】餐后饱胀及早饱应给予促胃肠动力药,如多潘立酮和莫沙必利。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P825——治疗

91.男,74 岁。腹股沟疝修补术后 2 年,复发 3 个月,要求手术治疗。考虑患者年老、腹壁薄弱,最适宜的术式是

- A.Bassini 法
B.McVay 法
C.Halsted 法
D.Ferguson 法
E.Lichtenstein 法

【答案】A

92.女,30 岁。转移性右下腹痛 5 天,加重伴畏寒、发热 2 天。查体:全腹肌紧张,有明显压痛和反跳痛,麦氏点压痛明显,肠鸣音消失。腹腔穿刺抽出脓性液体、细菌培养结果最有可能的是

- A.粪链球菌
B.铜绿假单胞菌
C.变形杆菌
D.金黄色葡萄球菌
E.大肠杆菌

【答案】E

【解析】转移性右下腹痛提示阑尾炎,全腹肌紧张、有明显压痛和反跳痛提示腹膜炎。继发性腹膜炎的致病菌以大肠杆菌最多见。

93.男,60岁。右上腹剧烈疼痛2天,黄疸、发热1天。首选的检查是

- A.腹部B超
 B.腹部X线平片
 C.磁共振胰胆管造影
 D.腹部CT
 E.经内镜逆行胰胆管造影

【答案】A

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P852——诊断

近似考题:《2015年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P268第2题

94.男,68岁。皮肤及巩膜黄染2周。无腹痛及发热。查体:皮肤巩膜明显黄染,右上腹可触及肿大的胆囊,张力高,无压痛。最可能的诊断是

- A.胆管结石
 B.肝癌
 C.慢性胰腺炎
 D.胆囊结石
 E.胰头癌

【答案】E

【解析】Courvoisier征是诊断胰腺癌的重要体征,查体时可扪及囊状、无压痛、表面光滑并可推移的肿大胆囊。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P861——临床表现

近似考题:《2015年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P272第10题

95.男,36岁。双侧颈部淋巴结肿大伴发热1周。查体:T 38.4℃,颈部和右侧腹股沟可触及数枚肿大淋巴结,最大3cm×2cm,均活动、无压痛,心肺未见异常,腹平软,肝肋下未触及,脾肋下2cm。实验室检查:Hb 128g/L,WBC $6.0 \times 10^9/L$,Plt $120 \times 10^9/L$,左侧颈部淋巴结活检诊断为霍奇金淋巴瘤。根据Ann Arbor临床分期标准,该患者的临床分期是

- A. II EB
 B. III SB
 C. III A
 D. II B
 E. III EB

【答案】B

【解析】淋巴瘤临床分期中的III期指病变累及横膈上下,如伴随脾脏(Spleen)受损为III S,否则为III E;再根据各期有无全身症状分为A、B两组,A组无症状,B组可有发热、体重减轻、盗汗。故选B。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1160——临床表现及分期

96.男,62岁。上腹痛2周。既往高血压病史10余年,反复心前区疼痛发作2个月,口服阿司匹林100mg/日。上消化道X线钡剂造影:胃角切迹壁外龛影,¹³C尿素呼气试验阴性。最适宜的治疗药物是

- A.雷尼替丁
 B.多潘立酮
 C.枸橼酸铋钾
 D.奥美拉唑

E. 氢氧化铝

【答案】D

【解析】阿司匹林抑制 COX-2, 导致维持黏膜再生的前列腺素不足, 可导致急性胃炎。治疗上应抑制胃酸分泌或保护胃粘膜, 以抑制胃酸作用最强。

97. 女, 31 岁。腹泻、便秘交替出现 4 个月, 大便多为糊状, 无粘液脓血, 无里急后重, 伴低热、乏力、盗汗。查体: 轻度贫血貌, 右下腹有压痛。粪常规(-)。最可能的诊断是

- A. 肠易激综合征
- B. 结肠炎
- C. 溃疡性结肠炎
- D. 肠巴痢疾
- E. 肠结核

【答案】E

【解析】题眼“低热、乏力、盗汗”提示结核病。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P876——临床表现

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P277 第 34 题

98. 女, 30 岁。因头痛 3 个月, 加重伴呕吐、间断抽搐、视物模糊 1 个月就诊。近 2 年来, 喜食生肉。眼底检查发现视神经乳头水肿。最可能的诊断是

- A. 脑囊尾蚴病
- B. 结核性脑膜炎
- C. 链球菌性脑膜炎
- D. 脑肿瘤
- E. 病毒性脑炎

【答案】A

【解析】题眼“喜食生肉”, 提示囊尾蚴病。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1563——临床表现

99. 男, 35 岁。间断腹痛、腹泻 2 年。受凉后加重, 大便 2~4 次/日, 多为不成形变, 时带黏液, 排便后腹痛可缓解。体重无明显变化。平常少量饮酒。结肠镜检查无异常。最可能的诊断是

- A. 慢性胰腺炎
- B. 功能性消化不良
- C. 酒精性肝硬化
- D. 肠易激综合征
- E. 肠道感染病毒

【答案】D

【解析】肠易激综合征有排便特点和粪便性状的改变, 但无器质性病变, 在排便后症状可缓解。功能性消化不良表现为餐后饱胀、早饱、上腹痛等。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P870——临床表现

100. 男, 42 岁。右上腹突发剧烈疼痛 2 小时, 伴呕吐、尿黄。发病前 3 小时饮白酒约 300ml, 并进食较多油腻食物。查体: 右上腹右压痛及反跳痛。最有诊断价值的检查是

- A. 尿淀粉酶
- B. 腹部 B 超
- C. 胃镜
- D. 血淀粉酶

E.腹部 X 线平片

【答案】B

【解析】进食油腻食物后突发右上腹疼痛,提示急性胆囊炎,右上腹有反跳痛提示炎症波及浆膜。诊断胆道疾病最有价值的检查是 B 超。

101.男,72 岁。发作性关节肿痛 2 年。查体:左膝关节红肿、压痛,浮髌试验阳性。实验室检查:血沉 45mm/h,血尿酸增高。最可能的诊断是

A.类风湿关节炎

B.感染性关节炎

C.银屑病关节炎

D.反应性关节炎

E.痛风关节炎

【答案】E

【解析】题眼“血尿酸增高”,提示痛风。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1233——诊断与鉴别诊断

102.男,43 岁。右下腹疼痛,行走后加重 3 年,右小腿疼痛日益加重,时常出现沿表浅静脉走行的局部压痛、硬结。吸烟 20 余年,最有可能的诊断是

A.动脉瘤

B.血栓闭塞性脉管炎

C.多发性动脉炎

D.雷诺综合征

E.动脉硬化性闭塞症

【答案】B

【解析】动脉硬化性闭塞症一般不波及浅静脉;血栓闭塞性脉管炎有吸烟史,波及浅静脉,病变血管呈节段性。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P807——诊断与鉴别诊断

103.女,60 岁。被家人发现昏迷在浴室内,浴室使用燃气热水器。查体:皮肤潮红,瞳孔大小正常,口唇樱桃红色。最有可能的诊断是

A.阿托品中毒

B.一氧化碳中毒

C.乙醇中毒

D.有机磷杀虫药中毒

E.镇静催眠药中毒

【答案】B

【解析】题眼“燃气”“樱桃红色”,提示一氧化碳中毒。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1618——临床表现

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P527 第 10 题

104.女,79 岁。因胆囊结石、胆囊炎入院,保守治疗 5 天后腹痛加剧。查体:T 39.5℃,P 120 次/分,BP 106/70mmHg。皮肤及巩膜无黄染,右上腹肌紧张,局限性压痛、反跳痛。血常规:WBC $20 \times 10^9/L$,N 0.89。最适合的治疗是

- A. 胆囊造瘘术
B. 胆总管切开引流术
C. 静脉点滴抗菌药物
D. 鼻胆管引流术
E. 腹腔引流术

【答案】A

【解析】患者年龄大,高热,右上腹局限性腹膜炎,应先行胆囊造口术,待 3 个月病情稳定后再行胆囊切除术。

105.男,25 岁。头晕、乏力 1 周,发热伴牙龈出血 2 天。既往体健。查体:T 38.2℃,四肢及躯干皮肤可见出血点,胸骨压痛(+),心肺未见异常,腹平软,肝脾肋下未触及。实验室检查:Hb 78g/L,WBC $2.0 \times 10^9/L$,Plt $20 \times 10^9/L$;骨髓细胞学检查原始细胞占 0.85,髓过氧化物酶染色(-),非特异性脂酶染色(-)。该患者应选择的化疗方案是

- A. VAD 方案
B. VDLP 方案
C. ABVD 方案
D. DA 方案
E. CHOP 方案

【答案】B

【解析】患者骨髓中原始细胞占 0.85,考虑急性白血病;髓过氧化物酶染色和非特异性脂酶染色均为阴性,考虑 ALL;ALL 的治疗方案以长春新碱(V)和泼尼松(P)为基础,可加入柔红霉素(D)和左旋门冬酰胺酶(L)。故选 B。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1154——治疗

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P370 第 39 题

(106~107 题共用题干)

女,29 岁。右乳红肿 3 个月。查体:右乳皮肤红肿,呈桔皮样改变,未触及肿物,右腋窝可触及多个肿大、质硬、融合淋巴结。皮肤活检在真皮淋巴管内查见癌栓,ER、PR 阳性,C-erbB2(HER2)阴性。

106.最可能的诊断是

- A. 炎性乳腺癌
B. 小叶原位癌
C. 乳头状癌
D. 髓样癌
E. 乳头湿疹样乳腺癌

【答案】A

【解析】炎性乳癌,顾名思义,即乳房皮肤有红肿热痛的炎性表现,发展迅速、预后差。湿疹样癌的乳房皮肤有湿疹的表现,即发红、糜烂、潮湿。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1608——临床表现

107.最佳的综合治疗顺序是

- A. 治疗、手术、化疗、内分泌治疗
B. 内分泌治疗、手术、放疗、化疗
C. 手术、化疗、放疗、内分泌治疗
D. 手术、放疗、化疗、内分泌治疗
E. 化疗、手术、放疗、内分泌治疗

【答案】B

【解析】患者雌激素和孕激素的受体均阳性,故首选内分泌治疗,可给予雌激素受体拮抗剂他莫昔芬。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1610——治疗

(108~111 题共用题干)

男,45 岁,发热 3 天,少尿 1 天,于 12 月 15 日入院。查体:BP 60/30mmHg,神志清,球结膜充血、水肿,双腋下见出血点。实验室检查:血 WBC $25 \times 10^9/L$,Plt $50 \times 10^9/L$,尿蛋白(++++)

108.最可能的诊断是

- | | |
|-----------|---------|
| A.立克次体病 | B.急性肾炎 |
| C.肾综合征出血热 | D.流行性感冒 |
| E.钩端螺旋体病 | |

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1535——临床表现

109.为明确诊断应进行的检查是

- | | |
|-----------------|---------|
| A.肥达—外斐反应 | B.尿培养 |
| C.血清汉坦病毒特异性抗体检测 | D.咽拭子培养 |
| E.钩端螺旋体显微凝集试验 | |

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1536——诊断

110.病原治疗首选的药物是

- | | |
|--------|--------|
| A.四环素 | B.环丙沙星 |
| C.利巴韦林 | D.金刚烷胺 |
| E.青霉素 | |

【答案】C

【解析】肾病综合征出血热为汉坦病毒感染的疾病,应使用抗病毒药,而 D 是抗流感病毒药物,对其无效;C 是广谱抗病毒药,故选 C。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1536——治疗

111.不必要的处理是

- | | |
|-----------|-----------|
| A.应用糖皮质激素 | B.纠正酸中毒 |
| C.应用抗病毒药 | D.快速补充血容量 |
| E.静脉滴注青霉素 | |

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1536——治疗

(112~115 题共用题干)

男,32 岁。突发上腹剧痛 2 小时。蔓延至右下腹及全腹。既往有“胃痛”病史 10 余年,未诊治。查体:板状腹,压痛、反跳痛(+),肝浊音界消失。

112.初步诊断应首先考虑

- | | |
|---------------|-------------|
| A.绞窄性肠梗阻 | B.急性阑尾炎合并穿孔 |
| C.急性出血性坏死性胰腺炎 | D.急性胆囊炎合并穿孔 |
| E.胃十二指肠溃疡急性穿孔 | |

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P827——并发症

113.首选的检查方法是

- | | |
|---------|--------------|
| A.血生化 | B.立位腹部 X 线平片 |
| C.血淀粉酶 | D.腹部 B 超 |
| E.腹部 CT | |

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P830——急性穿孔的诊断、治疗和手术指征

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P259 第 52 题

114.决定是否手术治疗,术前最长的观察治疗时间(指上腹剧痛后)是

- | | |
|------------|------------|
| A.6~8 小时 | B.14~16 小时 |
| C.10~12 小时 | D.1~2 小时 |
| E.3~5 小时 | |

【答案】A

115.非手术治疗中最重要的措施是

- | | |
|---------|--------|
| A.止痛 | B.胃肠减压 |
| C.抗生素治疗 | D.洗胃 |
| E.低压灌肠 | |

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P830——急性穿孔的诊断、治疗和手术指征

(116~117 题共用题干)

男,44 岁。胃癌根治术后第 6 天,出现上腹剧烈疼痛,逐渐加重,伴恶心、呕吐、腹胀。查体腹膜刺激征(+).腹腔引流管引出咖啡色浑浊液体。腹部 B 超提示胸腔积液。

116.最可能的诊断是

- | | |
|---------------|--------------|
| A.急性梗阻性化脓性胆管炎 | B.肠系膜血管缺血性疾病 |
| C.急性胆囊炎 | D.吻合口瘘 |

E. 急性胰腺炎

【答案】D

【解析】咖啡色引流液提示血液在胃酸的作用下形成正铁血黄素,故只有吻合口瘘符合要求。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P828——主要手术目的、方法和术后并发症

117. 针对上述情况,应采取的治疗措施中不包括的是

- | | |
|-----------|---------|
| A. 肠外营养支持 | B. 吗啡止痛 |
| C. 应用生长抑素 | D. 禁食 |
| E. 胃肠减压 | |

【答案】B

【解析】急腹症患者明确诊断之前,不可使用吗啡类强效镇痛剂,以防掩盖病情延误治疗。

(118~120 题共用题干)

女,16 岁。被倒塌的房屋压伤后腹痛伴呕吐 1 小时。查体:P 140 次/分,R 26 次/分, BP 80/54mmHg。神志清,痛苦面容,腹肌紧张,有压痛和反跳痛,移动性浊音(+),肠鸣音消失。

118. 伤后 1 小时,对判断有无腹部脏器损伤价值最小的实验室检查结果是

- | | |
|----------------|---------------|
| A. 粪便常规有大量红细胞 | B. 血细胞比容下降 |
| C. 尿中可见大量红细胞 | D. 红细胞及血红蛋白下降 |
| E. 白细胞及中性粒细胞升高 | |

【答案】E

【解析】E 不仅见于腹腔内脏器损伤时,同时也是机体对创伤的一种反应,诊断意义不大。

119. 若行急症手术,原则上应首先探查

- | | |
|------------|----------|
| A. 空肠和回肠 | B. 肝脏和脾脏 |
| C. 结肠和直肠 | D. 胃和大网膜 |
| E. 十二指肠和胰腺 | |

【答案】B

【解析】原则上应先探查肝、脾等实质性器官。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P908——急症手术探查指征

120. 非手术治疗,最主要的措施是

- | | |
|-----------------|--------------|
| A. 应用止血药物 | B. 应用止痛药物 |
| C. 给予一次大剂量糖皮质激素 | D. 使用大剂量抗菌药物 |
| E. 快速补充血容量 | |

【答案】E

命中考点：《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P907——非手术治疗

(121~122 题共用题干)

男,47 岁。交通事故导致右肘关节上方被车轮压伤 2 小时。剧痛,出血较多。查体:P 96 次/分,BP 88/60mmHg,神志清楚,右肘窝伤口已加压包扎,敷料鲜血渗透,桡动脉搏动消失。

121.该患者送入医院,进行处理时首先应

- A.指压法压迫患肢肱动脉止血
- B.用止血带绕扎上臂止血
- C.用细绳索捆扎上臂止血
- D.静脉输入止血药
- E.再加压包扎伤口

【答案】B

命中考点：《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1596——急救

122.若伤口不能立即处理,放松止血带的时间至多是

- A.1.5 小时
- B.2.5 小时
- C.2 小时
- D.0.5 小时
- E.1 小时

【答案】E

【解析】止血带使用时应每隔 1 小时放松 1~2 分钟。

(123~124 题共用题干)

女,54 岁。双肩、双手近端指间关节、掌指关节肿痛 3 年,晨僵 1 小时。查体:双腕、双手 2~4 掌指关节及 3~4 近端指间关节肿胀,压痛(+),ANA(-)。

123.最可能的诊断是

- A.强直性脊柱炎
- B.类风湿关节炎
- C.反应性关节炎
- D.骨关节炎
- E.痛风关节炎

【答案】B

命中考点：《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1401——诊断标准和鉴别诊断

124.该患者关节病变的基本病理特征是

- A.血管炎
- B.软骨炎
- C.滑膜炎
- D.附着点炎
- E.韧带炎

【答案】C

【解析】类风关是滑膜炎,强脊是附着点炎,SLE 是小血管炎。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1396——病理

(125~126 题共用题干)

男,63 岁。上腹部不适、消瘦半年。体重下降 8kg,粪隐血试验阳性。查体:剑突下深压痛,无反跳痛。

125.应首先考虑的诊断是

- | | |
|----------|-------|
| A.慢性胃炎 | B.胃溃疡 |
| C.十二指肠溃疡 | D.胃癌 |
| E.慢性胆囊炎 | |

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P831——临床表现

126.对明确诊断最有意义的检查是

- | | |
|------------|----------------|
| A.胃镜 | B.上消化道 X 线钡剂造影 |
| C.腹部超声 | D.腹部 CT |
| E.C 尿素呼气试验 | |

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P831——诊断

(127~128 题共用题干)

男,45 岁。1 天前进食较硬食物后突发呕血 1 次,约 400ml,排黑色糊状便 2 次,每次量约 200g,无腹痛。既往乙型肝炎病史 14 年,1 年前曾发生类似呕血 1 次。查体:BP 105/65mmHg。皮肤巩膜无黄染,腹软,无压痛,肝肋下未触及,脾肋下 2cm,移动性浊音阴性,肠鸣音 4~5 次/分。实验室检查:Hb 95g/L,WBC $2.5 \times 10^9/L$,Plt $47 \times 10^9/L$ 。

127.首先考虑的出血原因是

- | | |
|--------------|----------|
| A.急性糜烂出血性胃炎 | B.胃癌 |
| C.胃溃疡 | D.贲门粘膜撕裂 |
| E.食管胃底静脉曲张破裂 | |

【答案】E

【解析】患者有肝炎的病史,查体脾大,目前呕血、黑便,考虑肝硬化门脉高压导致的食管胃底静脉曲张破裂。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P841——临床表现

128.目前最有意义的检查方法是

- | | |
|----------------|----------|
| A.胃镜 | B.腹部 CT |
| C.腹部 B 超 | D.腹部 MRI |
| E.上消化道 X 线钡剂造影 | |

【答案】A

【解析】胃镜可以明确出血位置,并可控制急性出血。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P841——诊断

(129~131 题共用题干)

男,70 岁。乏力、腰痛半个月。体健。查体:轻度贫血貌,第 2~4 腰部压痛,实验室检查:Hb 80g/L,WBC $5.6 \times 10^9/L$,Plt $156 \times 10^9/L$;血清总蛋白 108g/L,白蛋白 30g/L,血肌酐 $177 \mu\text{mol/L}$;骨髓细胞学检查示骨髓中异常浆细胞占 0.45;腰椎 X 线片示第 2 腰椎压缩性骨折。

129.为进一步明确诊断,下一步最需做的检查是

- | | |
|-----------------------|-----------|
| A.血清 β_2 微球蛋白测定 | B.尿本周蛋白测定 |
| C.尿常规 | D.血清钙测定 |
| E.血、尿免疫球蛋白鉴定 | |

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1164——辅助检查

130.根据目前的临床资料及 Durie 和 Satmon 临床分期标准,该患者最可能的临床分期是

- | | |
|----------|----------|
| A.Ⅲ期 B 组 | B.Ⅱ期 A 组 |
| C.Ⅰ期 B 组 | D.Ⅱ期 B 组 |
| E.Ⅲ期 A 组 | |

【答案】A

【解析】Hb $>100\text{g/L}$ 属于Ⅰ期,Hb $<85\text{g/L}$ 属于Ⅲ期,介于二者之间的属于Ⅱ期。根据肾功能的情况分为 A 和 B 两组,肾功能正常为 A 组,肾功能损害为 B 组。故选 A。

131.该患者疾病最可能的类型是

- | | |
|----------|---------|
| A.不分泌型 | B.IgG 型 |
| C.轻链型 | D.IgE 型 |
| E. IgD 型 | |

【答案】B

【解析】IgG 型最常见,故选 B。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1163——分类

(132~134 题共用题干)

女,66 岁。右上腹疼痛伴发热、寒战 5 天。糖尿病病史 20 年,胆石症胆囊炎切除术后 2 年。查体:巩膜黄染,心肺未见异常,肝肋下 2cm,压痛(+),肝区叩击痛(+).血常规:WBC $15 \times 10^9/L$,N 0.85。

132.为明确诊断,首选的检查是

- | | |
|------------|----------|
| A.腹部血管造影 | B.腹部 B 超 |
| C.腹部 X 线平片 | D.肝脏穿刺 |

E. 静脉胆系造影

【答案】B

【解析】患者有急性胆管炎的 Charcot 三联征,即腹痛、寒战高热和黄疸。胆道系统的疾病首选 B 超检查。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P854——临床表现

133. 该患者最可能的病原体来源是

A. 皮肤及软组织

B. 胆道系统

C. 肠道

D. 呼吸系统

E. 泌尿系统

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P854——临床表现

134. 目前最重要的治疗是

A. 手术

B. 应用广谱抗生素

C. 抗结核

D. 抗真菌

E. 应用保肝药物

【答案】B

【解析】治疗包括非手术治疗和手术治疗,非手术治疗既是治疗手段又是术前准备,主要是联合应用足量有效的广谱抗生素。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P854——治疗

(135~136 题共用题干)

男,50 岁。右大腿被撞伤 12 天。局部肿痛,行走困难。近 3 天寒战、发热,体温最高到达 40℃,伴恶心、烦躁。查体:P 110 次/分,R 22 次/分,BP 100/70mmHg,重病容。扁桃腺肿大,双肺呼吸音粗糙,右大腿外侧明显肿胀,压痛(+),局部无波动感。血 WBC $24 \times 10^9/L$ 。

135. 为明确诊断,最有意义的检查方法是

A. 咽拭子培养

B. 正侧位胸部 X 线片

C. 右大腿肿胀处 B 超检查

D. 血常规+血沉

E. 患者高热时行血培养检查

【答案】E

【解析】血培养可明确感染的病原体,达到病因诊断。

136. 若采取多种治疗未好转,体温每日仍波动于 38℃~40℃之间,呼吸深快,右大腿肿痛加重,有波动感。P 120 次/分,BP 90/50mmHg。应采取的主要措施是

A. 联合静脉内应用抗生素

B. 积极补液抗休克

C. 大剂量应用肾上腺糖皮质激素

D. 右大腿脓肿穿刺并切开引流

E. 纠正代谢性酸中毒

【答案】D

【解析】患者此时右腿有波动感,应切开引流。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1588——治疗

(137~138 题共用备选答案)

- | | |
|------------|----------|
| A. 不规则深大溃疡 | B. 多发浅溃疡 |
| C. 纵形溃疡 | D. 环形溃疡 |
| E. 烧瓶样溃疡 | |

137. 克罗恩病最典型的肠道溃疡形态是

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P866——诊断和鉴别诊断

138. 溃疡性结肠炎最常见的肠道溃疡形态是

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P866——诊断和鉴别诊断

(139~140 题共用备选答案)

- | | |
|-------------|------------|
| A. 错构瘤性息肉 | B. 管状腺瘤性息肉 |
| C. 绒毛状腺瘤性息肉 | D. 炎性息肉 |
| E. 化生性息肉 | |

139. 10 岁以下儿童肠息肉最常见的类型是

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P878——临床表现

140. 克罗恩病所见息肉主要是

【答案】D

【解析】肠息肉包括腺瘤性息肉和非肿瘤性息肉。腺瘤性息肉是癌前病变,包括管状息肉、绒毛状息肉和管状绒毛状息肉。非肿瘤性息肉包括幼年性息肉(是一种错构瘤)和炎性息肉(见于溃疡性结肠炎、克罗恩病等炎性刺激形成的息肉)。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P865——病理

(141~142 题共用备选答案)

- | | |
|----------|-----------------------|
| A. 脂肪酶 | B. 磷脂酶 A ₂ |
| C. 弹力蛋白酶 | D. 糜蛋白酶 |
| E. 胰蛋白酶 | |

141.在急性胰腺炎的发病机制中,与血管破坏导致出血关系密切的酶是

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P857——发病机制

142.在急性胰腺炎发病机制中,与胰腺组织坏死和溶血关系密切的酶是

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P857——发病机制

(143~144 题共用备选答案)

A. $0.2 \times 10^9 / L$

B. $0.5 \times 10^9 / L$

C. $4.0 \times 10^9 / L$

D. $1.5 \times 10^9 / L$

E. $3.0 \times 10^9 / L$

143.白细胞减少症的诊断标准是指外周血白细胞总数低于

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1166——诊断

144.粒细胞缺乏症的诊断标准是指外周血的中性粒细胞绝对数低于

【答案】B

【解析】白细胞减少症指白细胞总数 $< 4.0 \times 10^9 / L$; 粒细胞减少症指粒细胞总数 $< 2.0 \times 10^9 / L$; 粒细胞缺乏症指粒细胞总数 $< 0.5 \times 10^9 / L$ 。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1166——诊断

(145~146 题共用备选答案)

A. 肥大细胞

B. 主细胞

C. G 细胞

D. 壁细胞

E. 黏液细胞

145.分泌促胃液素的细胞是

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P95——胃肠激素及其作用

146.分泌组胺的细胞是

【答案】A

(147~148 题共用备选答案)

A. 输血、注射

B. 消化道传播

C. 生活接触

D. 呼吸道传播

E. 性接触

147.戊型肝炎的主要传播途径是

【答案】B

【解析】甲肝和戊肝主要经消化道传播,乙肝、丙肝、丁肝主要经血液传播。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1531——流行病学

148.丙型肝炎的主要传播途径是

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1531——流行病学

(149~150 题共用备选答案)

A.青霉素

B.多西环素

C.四环素

D.头孢曲松

E.红霉素

149.治疗淋病首选的药物是

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1570——治疗

150.孕妇患梅毒时首选的治疗药物是

【答案】A

【解析】淋病首选第三代头孢;梅毒首选青霉素,包括孕妇。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1571——治疗

第 四 单 元

1. 急性硬脑膜外血肿最常合并的颅脑损伤是

- A. 脑水肿
 B. 颅骨骨折
 C. 脑积水
 D. 脑挫伤
 E. 脑干损伤

【答案】B

【解析】急性硬脑膜外血肿常见于青壮年男性颅骨线形骨折。

2. 糖尿病合并妊娠, 孕期血糖控制良好, 终止妊娠的理想时间是

- A. 妊娠 32~33 周
 B. 妊娠 38~39 周
 C. 妊娠 34~35 周
 D. 妊娠 36~37 周
 E. 妊娠 40 周

【答案】B

【解析】妊娠满 37 周不满 42 足周期间分娩称为足月产, 患者孕期血糖控制良好, 当然应在足月产终止妊娠; 因糖尿病合并妊娠有风险, 故应在足月产中及早终止妊娠, 选 B 不选 E。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1051——处理

3. 滴虫阴道炎最常见的传播途径是

- A. 性直接接触传染
 B. 经血循环感染
 C. 间接接触感染
 D. 内源性感染
 E. 经淋巴循环感染

【答案】A

【解析】由于男性感染滴虫后常无症状, 易成为感染源。治疗需要男女同治。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1079——传播途径

4. 晚期卵巢癌最常见症状是

- A. 腹痛
 B. 阴道流血
 C. 腹胀
 D. 便秘
 E. 发热

【答案】C

【解析】卵巢癌晚期主要症状为腹胀, 腹部肿块及胃肠道症状。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1096——临床表现

5. 婴儿顽固性便秘、腹胀、呕吐、营养不良, 首先考虑的诊断是

- A. 幽门狭窄
 B. 先天性肥厚性幽门狭窄

- C.胃食管反流病
D.胃扭转
E.先天性巨结肠

【答案】E

【解析】胎便排出延缓,顽固性便秘,呕吐,营养不良,均为先天性巨结肠的临床症状。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1470——临床表现

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P480 第 7 题

- 6.多囊卵巢综合征的常见月经改变是
A.月经周期正常,经量过多
B.月经频发
C.月经周期正常,经量过少
D.月经周期正常,经期延长
E.月经稀发

【答案】E

【解析】多囊卵巢综合征最主要的症状是月经失调,主要表现为月经稀发,甚至闭经。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1114——诊断与鉴别诊断

- 7.低渗性脱水危及患儿生命的常见情况是
A.低钾血症
B.低钙血症
C.低血容量休克
D.代谢性酸中毒
E.中枢神经系统并发症

【答案】C

- 8.以下生理性与病理性因素中,不影响颅内压变化的是
A.脑脊液动力学改变
B.脑组织血流改变
C.脑组织肿胀
D.颅骨的完整性
E.颅骨密度改变

【答案】E

- 9.中毒型细菌性痢疾的诊断中,不强调的是
A.反复惊厥,发生休克或呼吸衰竭
B.病情迅速恶化
C.急性起病伴高热
D.大便检查异常
E.脑膜刺激征阳性

【答案】E

【解析】中毒性菌痢起病急,突起高热,可伴头痛、畏寒,病情迅速恶化并出现反复惊厥,但是肠道症状轻微,甚至无腹痛和腹泻。其确诊依据是大便培养。中毒型细菌性痢疾可有脑膜刺激征,但休克型主要表现为感染性休克,无脑膜刺激征的表现,故选 E。

- 10.不符合左向右分流先天性心脏病共同特征的是
A.胸骨左缘收缩期杂音
B.容易并发肺部感染
C.生长发育落后
D.肺动脉瓣区第二心音增强
E.蹲踞现象

【答案】E

【解析】蹲踞现象是法洛四联症的特征性表现,属于右向左分流的先天性心脏病。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1491——分类

11. 甾体激素避孕药的避孕机理不包括

- | | |
|----------------|--------------|
| A. 影响输卵管生理功能 | B. 改变宫颈粘液的性状 |
| C. 抑制排卵 | D. 阻止精子与卵子结合 |
| E. 改变子宫内膜形态与功能 | |

【答案】D

【解析】阻止精子与卵子的结合是避孕套与输卵管绝育术的避孕机理。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1130——避孕机制

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P358 第 2 题

12. 过期妊娠需迅速终止妊娠的情况是

- | | |
|-----------------------|-------------|
| A. 缩宫素激惹试验阳性 | B. 无应激试验反应型 |
| C. 12 小时胎动 18 次 | D. 胎儿监护早期减速 |
| E. B 超羊水最大暗区垂直深度 40mm | |

【答案】A

【解析】缩宫素激惹试验阳性提示胎儿宫内储备能力差,应及时终止妊娠。

13. 抑郁症的处理措施中最首要的是

- | | |
|-----------|-----------|
| A. 情绪状态 | B. 心理治疗 |
| C. 加强饮食营养 | D. 改善睡眠状况 |
| E. 评估自杀风险 | |

【答案】E

14. 早期流产最常见的原因是

- | | |
|-------------|-------------|
| A. 孕妇黄体功能不足 | B. 胚胎染色体异常 |
| C. 孕妇生殖器官异常 | D. 孕妇宫颈内口松弛 |
| E. 孕妇免疫功能异常 | |

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1019——病因

15. 下列不属于宫颈癌相关危险因素的是

- | | |
|----------|----------|
| A. 多个性伴侣 | B. 吸烟 |
| C. 未生育 | D. 不洁性行为 |
| E. 过早性行为 | |

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1086——病因

16. 确诊新生儿败血症最有意义的检查是

- A. 血培养
- B. 免疫功能测定
- C. 血常规
- D. 分泌物涂片革兰染色
- E. 血 CRP

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1436——辅助检查

17. 子宫内膜异位症的典型症状是

- A. 阴道不规则流血
- B. 接触性出血
- C. 阴道分泌物增多
- D. 继发性痛经
- E. 月经量增多

【答案】D

【解析】子宫内膜异位症的典型症状是继发性痛经,进行性加重。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1119——临床表现

18. 颅前窝骨折造成的熊猫眼征指的是

- A. 双侧视神经乳头水肿
- B. 眶周广泛瘀血斑
- C. 乳突部皮下瘀血斑
- D. 双眼视网膜出血
- E. 双额部皮肤表面瘀血

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1260——颅底骨折临床表现及处理

19. 不符合神经症共同特点的是

- A. 多无明显的精神性病性症状
- B. 社会功能多相对完好
- C. 与心理社会因素有关
- D. 症状可有相应的器质性病变
- E. 患者常有一定的易感素质

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1313——神经症的概念

20. 急性输血不良反应发生的时间为输血开始后

- A. 48 小时内
- B. 36 小时内
- C. 8 小时内
- D. 24 小时内
- E. 12 小时内

【答案】D

21. 不属于新生儿窒息 Apgar 评分内容的是

- A. 拥抱反射
- B. 肌张力
- C. 皮肤颜色
- D. 呼吸

E. 心率

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1428——临床表现

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P466 第 23 题

22. 下列胎心电子监测结果提示胎儿缺氧的是

- | | |
|-----------------|-------------|
| A. 胎心出现无应激试验反应型 | B. 胎心出现晚期减速 |
| C. 胎心出现加速 | D. 胎心出现变异减速 |
| E. 胎心出现早期减速 | |

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P999——胎儿宫内状况的监护

23. 最常见的脑膜刺激征阳性的疾病是

- | | |
|------------|-------------|
| A. 脑栓塞 | B. 脑血栓形成 |
| C. 高血压脑病 | D. 短暂性脑缺血发作 |
| E. 蛛网膜下腔出血 | |

【答案】E

24. 胎膜早破的病因不包括

- | | |
|--------------|-------------|
| A. 钙缺乏 | B. 维生素 C 缺乏 |
| C. 病原微生物上行感染 | D. 胎膜受力不均 |
| E. 羊膜腔压力增高 | |

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1040——病因

25. 正常胎儿成熟度的判定, 正确的是

- A. 羊水肌酐值 $\geq 88.4 \mu\text{mol/L}$ (1mg%) 提示胎儿肾成熟
- B. 羊水胆红素类物质 $\Delta\text{OD}_{450} < 0.10$, 提示胎儿肝成熟
- C. 羊水卵磷脂/鞘磷脂比值 > 1 , 提示胎儿肺成熟
- D. 羊水含脂肪细胞出现率 $> 10\%$, 提示胎儿皮肤成熟
- E. B 超测胎儿双顶径 $> 8.5\text{cm}$, 提示胎儿成熟

【答案】E

26. 前囟的正确测量方法是

- | | |
|-----------|-----------|
| A. 邻边中点连线 | B. 邻角顶点连线 |
| C. 对边中点连线 | D. 周径长度 |
| E. 对角顶点连线 | |

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1407——骨骼和牙齿发育

27. TIA 持续时间通常为

- A. 12 小时内
- B. 2 小时内
- C. 24 小时内
- D. 30 分钟内
- E. 48 小时内

【答案】D

28. 双侧四肢远端出现手套袜子样麻木, 病变的定位多在

- A. 神经丛
- B. 神经末梢
- C. 脊髓后角
- D. 神经干
- E. 脊髓后根

【答案】B

【解析】细菌性阴道病主要表现为分泌物增多, 无瘙痒或轻度瘙痒。

29. 细菌性阴道病的诊断标准不包括

- A. 阴道分泌物增多伴外阴瘙痒
- B. 匀质、稀薄、灰白色阴道分泌物
- C. 线索细胞阳性
- D. 阴道分泌物 pH 值 > 4.5
- E. 胺臭味试验阳性

【答案】A

【解析】外阴瘙痒为滴虫性阴道炎的临床表现。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1077——诊断

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P342 第 8 题

30. 为预防风湿复发, 长效青霉素注射时间至少持续

- A. 3 年
- B. 1 年
- C. 5 年
- D. 2 年
- E. 4 年

【答案】C

【解析】为预防风湿热复发, 长效青霉素注射时间至少持续 5 年, 最好持续至 25 岁; 有风湿性心脏病者, 宜进行终生药物预防。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1449——治疗

31. 关于小儿年龄分期, 错误的是

- A. 婴儿期是指自出生 28 天后到满 1 周岁前
- B. 胎儿期是指从受精卵开始至胎儿出生为止
- C. 学龄前期是指自 3 周岁后到 6~7 岁入小学前
- D. 新生儿期是指自胎儿出生脐带结扎到满 28 天
- E. 幼儿期是指自 1 周岁后到满 3 周岁前

【答案】A

【解析】婴儿期指出生到 1 周岁之前,包括新生儿期。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1405——小儿年龄分期和各期特点

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P451 第 4 题

32. 协调性子宫收缩乏力行人工破膜适用的临床情况是

- A. 臀先露, 宫口开大 2cm
- B. 足先露, 宫口开大 4cm
- C. 枕先露, S=0, 宫口开大 4cm
- D. 肩先露, 宫口开大 3cm
- E. 胎头高直后位, 宫口开大 2cm

【答案】C

【解析】协调性宫缩乏力人工破膜的适应证: 宫口扩张 $\geq 3\text{cm}$, 头盆相称, 胎心良好, 胎位正常, 头盆相称。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1056——子宫收缩过强的分类、诊断、处理

33. 幻觉是指

- A. 感觉器官在梦幻中的一种知觉体验
- B. 人脑的一种丰富想象的思维过程
- C. 感觉器官缺乏客观刺激时的知觉体验
- D. 人脑对客观事物的一种错误猜想
- E. 感觉器官对客观事物的错误知觉体验

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1296——常见精神症状

34. 下列关于女性外阴解剖结构的描述, 正确的是

- A. 前庭大腺位于大阴唇后部, 被球海绵体肌覆盖
- B. 阴道前庭有尿道外口, 阴道口和肛门
- C. 处女膜的表面上皮为柱状上皮
- D. 阴蒂分为阴蒂头和阴蒂脚两部分
- E. 大阴唇的外侧为皮肤, 内侧为粘膜

【答案】A

【解析】B. 阴道前庭有尿道外口, 阴道口, 无肛门。C. 处女膜由弹性结缔组织和胶原结缔组织共同组成, 其上下两面均覆盖有扁平上皮细胞。D. 阴蒂分为阴蒂头、阴蒂体和阴蒂脚三部分。E. 大阴唇的外侧为皮肤, 内侧湿润似黏膜。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P970——阴道前庭

35. 不支持重症肌无力诊断的临床依据是

- A.运动后四肢易疲劳
B.波动性眼睑下垂和复视
C.四肢肌无力晨轻暮重
D.低频电刺激电位衰减 $>10\%$
E.疲劳试验休息后症状无改善

【答案】E

【解析】重症肌无力患者早晨或休息后症状会有所改善。

36.关于妊娠滋养细胞肿瘤的发生,正确的是

- A.侵蚀性葡萄胎可继发于流产后
B.侵蚀性葡萄胎不会发生子宫外转移
C.侵蚀性葡萄胎多继发于葡萄胎清宫后1年以上
D.绝经后妇女不会发生绒毛膜癌
E.绒毛膜癌可继发于足月妊娠或异位妊娠后

【答案】E

【解析】侵蚀性葡萄胎全部继发于葡萄胎后,大多数仅造成局部侵犯,约4%发生远处转移;绒毛膜癌可继发于葡萄胎妊娠,多于葡萄胎清宫后1年以上,也可继发于非葡萄胎妊娠;绝经后妇女会发生绒毛膜癌。

37.苯丙酮尿症患儿需定期监测

- A.血苯丙氨酸
B.尿三氯化铁
C.尿蝶呤
D.血酪氨酸
E.尿有机酸

【答案】A

38.诊断缺铁性贫血铁减少期的敏感指标是

- A.血清铁蛋白
B.血红蛋白
C.红细胞游离原卟啉
D.转铁蛋白饱和度
E.血清铁

【答案】A

【解析】缺铁性贫血包括铁减少期、红细胞生成缺铁期和缺铁性贫血期。铁减少期主要表现为血清铁蛋白减少和骨髓小粒可染铁消失。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1142——诊断

39.对21-三体综合征最具诊断价值的是

- A.智能发育落后
B.特殊愚型面容
C.体格发育落后
D.染色体核型分析
E.通贯手

【答案】D

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1443——诊断与鉴别诊断

命中考题:《2015年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P468第3题

40. 不属于精神分裂症常见症状的是

- A. 阳性症状
 B. 冲动行为
 C. 记忆力减退
 D. 阴性症状
 E. 情感症状

【答案】C

41. 做 PPD 试验后观察结果的时间为

- A. 12 小时内
 B. 48~72 小时
 C. 72 小时以后
 D. 24~48 小时
 E. 12~24 小时

【答案】B

42. 重度蛋白质—能量营养不良患儿, 夜间睡眠中突然昏迷、死亡。其最常见的原因是

- A. 窒息
 B. 低血容量休克
 C. 败血症并急性化脓性脑膜炎
 D. 心力衰竭
 E. 自发性低血糖发作

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1422——并发症

近似考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P460 第 19 题

43. 轮状病毒肠炎容易出现的并发症是

- A. 肠穿孔
 B. 败血症
 C. 高钠血症
 D. 中毒性脑病
 E. 脱水、酸中毒

【答案】E

44. 下列关于人初乳的描述, 正确的是

- A. 糖含量高
 B. 脂肪含量最少而蛋白质含量最多
 C. 蛋白质含量较低
 D. 脂肪含量最高
 E. 蛋白质、糖及脂肪含量均最低

【答案】B

【解析】人初乳脂肪含量最少而蛋白质含量最多(主要为免疫球蛋白), 对新生儿的生长发育和抗感染能力十分重要。

45. 关于妊娠期母体内分泌系统的改变, 正确的是

- A. 皮质醇减少
 B. 催乳激素增多
 C. 卵泡刺激素增多
 D. 游离甲状腺激素增多
 E. 黄体生成激素增多

【答案】B

46. 关于新生儿呼吸系统生理特点的描述, 正确的是

- A. 肺表面活性物质至孕 28 周时迅速增加

- B.肺表面活性物质是由肺泡 I 型上皮细胞产生
- C.湿肺是由于肺部感染炎性渗出造成
- D.足月儿生后第 1 小时呼吸频率可达 80~90 次/分,伴呻吟、发绀
- E.早产儿呼吸不规则,易出现呼吸暂停

【答案】E

47.与自发性蛛网膜下腔出血发病最不相关的因素是

- A.脑血管畸形范围
- B.性别
- C.血压上升的程度
- D.颅内压力的变化
- E.动脉瘤的大小

【答案】B

48.有明显神经精神症状的营养性巨幼细胞贫血,应首选的治疗药物是

- A.右旋糖酐铁
- B.维生素 C
- C.硫酸亚铁
- D.维生素 B₁₂
- E.叶酸

【答案】D

49.在全球精神疾病谱中,负担最重的疾病是

- A.抑郁症
- B.阿尔茨海默病
- C.焦虑症
- D.精神分裂症
- E.强迫症

【答案】B

50.有关Ⅲ度胎盘早剥的描述,正确的是

- A.阴道流血量与贫血程度成正比
- B.易导致凝血功能障碍
- C.胎盘剥离面为胎盘面积的 1/5
- D.出现无原因无痛性阴道流血
- E.一般胎儿存活

【答案】B

【解析】Ⅲ度胎盘早剥的剥离面积 $>1/2$ 胎盘面积,由剥离面释放的组织凝血活酶入血可引起 DIC,后期因凝血因子的消耗可导致凝血功能障碍;出血量大,但阴道流血量与出血量不成正比;子宫硬如板状,胎心消失。D 选项是前置胎盘的典型表现。

51.女,39 岁。痛经进行性加重 5 年,月经量增多 2 年。妇科检查:子宫后位,球形增大,如 2 个月妊娠大小,活动欠佳,子宫触痛阳性,双附件区未触及异常。CA125 87U/ml。最可能的诊断是

- A.子宫肉瘤
- B.子宫腺肌病
- C.子宫内膜炎
- D.子宫内膜异位症
- E.子宫肌瘤

【答案】B

【解析】痛经进行性加重,月经量增多,子宫球形增大、触痛阳性,双附件未触及异常,符合子宫腺肌病的诊断。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1121——临床表现

命中考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P354 第 7 题

52.男婴,6 个月。出生时诊断为“法洛四联症”。近 2 天常于哭闹时突然四肢抽搐,青紫加重,神志不清,呼吸急促,持续时间约 2~3 分钟。首先应考虑为

- | | |
|--------|--------|
| A.脑栓塞 | B.休克 |
| C.脑脓肿 | D.缺氧发作 |
| E.心力衰竭 | |

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1496——临床表现

53.男婴,6 个月。高热 3 天,惊厥 2 次,呕吐 2 次,不伴腹泻。查体心、肺、腹均无异常。血 WBC $18 \times 10^9/L$,N 0.85。查体最应注意的体征是

- | | |
|-----------------|-------------------|
| A.前囟隆起 | B.颈强直 |
| C.Babinski 征(+) | D.Brudzinski 征(+) |
| E.Kerning 征(+) | |

【答案】B

【解析】化脑最常见的体征是颈强直。

54.女,53 岁。接触性出血 1 个月。妇科检查:宫颈后唇有一菜花样新生物,接触性出血阳性,宫体正常大小,附件(-)。该患者最可能的诊断是

- | | |
|---------|---------|
| A.子宫内膜癌 | B.急性宫颈炎 |
| C.宫颈肌瘤 | D.宫颈癌 |
| E.慢性宫颈炎 | |

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1087——临床表现

55.一健康女性,体重 8kg,身高 68cm,已能抓物、换手、独坐久,能发复音。其符合的最早月龄是

- | | |
|------------|------------|
| A.13~15 个月 | B.11~12 个月 |
| C.9~10 个月 | D.4~6 个月 |
| E.7~8 个月 | |

【答案】E

【解析】题眼“能发复音”提示 7 个月,因 7 个月的婴儿能发复音,叫“爸爸”“妈妈”。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1408——运动和语言发育

56.男,21 岁。右侧颞部受击伤后昏迷 30 分钟,清醒 5 小时后又转入昏迷,伴右侧瞳孔散大,左侧肢体瘫痪。首先考虑的诊断是

- A. 右侧急性硬脑膜外血肿
B. 右侧急性硬脑膜下积液
C. 脑干损伤
D. 右侧脑挫伤
E. 左侧脑内血肿

【答案】A

【解析】有中间清醒期,符合硬膜外血肿的诊断。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1263——临床表现

57.男,78岁,1天前凌晨醒来发现失语,右上肢活动无力进行性加重,但意识清楚,脑脊液检查无异常。最可能的诊断是

- A. 蛛网膜下腔出血
B. 脑出血
C. 脑栓塞
D. 短暂性脑缺血发作
E. 脑血栓形成

【答案】E

【解析】蛛网膜下腔出血和脑出血会有脑膜刺激征;脑栓塞多发生于青壮年,且起病急;短暂性脑缺血发作一般恢复完全,不留后遗症;脑血栓形成多于安静或睡眠中发生,多为60岁以上老人。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1269——诊断与鉴别诊断

58.初孕妇,26岁。妊娠38周。查体:P 90次/分,R 18次/分,BP 120/80mmHg。叩诊心浊音界稍向左扩大,心尖部闻及2/6级收缩期吹风样杂音。踝部轻度水肿。最可能的诊断是

- A. 妊娠期高血压疾病性心脏病
B. 风湿性心脏病合并妊娠
C. 心脏病合并妊娠,性质待查
D. 正常妊娠改变
E. 围生期心肌病

【答案】D

【解析】正常妊娠随着子宫增大心脏向左、上、前移位,心脏容量及心排量逐渐增加,故妊娠末期听到杂音及水肿属于正常妊娠改变。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P989——循环系统的变化

59.女婴,2天。嗜睡1天来诊。足月产,有窒息史。查体:R 30次/分,面色发绀,前囟饱满紧张,心率90次/分,心音低钝,四肢肌张力差,拥抱反射消失。最可能的诊断是

- A. 新生儿低血糖
B. 新生儿缺氧缺血性脑病
C. 新生儿肺透明膜病
D. 胎粪吸入综合征
E. 新生儿湿肺

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1429——诊断

60.女,47 岁。胃癌术后 2 年,下腹不适 3 个月。妇科检查:子宫正常大小,双侧附件区可触及一个手拳大小的椭圆形包块,移动性浊音(一)。最可能的诊断是

- | | |
|----------|--------------|
| A.卵巢卵黄囊肿 | B.卵巢纤维瘤 |
| C.卵巢库肯勃瘤 | D.卵巢子宫内膜异位囊肿 |
| E.卵巢畸胎瘤 | |

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P830——病理

61.女,65 岁。突发剧烈头痛后昏迷 1 小时。查体:深昏迷,颈强直,四肢无自主活动,肌张力高,腱反射活跃。头部 CT 示脑沟与脑池高密度影。最可能的诊断是

- | | |
|------------|-----------|
| A.短暂性脑缺血发作 | B.脑栓塞 |
| C.脑血栓形成 | D.蛛网膜下腔出血 |
| E.脑出血 | |

【答案】D

【解析】短暂性脑缺血发作 CT 无异常;脑栓塞和脑血栓形成都是低密度影;突发剧烈头痛、颈项强直、脑沟和脑池高密度影是蛛网膜下腔出血的关键词;脑出血不会出现颈项强直,会有肢体活动障碍,所以此答案是 D。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1273——诊断和鉴别诊断

62.女,74 岁。间断感觉环境晃动伴恶心 2 天。共发作 5 次,每次持续 10~15 分钟。有高血压病史。发作时查体:水平眼震阳性,左侧指鼻试验和跟膝胫试验阳性,闭目直立试验阳性。发作间歇期查体正常。双侧前庭功能试验正常。头颅 CT 无异常。可能的诊断是

- | | |
|------------|--------|
| A.短暂性脑缺血发作 | B.小脑梗死 |
| C.脑桥梗死 | D.小脑出血 |
| E.中脑梗死 | |

【答案】A

【解析】短暂性脑缺血发作的诊断主要是依靠详细病史,即突发性、反复性、短暂性和刻板性特点,多为动脉粥样硬化所致,也可以是脑梗死的前驱发作。

63.男婴,6 个月。足月顺产,人工喂养。查体:体重 5.4kg,身高 66cm,前囟未闭,未出牙,皮肤干燥,腹部皮下脂肪厚度 0.6cm,心、肺未见异常。最可能的诊断是

- | | |
|-------------|-------------|
| A.重度营养不良消瘦型 | B.中度营养不良 |
| C.轻度营养不良 | D.重度营养不良水肿型 |
| E.正常婴儿 | |

【答案】C

【解析】腹部皮下脂肪厚度是衡量儿童营养状况的常用指标。测量方法为在腹部脐旁乳头线上以拇指和食指相距 3 厘米处,将皮肤捏起,测量其上沿厚度。正常小儿多在 0.8 厘米以上,0.8cm~0.4cm 是轻度营养不良;小于 0.4cm 是中度;消失是重度。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1421——临床表现

64.女孩,5 岁。患急性感染治疗 1 周,临床表现恢复正常,门诊医生需根据外周血象的变化作分析,该患儿白细胞分类的正常比例应约为

- A.中性粒细胞 0.35、淋巴细胞 0.60 B.中性粒细胞 0.50、淋巴细胞 0.45
C.中性粒细胞 0.60、淋巴细胞 0.35 D.中性粒细胞 0.30、淋巴细胞 0.65
E.中性粒细胞 0.65、淋巴细胞 0.30

【答案】B

【解析】出生后 4~6 天和 4~6 岁时,淋巴细胞和中性粒细胞相等。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1507——血象特点

65.女,30 岁。因再生障碍性贫血 3 个月入院输血治疗。输注悬浮红细胞 30 分钟后出现寒战。既往有输血史。查体:T 39.5℃,BP 130/75mmHg。患者最可能出现的输血不良反应是

- A.输血相关循环超负荷 B.过敏反应
C.输血相关移植物抗宿主病 D.非溶血性发热性反应
E.急性溶血性输血反应

【答案】D

【解析】发热反应是最常见的早期输血并发症,多见于多次接受输血者和经产妇,因体内有白细胞和血小板的抗体,当再次输血时可与输入的白细胞或血小板发生抗原抗体反应,应给予洗涤红细胞。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1179——输血不良反应

66.初孕妇,24 岁,妊娠 39 周。腹痛 2 天,加剧 1 小时。查体:BP 130/90mmHg,心率 106 次/分。下腹拒按,阴道口可见胎儿上肢,胎心音消失,导尿呈淡红色。首选的处理措施是

- A.行毁胎术 B.内倒转后臀牵引
C.行抬头吸引术 D.立即剖宫产
E.行产钳助产术

【答案】D

【解析】先兆子宫破裂;阴道口可见胎儿上肢是肩先露;胎心消失胎儿已经死亡,所以选择剖宫产。

67.女,29 岁。外阴瘙痒伴分泌物增多 3 天。妇科检查:外阴及阴道黏膜充血,阴道内大量豆渣状分泌物。正确的处理是

- A.常规阴道冲洗 B.克林霉素治疗

C. 抗真菌治疗

D. 甲硝唑治疗

E. 雌激素治疗

【答案】C

【解析】题眼是“豆腐渣”，提示念珠菌感染，所以抗真菌治疗。甲硝唑用于细菌性阴道炎（胺臭味实验、线索细胞）、滴虫性阴道炎（泡沫样白带）；雌激素用于萎缩性阴道炎（脓血白带）。

命中考点：《2015 年临床执业（含助理）医师核心考点全攻略》P1079——处理

命中考题：《2015 年临床执业（助理）医师资格考试冲刺考题精析》P343 第 19 题

68. 女, 65 岁。不规则阴道流血 1 年余。有高血压, 糖尿病病史 3 年。BMI 28, B 超发现宫腔内 2.0cm×2.5cm 占位性病变, 有丰富血流。血流阻力指数为 0.36。如宫腔内膜活检确诊后, 首选的治疗措施是

A. 生物治疗

B. 手术治疗

C. 激素治疗

D. 化学药物治疗

E. 放射治疗

【答案】B

【解析】子宫内膜癌三联征: 肥胖 (BMI 正常小于 24)、高血压、糖尿病。并且根据年龄 (大于 55 岁首先考虑癌症)、症状及辅助检查考虑子宫内膜癌, 治疗上首先手术。

命中考点：《2015 年临床执业（含助理）医师核心考点全攻略》P1093——治疗

69. 男, 23 岁。3 个月前劳务输出首次出国, 出现紧张、心慌、易怒、失眠多梦, 不愿上班, 每天打电话向家人寻求安慰。回国 1 个月后症状自行缓解, 恢复如常。该患者最可能的诊断是

A. 社交焦虑障碍

B. 适应障碍

C. 急性应激障碍

D. 创伤后应激障碍

E. 广泛性焦虑障碍

【答案】B

【解析】适应障碍是指在明显的生活改变或环境变化时所产生的短期和轻度的烦恼状态和情绪失调, 常有一定程度的行为变化等, 但并不出现精神病性症状。

70. 女孩, 2 岁。发热、流涕、咳嗽 3 天, 皮疹 6 小时。查体: 精神萎靡, 前额及耳后有浅红色斑丘疹, 眼结膜充血, 口腔黏膜粗糙, 两肺呼吸音粗。最可能的诊断是

A. 麻疹

B. 幼儿急疹

C. 风疹

D. 川崎病

E. 咽结合膜热

【答案】A

【解析】麻疹特点: 有呼吸道卡他性炎症, 结膜炎, 发热第 2~3 天出现口腔黏膜斑, 出疹顺序: 耳后—发迹—颈部—额面—四肢, 最常见的并发症是肺炎。幼儿急疹热退疹出。风疹重点应与轻型麻疹相鉴别, 较少发生眼结膜炎, 有耳后的淋巴结肿大。川崎病的必备诊

断条件是发热 5 天以上,可以直接排除。咽结合膜热耳后不是红色丘疹而是淋巴结肿大。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1453——临床表现

命中考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P475 第 31 题

71.女孩,1 岁。无不适,未接种过卡介苗。与父母生活在一起,其父患活动性肺结核,并时有咯血。胸部 X 线片无明显异常。PPD 试验(+).宜采取的措施是

- A.隔离观察
- B.接种卡介苗
- C.继续观察,暂不处理
- D.预防性抗结核治疗
- E.痰培养

【答案】D

【解析】父亲活动性肺结核而且有咯血,应该预防性抗结核治疗。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1462——预防

72.初产妇,29 岁。胎儿娩出 30 分钟后出现阴道流血 200ml,用手在产妇耻骨联合上方轻压子宫下段时,外露脐带回缩。此时正确的处理措施是

- A.立即输血
- B.按压宫底,牵拉脐带
- C.等待胎盘剥离
- D.徒手剥离胎盘
- E.子宫体注射麦角新碱

【答案】D

【解析】用手在产妇耻骨联合上方轻压子宫下段时,外露的脐带回缩,说明胎盘没有剥离。A 不够输血指征;B、E 牵拉脐带和注射麦角新碱不可取;C 第三产程不超过 30 分钟,现在已经超过 30 分钟,所以不能等待。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1009——第三产程的临床经过及处理

73.男,36 岁。诊断抑郁症,服用帕罗西汀 40mg/d,治疗 6 个月,症状完全缓解 4 个月。2 天前患者自行停药,目前出现头晕、恶心、坐立不安、站立不稳。最可能的原因是

- A.恶性综合征
- B.原有焦虑症状复发
- C.原有抑郁症状复发
- D.5-HT 综合征
- E.帕罗西汀停药反应

【答案】E

74.男婴,3 天。黄疸迅速加重 2 天。足月儿,母乳喂养。实验室检查:血清总胆红素 $289\mu\text{mol/L}$ 。母血型为 O 型、Rh 阳性,父母血型为 AB 型、Rh 阳性。最可能的诊断是

- A.新生儿母乳性黄疸
- B.新生儿肝炎综合征
- C.新生儿败血症
- D.Rh 血型不合溶血病
- E.ABO 血型不合溶血病

【答案】E

【解析】ABO 血型不合溶血病见于母亲为 O 型,孩子为 A 型或者 B 型;题干给出父母

的血型所以可以判断出孩子的血型为 A 或 B 型。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1432——病因和发病机制

命中考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P466 第 30 题

75.初产妇,29 岁,妊娠 41 周,枕右前位,骨盆测量正常,宫口开全 1 小时,胎心 88 次/分,胎头 S+3,在吸氧同时,最恰当的处理措施是

- A.应用前列腺素加强宫缩
- B.等待自然分娩
- C.立即行剖宫产术
- D.产钳助产术
- E.静脉滴注缩宫素

【答案】D

【解析】正常胎心是 110~160 次/分,大于或者小于均表示胎儿缺氧,是胎儿立即娩出的条件。如果胎头没有到 S+3 立即剖宫产,如果胎头 S+3 可以阴道分娩,产钳助产。

76.女,25 岁。3 天前受惊吓突然不语不懂,不吃不喝,肢体僵硬,口中唾液外流,不知主动吐出,晚间自己到厨房找吃的。患者 2 年前曾凭空闻语、捡食垃圾等怪异行为,持续 1 个月好转。患者最可能的诊断是

- A.分离(转换)性障碍
- B.急性应激性障碍
- C.脑器质性精神障碍
- D.精神分裂症
- E.妄想性障碍

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1319——诊断

77.女,32 岁,停经 90 天,阴道不规则流血 6 天,下腹隐痛。妇科检查:宫底平脐,质软,未触及胎体,未闻及胎心。尿妊娠试验阳性。应首先考虑的诊断是

- A.羊水过多
- B.先兆流产
- C.死胎
- D.葡萄胎
- E.稽留流产

【答案】D

【解析】葡萄胎的典型表现是停经后阴道流血和子宫异常增大。患者停经 90 天,正常妊娠时宫底应在耻骨联合上 2~3 横指,即刚出骨盆。而此时患者宫底平脐,提示明显增大。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1102——临床表现

命中考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P350 第 9 题

78.初产妇,27 岁。妊娠 40 周,规律宫缩 12 小时,产科检查:胎头高浮,宫口开大 3cm,胎头枕骨靠近骶岬,胎心 140 次/分,最恰当的处理措施是

- A.静脉滴注地诺前列酮
- B.尽早行剖宫产术
- C.等待宫口开全产钳助娩
- D.静脉滴注缩宫素

E.等待经阴道分娩

【答案】B

【解析】一般初产妇在预产期前 1~2 周胎头已衔接,此时患者已规律宫缩 12 小时,仍胎头高浮,提示骨盆入口平面狭窄,应行剖宫产结束分娩。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1056——狭窄骨盆的分类、诊断、对母儿影响及处理

79.男婴,9 个月,发热 3 天,烦躁、流涎 1 天。查体:一般状态可,前囟平坦,咽部充血,咽峡及软腭部可见直径 2~3mm 的疱疹及溃疡,颈部无抵抗,心、肺听诊正常。其病原体最可能为

A.溶血性链球菌

B.腺病毒

C.柯萨奇病毒

D.副流感病毒

E.流感嗜血杆菌

【答案】C

【解析】根据题干不难诊断为疱疹性咽峡炎,疱疹性咽峡炎为柯萨奇病毒感染;咽结合膜热为腺病毒感染。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1478——临床表现

80.男,31 岁,持续性头痛 6 天,自觉后枕部紧箍样疼痛,无恶心、畏光和畏声。查体:T 36.5℃,BP 120/70mmHg,眼压无异常,张口颞颌关节无弹响,双颞肌和枕肌明显压痛,余神经系统检查未见异常。脑 MRI 无异常。最可能的诊断是

A.颈椎病

B.血管性头痛

C.紧张性头痛

D.无先兆偏头痛

E.颞颌关节紊乱

【答案】C

【解析】血管性头痛分原发性和继发性,原发性血管性头痛即偏头痛。偏头痛常影响日常生活,头痛呈搏动性,有恶心和畏光等,可用吲哚美辛治疗。紧张性头痛又称肌肉收缩性头痛,有紧缩感。故选 C。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1286——诊断及鉴别诊断

81.男,45 岁,3 天前突然出现发热、头痛、嗜睡,随后出现兴奋话多,语言零乱,说在墙壁上看到了妖怪,有人要害他等。患者所处的状态是

A.焦虑状态

B.幻觉状态

C.谵妄状态

D.昏迷状态

E.躁狂状态

【答案】C

【解析】躁狂表现为三高,情绪高涨、思维奔逸、活动增多,故排除 E。谵妄属于意识障

碍,是在意识清晰度减低的同时出现恐怖性的幻觉和错觉,符合题目中患者的临床表现。

82.女,30岁,工人。医生检查问:“你在想什么?”答:“详细讲就是细菌问题,细菌在我们脑子里有些冲击力,空气不大新鲜,也不奇怪,冻死苍蝇。”该患者的症状是

- A.思维云集
B.音联意联
C.强制性思维
D.思维插入
E.思维破裂

【答案】D

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1296——常见精神症状

83.女,35岁。因输卵管妊娠破裂出血1小时急诊入院。怀孕3次。自然流产2次,顺产1胎。术前查Hb 75g/L,术中输注悬浮红细胞5单位。术后第一天复查Hb 100g/L,术后第8天出现皮肤、巩膜黄染,发热,T 38.5℃。检查Hb 70g/L。该患者可能发生的输血不良反应是

- A.输血性肝炎
B.过敏反应
C.细菌污染反应
D.非溶血性发热反应
E.迟发性溶血反应

【答案】E

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1179——输血不良反应

84.女,45岁,性交后出血半年。妇科检查:宫颈I度糜烂状。宫颈细胞学检查结果为低度鳞状上皮内瘤变(LSIL),为明确诊断,下一步检查应首选的处理是

- A.宫颈冷刀锥切
B.宫颈电热圈切除术
C.阴道镜下活检
D.宫颈管搔刮
E.HPV-DNA检测

【答案】C

【解析】延迟性溶血反应多发生在输血后7~14天,表现为原因不明的发热、黄疸、贫血等,但一般症状不严重。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1088——诊断与鉴别诊断

85.初产妇,28岁。10天前在家中经阴道分娩,产后血性恶露持续时间长,无异味。突然出血增多1天,无寒战、高热。查体:子宫如妊娠3个月大,质软,压痛不明显,宫口松,能容2指,其阴道流血最可能的原因是

- A.子宫脱垂
B.子宫内膜炎
C.子宫颈裂伤
D.蜕膜残留
E.胎盘、胎膜残留

【答案】E

【解析】患者经阴道分娩10天后出现阴道流血,属于晚期产后出血,其最常见的原因是

胎盘、胎膜残留,导致残留组织发生机化并脱落,引起出血。此时子宫复旧不佳,子宫增大、变软、宫口松弛。正确的处理是刮宫,术后给予抗生素和子宫收缩剂。

86.男,28岁。双下肢进行性无力3天。现无法上楼,尿潴留。有冶游史,2周前感冒。查体:胸4平面以下深浅感觉消失,双下肢肌力2级。腱反射消失,Babinski征阳性。脑脊液细胞数0,蛋白100mg/L,糖和氯化物正常,RPR阴性。MRI示胸4~9脊髓略增粗,T₂加权像见条索状高信号。最可能的诊断是

- A.脊髓髓内肿瘤
- B.脊髓血管畸形
- C.压迫性脊髓病(颈椎骨质增生)
- D.急性脊髓炎
- E.脊髓痨

【答案】D

【解析】RPR阴性提示患者无梅毒感染。急性脊髓炎多由病毒感染引起,病变部位多位于胸髓,脑脊液改变较轻。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1256——临床表现

命中考题:《2015年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P400第6题

87.女,30岁,体重45kg,因外伤引起急性失血约600ml,手术治疗后出血停止。术后1天查体:P85次/分,BP95/60mmHg。化验Hb105g/L。患者要求输血。此时应采取的正确措施是

- A.输注新鲜冰冻血浆400ml
- B.无需输注血液或血液制品
- C.输注全血200ml
- D.输注普通冰冻血浆400ml
- E.输注人血白蛋白4g

【答案】B

【解析】Hb低于70g/L、失血量大于总血容量的20%(1000ml)应输入浓缩红细胞。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1178——输血适应证

88.女孩,2岁。腹泻伴呕吐3天,大便7~8次/日,为黄绿色稀水样便,黏液较多,时有发热、腹痛。粪常规示白细胞(++)。不宜采用的治疗是

- A.液体疗法
- B.锌制剂
- C.止泻剂
- D.肠道微生态制剂
- E.肠道黏膜保护剂

【答案】C

【解析】粪常规有白细胞提示感染,止泻会导致病菌积存在肠道加重中毒症状。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1474——治疗

89.女婴,8个月。发热、呕吐、腹泻、少尿2天。查体:哭无泪,眼窝,前囟明显凹陷,皮肤弹性差,呈花纹状、心音低钝,四肢末梢凉。实验室检查:粪常规未见红细胞、白细胞,可见脂肪滴。血清钠135mmol/L,患儿的脱水程度属于

- A.中度等渗性脱水
- B.中度高渗性脱水

- C. 重度低渗性脱水
 D. 重度等渗性脱水
 E. 中度低渗性脱水

【答案】D

【解析】无泪、皮肤花纹状和四肢末梢凉为重度(无泪、无尿是重度)。正常小儿血钠: 130~150mmol/L, 大于 150mmol/L 为高渗, 小于 130mmol/L 是低渗。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1474——治疗

90. 男, 40 岁, 车祸后出现短暂昏迷, 2 小时后剧烈头痛, 频繁呕吐。急诊查体: 神志清楚, 双侧瞳孔大小多变, 对光反射迟钝, 肢体活动正常。行头颅 CT 检查途中, 发生呼吸骤停, 最可能的原因是

- A. 脑挫裂伤
 B. 急性颅后窝血肿并发枕骨大孔疝
 C. 急性颅内血肿并发小脑幕切迹疝
 D. 脑干损伤
 E. 脑震荡

【答案】B

【解析】本题重点鉴别 B 和 C。枕骨大孔疝较小脑幕切迹疝, 生命体征紊乱出现早, 意识障碍出现晚, 且因脑干缺氧, 瞳孔大小多变。而小脑幕切迹疝的患者意识进行性恶化, 患侧瞳孔出现一过性缩小随即散大。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1282——临床表现

91. 男, 21 岁。近 6 个月来在家中闭门不出, 认为有人在拿自己做试验, 用射线照射自己, 有人监控自己, 使自己活不下去了, 只有躲在家中才安全。既往体健, 无精神病家族史。该患者主要症状为

- A. 关系妄想
 B. 夸大妄想
 C. 内心被揭露感
 D. 疑病妄想
 E. 被害妄想

【答案】E

【解析】本题重点鉴别 A 和 E。关系妄想是患者认为周围环境中所发生的与自己无关的事情均有自己有关, 但不一定是迫害自己的; 而被害妄想是患者坚信自己被某些组织或人进行迫害。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1296——常见精神症状

92. 男孩, 3 岁, 乏力 1 周。查体: 胸骨左缘第 3~4 肋间闻及 4/6 级吹风样收缩期杂音, 肺动脉瓣区第二心音亢进, 心尖部闻及短促舒张期杂音。胸部 X 线片: 双肺充血, 左、右心室均大, 以左心室为著, 肺动脉突出, 主动脉结偏小。最可能的诊断是

- A. 室间隔缺损合并动脉导管未闭
 B. 动脉导管未闭
 C. 室间隔缺损
 D. 房间隔缺损
 E. 房间隔缺损合并动脉导管未闭

【答案】C

【解析】动脉导管未闭不会出现主动脉结偏小,房间隔缺损会涉及心房的增大。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1493——室间隔缺损

命中考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P488 第 10 题

93.初孕妇,27 岁。妊娠 37 周。晚 10 时突然出现无痛性阴道较多量流血入院。查体:BP 110/70mmHg。子宫软,枕左前位,胎心 164 次/分。目前最恰当的处理措施是

- A.剖宫产
- B.器械助娩
- C.等待自然分娩
- D.缩宫素引产
- E.人工破膜引产

【答案】A

【解析】患者出现阴道较多量的流血,且妊娠 37 周胎儿已成熟,可行剖宫产。

94.男,69 岁。动作缓慢、走路前倾小步 2 年,伴手部震颤。查体:对答切题,面具脸,四肢肌力正常,肌张力增高。头颅 CT 未见异常。最可能的诊断是

- A.脊髓血管病
- B.亚急性性脊髓联合变性
- C.帕金森病
- D.进行性脊髓萎缩症
- E.脊髓空洞症

【答案】C

【解析】“面具脸”、“慌张步态——走路前倾小步”、肌张力增高等均提示帕金森病。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1283——临床表现

命中考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P406 第 6 题

95.男孩,8 岁,2 天前因“感冒”诱发咳喘,口服糖皮质激素无缓解。3 岁至 8 岁类似喘息发作 10 余次。曾查肺功能明显降低,支气管舒张试验阳性。查体:呼吸困难,大汗淋漓,不能平卧,面色青灰,三凹征,双肺呼吸音降低,无哮鸣音,心音较低钝。此时不适合的治疗是

- A.使用吸入型速效 β_2 受体激动剂
- B.必要时辅以机械通气
- C.使用吸入型糖皮质激素
- D.氧疗
- E.补液,纠正酸中毒

【答案】C

【解析】本题难度较大。支气管舒张试验阳性提示哮喘,但患者双肺呼吸音低且无哮鸣音是因为气道广泛堵塞,是哮喘最危险的体征,此时应全身应用糖皮质激素,不能以吸入治疗替代。详细内容可参看八版儿科学 P276。

96.男,20 岁,大学生。不食、不语伴行为异常 6 个月。曾在当地医院就诊。此次入院检查:神志清,仰卧,头颈悬空不动,无自发言语,面无表情,拒绝服从医生的简单指令,眼球活动自如。有事突然拍门或抢病友的东西。体格检查未见异常。能够最快缓解其症状的治疗措施是

- A.改良电抽搐治疗
- B.口服利培酮
- C.肌注氟哌啶醇
- D.肌注地西泮

E. 静脉滴注氯丙嗪

【答案】A

【解析】患者抑郁严重, 出现不食、不语、不动的表现, 符合抑制性木僵的表现, 此时应首选电抽搐或改良电抽搐的治疗。详见 7 版精神病学 P118。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1310——抑郁症的治疗

97. 女婴, 4 个月, 烦躁, 多汗半个月, 夜间哭闹不安。冬季出生, 足月顺产, 单纯牛奶喂养, 未添加辅食。查体: 体重 6kg, 有颅骨软化。最可能的诊断是

A. 维生素 A 缺乏病

B. 维生素 D 缺乏性佝偻病

C. 蛋白质—能量营养不良

D. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症

E. 缺铁性贫血

【答案】B

【解析】冬季出生日照不足影响内源性维生素 D 的生成, 单纯牛奶喂养导致食物中补充维生素 D 不足, 有神经兴奋性增高的表现, 均提示 B。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1417——诊断及鉴别诊断

98. 经产妇, 28 岁, 合并风湿性心脏病, 现妊娠 38 周, 心功能 I 级, 规律宫缩 7 小时来院。枕左前位, 胎心 152 次/分, 估计胎儿 3300g, 宫口开大 4cm, 胎头=0。本例正确的处理措施是

A. 适当使用镇静剂, 阴道助产

B. 避免用力屏气加腹压, 胎头吸引或产钳助产

C. 静滴缩宫素, 尽可能的缩短第一产程

D. 试产期间若出现心衰症状, 应立即行剖宫产

E. 不行阴道试产, 行剖宫产结束分娩

【参考答案】A

【解析】患者心功能 I 级、胎儿不大、胎位正常, 可考虑经阴道分娩。患者此时正值第一产程, 正确的处理措施是适当使用镇静剂, 密切注意血压、脉搏、呼吸、心率等。当患者进入第二产程时, 应避免用力屏气加腹压, 应行阴道助产(胎头吸引或产钳助产), 尽可能缩短第二产程。第三产程胎儿娩出后, 产妇腹部放置沙袋, 防止腹压骤降而诱发心力衰竭, 同时静滴缩宫素减少出血。试产期间若出现心衰症状, 应先处理心衰, 即半卧位, 高浓度吸氧等。

99. 初孕妇, 24 岁, 妊娠 38 周, 既往血压正常。5 天前突觉头痛且逐渐加重。BP166/112mmHg, 双下肢水肿(++)。24 小时尿蛋白 5g, 血细胞比容 0.42, 此时首选的处理是

A. 硫酸镁缓慢静脉注射

B. 呋塞米静脉注射

C. 硝普钠静脉滴注

D. 头颅 CT 检查

E. 立即行剖宫产术

【答案】A

【解析】患者出现持续加重的头痛、BP166/112mmHg、24 小时尿蛋白 5g, 符合重度子

痫前期的诊断,此时可给予硫酸镁静推,预防其发展为子痫。利尿剂可导致血液浓缩和高凝倾向,除有全身水肿等严重表现时一般不用,故不选 B。硝普钠的代谢物氰化物可通过胎盘屏障,一般不用。患者暂无产科指征,故不选 E。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1028——治疗

100.男婴,8 个月,面色苍白 2 个月。早产儿,鲜牛奶喂养,未添加辅食。查体:体重 8kg,心、肺检查未见异常,肝肋下 3cm,脾肋下 1.5cm。血常规:Hb 70g/L,RBC $3.0 \times 10^{12}/L$,MCV 65fl,WBC $11 \times 10^9/L$,Plt $250 \times 10^9/L$ 。最可能的诊断是

- A.溶血性贫血
- B.营养性巨幼细胞性贫血
- C.生理性贫血
- D.缺铁性贫血
- E.失血性贫血

【答案】D

【解析】鲜牛奶含铁量低,如未添加辅食易发生缺铁性贫血;患儿出现髓外造血引起的肝脾肿大;Hb $<110g/L$,MCV $<80fl$,MCHC <0.32 ,属于小细胞低色素性贫血;题干中 Hb、RBC 和 MCV 均低。故考虑缺铁性贫血。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1511——诊断

命中考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P496 第 18 题

(101~102 题共用题干)

女,18 岁,月经不规律 2 年,阴道大量流血 2 周,贫血貌。B 超示子宫及双侧附件未见异常,血 FSH、LH、T、PRL 水平正常。

101.该患者最可能的诊断是

- A.子宫内膜癌
- B.卵巢功能性肿瘤
- C.子宫内膜异位症
- D.功能性失调性子宫出血
- E.多囊卵巢综合征

【答案】D

【解析】18 岁女性,体检子宫及双侧附件未见异常,诊断功血。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1108——临床表现

102.经过治疗血止并撤退性出血后,首选的治疗是

- A.氯米芬促排卵治疗
- B.雌孕激素序贯疗法
- C.雌激素治疗
- D.孕激素治疗
- E.雄激素治疗

【答案】B

【解析】青春期及生育年龄无排卵功血以止血、调整周期、促排卵为主。雌孕激素序贯疗法即人工周期,适用于青春期功血。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1109——治疗

(103~104 题共用题干)

女,26岁,人工流产后1周,发热5天,下腹痛3天。查体:39.2℃,P 105次/分,BP 105/70mmHg。妇科检查:宫颈口脓性分泌物,宫颈举痛(+),子宫正常大小,压痛明显,双附件稍增厚,压痛(+),右侧为重。血 WBC $14 \times 10^9/L$,N 0.90。

103.该患者最可能的诊断是

- | | |
|---------|----------|
| A.急性膀胱炎 | B.急性盆腔炎 |
| C.急性阑尾炎 | D.异位妊娠破裂 |
| E.流产不全 | |

【答案】B

【解析】人工流产后出现高热、腹痛,血象偏高,考虑感染,所以选急性盆腔炎。急性膀胱炎有尿频尿急尿痛,阑尾炎表现为转移性腹痛,异位妊娠破裂表现为腹痛、出血、血压下降,流产不全表现为阴道流血。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1082——临床表现

104.对治疗最有价值的辅助检查项目是

- | | |
|---------|---------|
| A.尿妊娠试验 | B.病原体检查 |
| C.血常规 | D.盆腔B超 |
| E.尿常规 | |

【答案】B

【解析】在做出盆腔炎性疾病的诊断后,需进一步明确病原体,以指导使用敏感抗生素。宫颈管分泌物及后穹窿穿刺液的涂片、培养及核酸扩增检测病原体均对明确病原体有帮助。

(105~107 题共用题干)

女,67岁,车祸后即昏迷,伤后2小时被送至医院。查体:昏迷状态,左顶枕部有一直径4cm头皮血肿,右侧瞳孔散大,对光反射消失,左侧肢体肌张力增高,病理反射阳性。头颅CT示右额颞部骨板下新月形高密度影。

105.该患者最可能的诊断是

- | | |
|------------------|------------------|
| A.右额颞急性硬膜下积液,脑疝 | B.右额颞急性硬脑膜外血肿,脑疝 |
| C.右额颞脑挫伤,脑疝 | D.右额颞脑内血肿,脑疝 |
| E.右额颞急性硬脑膜下血肿,脑疝 | |

【答案】E

【解析】题眼“新月形”提示硬膜下出血。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1264——影像学表现

106.该患者颅内出血最可能来自于

- | | |
|----------|----------|
| A.脑表面小血管 | B.硬脑膜中动脉 |
| C.大脑中动脉 | D.蛛网膜颗粒 |
| E.矢状窦 | |

【答案】A

107.需要立即采取的治疗措施是

- A.气管切开
- B.冬眠疗法
- C.颅内血肿清除
- D.清除治疗
- E.止血,抗感染

【答案】C

(108~110 题共用题干)

经产妇,31岁,现妊娠35周。查体:BP 120/80mmHg,宫底35cm,胎心136次/分,空腹血糖6.2mmol/L,尿糖(+)。2年前因妊娠8个月死胎行引产术。

108.对该患者最有意义的辅助检查是

- A.葡萄糖耐量试验
- B.血常规
- C.尿常规
- D.尿雌三醇
- E.血生化检查

【答案】A

【解析】产妇妊娠晚期空腹血糖大于5.1mmol/L,尿糖(+),考虑妊娠期糖尿病,应行糖耐量试验。

109.经控制饮食2周后,空腹血糖6.1mmol/L,胎心136次/分,无应激试验无反应型。此时最恰当的措施是

- A.左侧卧位
- B.间断吸氧
- C.自测胎动计数
- D.立即终止妊娠
- E.胎儿生物物理评分

【答案】D

【解析】妊娠已满37周,无应激试验无反应型,胎儿宫内储备能力下降,及时终止妊娠。

110.对该产妇分娩的新生儿,不必要的处理是

- A.检测血糖值
- B.按早产儿处理
- C.检测血糖钙
- D.定时滴服葡萄糖液
- E.加压吸氧

【答案】B

【解析】妊娠合并糖尿病的新生儿出生时应留脐带血,进行血糖、胰岛素、胆红素、血细胞比容、血红蛋白、钙、磷、镁的测定。无论出生时状况如何,均应视为高危新生儿,尤其要给予监护,注意保暖和吸氧,重点防止新生儿低血糖,应在开奶同时,定期滴服葡萄糖液。

(111~113 题共用题干)

女,50岁,入睡困难,多梦易醒1个月,每周至少3次。同时感到精力疲乏,工作效率下降,对睡眠产生恐惧感,担心免疫力下降,否认情绪低落和消极观念。

111.该患者最可能的诊断是

- A.精神症
- B.神经衰弱
- C.焦虑症
- D.恐惧症
- E.失眠症

【答案】E**命中考点:**《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1322——诊断

112.对该患者应选择的治疗药物是

- | | |
|--------|--------|
| A.苯巴比妥 | B.艾司唑仑 |
| C.氟西汀 | D.奥氮平 |
| E.喹硫平 | |

【答案】B

113.该患者使用药物治疗的原则是

- | | |
|-----------|-----------|
| A.大剂量冲击疗法 | B.小剂量按需服用 |
| C.足剂量短疗程 | D.小剂量长疗程 |
| E.足剂量按需服用 | |

【答案】B

(114~116 题共用题干)

女,65岁,腹胀伴食欲不振半年余。查体:腹部膨隆,移动性浊音(+).妇科检查:宫颈光滑,盆底可触及多个质硬结节。左侧附件区可触及包块,约6cm×5cm大小,呈囊实性,界限不清。

114.下列对该患者鉴别诊断价值最小的辅助检查是

- | | |
|-----------|------------|
| A.宫腔镜检查 | B.腹水查癌细胞 |
| C.消化道内镜检查 | D.血肿瘤标志物检测 |
| E.B超检查 | |

【答案】C**命中考点:**《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1096——诊断与鉴别诊断

115.若检查结果示 CA125 1260U/ml,最可能的检查是

- | | |
|-----------|-----------|
| A.生殖器结核 | B.子宫内膜异位症 |
| C.卵巢上皮性癌 | D.卵巢库肯勃瘤 |
| E.乙状结肠癌转移 | |

【答案】C**【解析】**大部分卵巢上皮性肿瘤患者 CA125 升高。**命中考点:**《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1096——诊断与鉴别诊断

116.该患者手术后首选的治疗是

- | | |
|---------|----------|
| A.生物治疗 | B.内分泌治疗 |
| C.抗结核治疗 | D.化学药物治疗 |
| E.放射治疗 | |

【答案】D

【解析】卵巢上皮性癌对化疗较敏感,即使已有广泛转移也能取得一定疗效。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1097——治疗

(117~119 题共用题干)

男孩,3 岁,发热伴咳嗽 3 天,加重伴呼吸困难 1 天,自服抗生素治疗。查体:T 39℃,嗜睡,精神反应差,躯干可见散在脓疱疹,呼吸急促,双肺可促闻及散在中、小水泡音。实验室检查:血 WBC $18 \times 10^9/L$,N 0.85,L 0.12。

117.该患儿最可能的诊断是

- | | |
|-------------|-------------|
| A.肺炎支原体肺炎 | B.肺炎衣原体肺炎 |
| C.呼吸道合胞病毒肺炎 | D.金黄色葡萄球菌肺炎 |
| E.腺病毒肺炎 | |

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1486——葡萄球菌肺炎

118.患儿今起病情突然加重,出现高热及呼吸困难加重。查体:T 39.5℃,R 40 次/分,烦躁不安,鼻煽,出现三凹征,面色苍白,唇周发绀,心率 140 次/分,心音有力,律齐,无奔马律,右肺呼吸音减低,肝、脾无肿大。最可能的并发症是

- | | |
|----------|----------|
| A.化脓性脑膜炎 | B.脓胸或脓气胸 |
| C.中毒性脑病 | D.急性心力衰竭 |
| E.中毒性心肌炎 | |

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1486——葡萄球菌肺炎

119.进一步有效的治疗措施是

- 换用其他的抗生素+肾上腺皮质激素
- 换用其他抗生素+胸腔闭式引流
- 换用其他抗生素+胸腔内注射抗生素
- 换用其他抗生素
- 胸腔内注射抗生素

【答案】B

(120~123 题共用题干)

男孩,5 岁,水肿伴尿少 3 天。病前 2 天有“上感”史。查体:BP 90/60mmHg,眼睑及颜面水肿,双下肢凹陷性水肿。实验室检查:血浆白蛋白 22g/L,胆固醇 7.2mmol/L,肾功能正常,血 C 31.25g/L,PPD 试验(-)。尿常规:RBC 10/HP,蛋白(++++)。

120.该患儿最可能的诊断为

- | | |
|---------------|---------------|
| A.IgA 肾病 | B.慢性肾小球肾炎急性发作 |
| C.原发性单纯型肾病综合征 | D.急性链球菌感染性肾炎 |

E.病毒性肾炎

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1505——诊断

121.首选的治疗药物是

A.泼尼松

B.青霉素

C.环孢素 A

D.甲泼尼龙

E.雷公藤多苷

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1505——治疗

122.若在住院期间,患儿经限盐并给予大剂量呋塞米治疗后,尿量明显增加,水肿消退,但随后出现精神萎靡、头晕、乏力,恶心、呕吐、尿量明显减少。查体:BP 66/45mmHg,四肢凉,最可能发生的并发症是

A.低血容量休克

B.急性肾衰竭

C.肾上腺皮质能不全

D.电解质紊乱

E.高血压脑病

【答案】A

123.若患儿经治疗,尿蛋白转阴 9 个月,已停药。2 周前出现发热、咳嗽,随后出现尿蛋白(+++)、水肿,现已无感染表现,以下治疗措施中错误的是

A.使用免疫调节剂

B.抗凝利尿治疗,不必限盐

C.加用免疫抑制剂治疗

D.本次治疗可不必使用抗生素

E.按初次方案重新开始治疗

【答案】B

【解析】肾病综合征合并显著水肿和高血压时应短期限制水和钠的摄入,病情缓解后不必继续限盐。此次患儿复发并伴水肿,应限盐。

(124~126 题共用题干)

女,36 岁。春节乘长途汽车回家途中,突然感到心前区发闷、呼吸困难、出汗,觉得自己就要不行了,不能自控,要发疯,为此感到紧张、害怕,立即被动到医院急诊,未经特殊处理,半小时后症状消失,体格检查正常。

124.该患者最可能的诊断是

A.支气管哮喘

B.心绞痛

C.惊恐发作

D.分离(转换)性障碍

E.嗜铬细胞瘤

【答案】C

125.该患者首先需要做的辅助检查是

A.头颅 CT

B.ECG

C.超声心动图

D.EEG

E.胸部 X 线检查

【答案】B

126.该患者长期治疗应首选的药物是

- A.帕罗西汀
B.氨茶碱
C.普萘洛尔
D.苯乙肼
E.地西泮

【答案】A

(127~129 题共用题干)

男孩,1 岁。发热 8 天,皮疹 3 天入院。外院抗生素治疗 7 天无效。查体:T 39℃,烦躁不安,全身淡红色斑丘疹,双眼结膜充血,口唇鲜红、干裂,草莓舌,右颈淋巴结蚕豆大、质硬,有压痛。双肺呼吸音粗,心率 130 次/分,腹软,肝脾无肿大,指、趾端硬性肿胀。实验室检查:血 WBC $19 \times 10^9/L$,N 0.78,L 0.22,Plt $420 \times 10^9/L$,血沉 120mm/h,血培养(-)。

127.该患者最可能的诊断是

- A.幼儿急疹
B.猩红热
C.咽结合膜热
D.川崎病
E.麻疹

【答案】D

【解析】川崎病的诊断标准是发热 5 天以上,伴下列 5 项临床表现中 4 项者,排除其他疾病后,即可诊断为川崎病:①四肢变化:急性期掌跖红斑,手足硬性水肿;恢复期指(趾)端膜状蜕皮。②多形性红斑。③眼结合膜充血,非化脓性。④唇充血皲裂,口腔黏膜弥漫充血,舌乳头突起、充血,呈草莓舌。⑤颈部淋巴结肿大,无化脓。如 5 项临床表现中不足 4 项,但超声心动图有冠状动脉损害,亦可确诊为川崎病。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1451——诊断标准

128.首选的治疗措施是

- A.丙种球蛋白+糖皮质激素
B.对症治疗,观察
C.丙种球蛋白+阿司匹林
D.阿司匹林+糖皮质激素
E.青霉素

【答案】C

129.对预后有重要意义的随访检查项目是

- A.ASO,ESR
B.血常规
C.心脏彩超
D.心电图
E.尿常规

【答案】C

(130~132 题共用题干)

男孩,1 岁,发热伴咳嗽、气促 7 天。自出生后喂养困难,生长发育落后,多次患肺炎,查体:T 38℃,P 120 次/分,R 50 次/分,消瘦,呼吸急促,双肺可闻及细湿啰音,胸骨左缘上方闻及粗糙响亮的收缩期杂音。腹软,肝肋下 3cm,质中,脾肋下未触及,手指甲床可见毛细血管搏动。

130. 该患儿最可能罹患的心脏病是

- A. 动脉导管未闭
 B. 房间隔缺损
 C. 法洛三联症
 D. 肺动脉瓣狭窄
 E. 室间隔缺损

【参考答案】A

【解析】“手指甲床可见毛细血管搏动”提示脉压大，主要见于主闭、甲亢、动脉导管未闭，B、C、D、E 均不出现周围血管征。但动脉导管未闭的典型体征是胸骨左缘上方有一连续的占整个收缩期和舒张期的杂音，题干只提到了收缩期杂音，故本题只给出参考答案。

命中考点：《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1492——房间隔缺损

131. 该患儿手指甲床毛细血管搏动是由于

- A. 动脉收缩压降低
 B. 动脉舒张压升高
 C. 动脉收缩压升高
 D. 动脉舒张压降低
 E. 肺动脉向主动脉分流

【答案】D

132. 该患儿目前最易发生的并发症是

- A. 血栓形成
 B. 生长落后
 C. 充血性心力衰竭
 D. 营养不良
 E. 肺动脉瘤样扩张

【答案】C

(133~135 题共用题干)

女，30 岁。已婚。平时月经规律。停经 40 天，右下腹剧痛 4 小时伴头晕及肛门坠胀感。查体：BP 80/56mmHg，面色苍白，痛苦貌。下腹部压痛及反跳痛(+)，尤以右侧为著，肌紧张不明显，移动性浊音(+)。妇科检查：宫颈举痛，宫体稍大，右附件区触及不规则包块，大小约 4cm×3cm×3cm，压痛(+)。血红蛋白 100g/L。

133. 该患者最可能的诊断是

- A. 卵巢滤泡囊肿破裂
 B. 卵巢黄体囊肿破裂
 C. 卵巢囊肿蒂扭转
 D. 输卵管妊娠破裂
 E. 卵巢子宫内膜异位囊肿破裂

【答案】D

命中考点：《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1025——临床表现

命中考题：《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P332 第 45 题

134. 该患者最简单可靠的辅助检查是

- A. 腹部 X 线检查
 B. 宫腔镜检查
 C. 腹部 CT 检查
 D. 腹腔镜检查
 E. 阴道后穹窿穿刺

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1026——诊断

135.该患者正确的处理措施是

- A.手术治疗
- B.中药活血化瘀
- C.局部注射甲氨蝶呤
- D.对症处理,严密观察
- E.肌肉注射甲氨蝶呤

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1026——治疗

(136~137 题共用备选答案)

- A.生物治疗
- B.手术治疗
- C.放射治疗
- D.化学药物治疗
- E.中药治疗

136.绒毛膜癌首选的治疗方法是

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1105——治疗及随访

137.卵巢无性细胞瘤首选的治疗方法是

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1097——治疗

(138~139 题共用备选答案)

- A.2 个月
- B.3 个月
- C.8 个月
- D.1 个月
- E.生后 2~3 天

138.麻疹疫苗初种年龄是

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1410——预防接种实施程序

139.百白破疫苗初种年龄是

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1410——预防接种实施程序

命中考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P457 第 8 题

(140~141 题共用备选答案)

- A.急性肺炎
 C.急性肝炎
 E.急性肾炎
- B.急性脑炎
 D.急性喉炎

140.小儿麻疹最常见的并发症是

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1454——并发症

141.猩红热的并发症是

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1457——并发症

(142~143 题共用备选答案)

- A.宫缩时胎头受压
 C.宫缩时脐带受压,兴奋迷走神经
 E.胎儿状况良好
- B.胎儿受镇静药物影响
 D.胎儿缺氧

142.胎心减速出现在宫缩高峰后,下降慢,持续时间长,恢复慢,临床提示的情况是

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P999——胎儿宫内状况的监护

143.胎心率减速与宫缩无固定关系,下降迅速且下降幅度大,恢复也迅速,临床提示的情况是

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P999——胎儿宫内状况的监护

(144~145 题共用备选答案)

- A.血 TSH 测定
 C.尿三氯化铁试验
 E.血浆氨基酸分析
- B.染色体核型分析
 D.尿蝶呤分析

144.儿童苯丙酮尿症的初筛选用的检查是

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1444——诊断及鉴别诊断

145.儿童苯丙酮尿症的确诊检查是

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1444——诊断及鉴别诊断

(146~147 题共用备选答案)

- | | |
|---------|---------|
| A.口服避孕药 | B.阴茎套 |
| C.宫内节育器 | D.安全期避孕 |
| E.体外排精 | |

146.女,35 岁。月经规律,经量多。妇科检查:宫颈呈糜烂状,宫颈口松,子宫前位,正常大小。首选的避孕方式是

【答案】A

【解析】宫颈糜烂不宜使用阴茎套;宫颈口松、子宫脱垂是宫内节育器的禁忌症;安全期避孕不安全,失败率高;体外排精易造成部分精液遗留在阴道内,导致避孕失败。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1131——屏障避孕

命中考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P360 第 23 题

147.女,29 岁。3 个月前剖宫产分娩,现行母乳喂养。首选的避孕方式是

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1131——屏障避孕

命中考题:《2015 年临床执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P358 第 4 题

(148~150 题共用备选答案)

- | | |
|--------|---------|
| A.托吡酯 | B.卡马西平 |
| C.乙琥胺 | D.左乙拉西坦 |
| E.氯硝西洋 | |

148.治疗原发性三叉神经痛首选的药物是

【答案】B

149.预防慢性偏头痛的药物是

【答案】A

150.治疗典型失神发作的首选药物是

【答案】C