

2019 年乡村全科执业助理医师笔试真题汇总（一）

妊娠早期超声检查的目的不包括

- A.确定宫内妊娠
- B.估计孕龄及胎数
- C.排除异位妊娠
- D.筛查胎儿畸形
- E.排除盆腔肿块

答案：D。解析：早期妊娠超声检查目的①确定宫内妊娠；②判断多胎妊娠的绒毛膜性；③估计孕龄；④排除异位妊娠、滋养细胞疾病、盆腔肿块或子宫异常。停经 9~14 周，可发现无脑儿等严重胎儿畸形。在妊娠 18~24 周，可采用超声进行胎儿系统检查，筛查胎儿结构畸形。

婴幼儿健康管理中进行 3 次血常规检查的月龄分别为

- A.4~6、10、22
- B.4~6、12、24
- C.6~8、15、30
- D.6~8、18、30
- E.8~10、18、36

答案：D

在居民健康档案中的生活方式栏中，不属于体育锻炼的是

- A.长跑
- B.跳广场舞
- C.做家务
- D.打太极拳
- E.游泳

答案：C

全科医疗“连续性服务”体现在

- A.全科医生对社区中所有人的生老病死负有全部责任
- B.全科医生在患者生病的过程中均陪伴在患者床边
- C.对患者的所有健康问题都要由全科医生亲手处理
- D.对人生各阶段及从健康到疾病都负有健康管理责任
- E.如果全科医生调动工作，就必须将自己的患者带走

答案：D

妊娠期安全性分级属于X级(禁忌)的药物是

- A.青霉素
- B.利巴韦林
- C.阿米卡星
- D.阿莫西林
- E.头孢呋辛

答案：B（X级：在动物或人的研究表明它可使胎儿异常。或根据经验认为在人或在人及动物是有危害性的。在孕妇应用这类药物显然是无益的。本类药物禁用于妊娠或将妊娠的患者。如利巴韦林、辛伐他汀、艾司唑仑口服给药。）

传染病监测内容不包括

- A.病原体型别
- B.媒介昆虫种类
- C.动物宿主分布
- D.疫源地消毒
- E.人口资料

答案：D（传染病监测的内容主要有：①疾病的发生和诊断；②病例三间分布的动态变化情况；③病原体型别、毒力、耐药性变异情况；④人群免疫水平的测定；⑤动物宿主和媒介昆虫种群分布及病原体携带状况；⑥防治措施效果的评价等。）

属于院内感染的情形是

- A.出院后获得的感染
- B.门诊患者在医院获得的感染
- C.入院前已经开始的感染
- D.住院患者在医院内获得的感染
- E.入院时已处于感染的潜伏期

答案：D

8. 给新生儿开具的处方上“基本信息”分应该填写的是

- A . 日龄
- B . 周龄
- C . 月龄
- D . 年龄
- E . 根据需要灵活确定

答案：A

引起化学性食物中毒的常见物质是

- A.苦杏仁
- B.亚硝酸盐
- C.有毒蘑菇
- D.发芽马铃薯
- E.鱼胆

答案：B

10 . 医师不应将患者的姓名、家庭地址等信息泄露给无关的人。该要求体现的医学原理基本原则是

- A.有利原则
- B.尊重原则
- C.不伤害原则
- D.公正原则
- E.公益原则

答案：B（尊重原则包括尊重患者的自主权利。知情同意、知情选择、要求保守秘密、隐私

等均是患者自主性的体现。)

11 . 不属于心理健康判断标准的是

- A . 智力正常
- B . 情绪良好
- C . 人际和谐
- D . 家庭美满
- E . 人格完整

答案： D

12 . 在偏僻乡村中 , 有些村民患病后会根据祖辈传下来的经验去采集一些草药服用。从“医学模式”的角度 , 这种医疗行为属于

- A . 神灵主义医学模式
- B . 自然哲学医学模式
- C . 机械论医学模式
- D . 生物医学模式
- E . 生物-心理-社会医学模式

答案： B

解析：心理健康判断标准：①智力正常；②情绪良好；③人际和谐；④适应环境；⑤人格完整。

13.根据国家基本公共卫生服务规范要求，老年人健康管理的服务对象是

- A.55 岁以上常住居民

B.60 岁以上常住居民

C.65 岁以上常住居民

D.70 岁以上常住居民

E.75 岁以上常住居民

【答案】 C

【解析】 老年人健康管理服务对象：辖区内 65 岁及以上常住居民，包括居住半年以上的户籍及非户籍居民。

1 4 . 《中国公民健康素养基本知识与技能》（2015 版）列出的公众应该知晓和掌握的基本健康知识与技能共有

A.55 条

B.66 条

C.88 条

D.99 条

E.100 条

答案： B

正常婴儿接种疫苗后发热低于 37.5℃且无其他全身症状时的处置原则不包括

A.医院诊治

B.加强观察

C.适当休息

D.多饮水

E.防止继发其他感染

答案：A

基本公共卫生服务的重点人群不包括

A.0-6 岁儿童

B.孕产妇

C.2 型糖尿病患者

D.肺结核患者

E.脑卒中患者

答案：E

乡村医生对高血压患者随访，不紧急转诊到上级机构的情况是

A . 收缩压 190mmHg

B . 舒张压 105mmHg

C . 视物模糊

D . 恶心呕吐

E . 胸闷

答案：B

18.计算某乡某年严重精神患者规范管理率时，必须采用的数据是

A.该乡 15 岁以上精神障碍患者总人数

B.该乡所有确诊精神障碍患者总人数

C.该乡坚持服药的严重精神障碍患者总人数

D.该乡当年按照规范要求进行管理的确诊严重精神障碍患者总人数

E.该乡当年病情稳定的确诊严重精神障碍患者总人数

【答案】D

健康的决定因素中属于行为和生活方式因素的是

A.居住环境

B.教育水平

C.人际关系

D.生长发育

E.合理膳食

答案：E

家庭医生提供的签约服务中，属于基本医疗的是

A.慢性病长处方

B.常见病和多发病的诊治

C.优先预约就诊

D.简历电子监控档案

E.提供就诊绿色通道

答案：B（签约服务内容：①基本医疗服务：常见病、多发病的中西医诊治、合理用药，慢性病精细化管理，就医路径指导和转诊预约等；②公共卫生服务：涵盖国家基本公共卫生服务项目和规定的其他公共卫生服务（根据服务能力和需求提供）；③健康管理服务：可包括健康评估与指导、康复指导、家庭病床与家庭护理、中医药治未病、高危人群的疾病筛查、全生命周期健康管理、远程健康监测等个性化服务内容。）

21. 孕晚期孕妇在没有并发症的情况下，适当进行散步运动的目的不包括

- A.促进血液循环
- B.减轻体重
- C.促进肌肉运动
- D.减少腹胀
- E.减轻水肿（缺失补充）

答案：B

22.土壤卫生防护措施不正确的是

- A.工业废渣处理
- B.污水处理
- C.垃圾无害化处理
- D.粪便无害化处理
- E.大量施用化肥

【答案】E

【解析】土壤卫生防护：主要为工业废渣、污水处理，粪便和垃圾无害化处理，合理施用农药化肥等。

23.在出生至18个月儿童健康教育中，不属于重点内容的是

- A.先天缺陷筛查
- B.语言障碍防治
- C.预防接种
- D.母乳喂养

E.辅食添加

【答案】 B

24.切断消化道传染病传播途径的有效措施是

A.通风

B.消毒

C.灭蚊

D.戴口罩

E.应急接种

【答案】 B

25.在农村地区，开展肺结核患者健康管理服务的人员是

A.乡村医生

B.专科医生

C.疾控人员

D.患者家属

E.村委会主任

【答案】 A

26.在社区卫生服务中开展个案调查，最适宜的流行病学方法是

A.设立对照组的描述性研究

B.设立对照组的分析性研究

C.理论性研究

D.不设立对照组的描述性研究

E.不设立对照组的分析性研究

【答案】 A

急性结膜炎最常见的体征是

- A.结膜充血
- B.乳头增生
- C.滤泡形成
- D.结膜瘢痕
- E.耳前淋巴结肿大

答案：A

不属于复发性口腔溃疡典型临床特征的是

- A.病损面覆盖黄色假膜
- B.周边有充血红晕带
- C.病损黑色素沉着
- D.中央凹陷
- E.灼痛明显

答案：C

表现为慢性咳嗽、大量脓痰和反复咯血的最常见的疾病是

- A.肺结核
- B.肺癌
- C.支气管扩张症

D.支气管哮喘

E.慢性支气管炎

答案：C

全科医疗中以问题为导向医疗记录的 SOAP 式问题描述中，P 是指

A.健康问题的处理计划

B.对健康问题的评估

C.药物治疗方案

D.客观资料

E.主观资料

答案：A

服用后可能出现顽固性干咳的降压药物是

A.氢氯噻嗪

B.美托洛尔

C.硝苯地平

D.卡托普利

E.可乐定

答案：D

女，36岁。3天前不慎扭伤左膝，负重行走时内侧疼痛，现左膝疼痛、肿胀，活动受限。

查体：左膝内侧压痛，浮髌试验(+)。对明确诊断最有价值的检查是

A.X 线片

B.血沉

C.CT

D.MRI

E.骨扫描

答案：D

女，42 岁。心悸、气短 10 余年，??前突然咯血，量约 150ml，混有泡沫。既往有关节肿痛病史。查体：口唇稍发绀，心率 96 次/分，二尖瓣听诊区可闻及收缩期隆隆样杂音，肝脾肋下未触及。心电图示 P 波呈双峰状。最可能的诊断是

A.支气管扩张症

B.阻塞性肺气肿

C.肺结核

D.肺源性心脏病

E.风湿性心脏病

答案：E

女，54 岁。精神分裂症者。精神科医师开具处方为利培酮 3mg/日。患者否认自己有病，近 1 周自行减药，只服用 1mg/日，病情未出现波动。随访时乡村医生最合适的处理措施是

A.增加随访频次

B.进行心理治疗

C.允许患者继续 1mg/日服药

D.要求患者按照 3mg/日服药

E.转诊至精神卫生专业机构

答案：D

女，68岁。纳入2型糖尿病患者健康管理3年。3个月前查血压140/87mmHg，空腹血糖6.0mmol/L，餐后2小时血糖10.2mmol/L。今日随访：血压145/90mmHg，空腹血糖7.7mmol/L，餐后2小时血糖13.7mmol/L，未发现其他并发症。医师对该患者进行分类管理正确的是

A.血糖控制不满意，按期随访

B.血糖控制不满意，建议转诊

C.血糖控制不满意，调整药物，2周内随访

D.血压控制不满意，建议转诊

E.血压控制不满意，调整药物，2周内随访

答案：C

某边远山村，村民以老年人和孩子为主，文化水平较低，手机网络信号覆盖不好，多数家中没有影碟机。在该村开展健康教育，宜采取的形式是

A.发放健康教育读本

B.发放健康教育视频

C.发放健康教育折页

D.通过微信公众号推送信息

E.举办咨询和讲座

答案：E

女，14岁。咽痛伴发热2天，吞咽时加重。查体：咽部充血，腭弓水肿，双侧扁桃体Ⅱ度肿大，表面可见脓苔附着，附着物可用压舌板去除。应首选的治疗药物是

- A.青霉素
- B.红霉素
- C.庆大霉素
- D.克林霉素
- E.万古霉素

答案：A

女，35岁。因功能性便秘排便困难2年。今日排便后则纸上有少量鲜血。近2年为降体重节食。对该患者最合理的建议是

- A.间断服用番泻叶
- B.行急诊肠镜检查
- C.持续口服中药泻剂
- D.调整饮食和排便习惯
- E.定期检查粪便常规及隐血

答案：E

女，28岁。反复发作性眩晕3年，伴耳鸣、听力下降，严重时伴恶心、呕吐、出汗。发作无明显诱因，无其他慢性病及药物中毒史。查体：双眼球水平性震颤(+)。最可能的诊断是

- A.迷路炎
- B.梅尼埃病
- C.脑血管病
- D.前庭神经元炎
- E.良性阵发性位置性眩晕

答案：B

某患者因胃癌准备接受手术治疗。术前医师履行了说明义务，并取得患者书面同意。根据《侵权责任法》的规定，医师说明事项不包括的是

- A.病情
- B.医疗措施
- C.医疗风险
- D.医疗诉讼程序
- E.替代医疗方案

答案：D

某医疗机构收治了数名肺炭疽患者，并按照突发公共卫生事件上报。接报单位迅速展开调查，并经专家综合评估后建议启动突发事件应急预案。该接报单位是

- A.乡镇政府
- B.卫生行政主管部门
- C.疾病预防控制机构
- D.卫生监督机构

E.应急管理部门

答案：B

男童,6岁。因发热、咽喉肿痛伴喷嚏、流涕、轻度头晕半天到村卫生室就诊。查体:T38.7°C,乡村医生诊断为急性上呼吸道感染,给予抗病毒口服液、布洛芬口服,并嘱物理降温,但家属执意要求静脉输液。此时,该医生符合伦理要求的做法是

- A.满足家属要求,改为静脉输液
- B.拒绝家属要求,让其找别的医生诊治
- C.在患儿口服药物的同时给予静脉输液
- D.坚持原治疗方案并向家属耐心解释不建议其静脉输液的理由
- E.开具静脉输液药物并请其家属自行寻找其他医生进行静脉输液

答案：D

某乡村医生,具有执业资格,在本村从事诊疗工作。除为村民提供基本医疗服务外,还用纯中药疗法治疗精神病患者。当地卫生行政主管部门要求其停止收治精神病患者。限制该医生部分医疗行为所依据的伦理规范是

- A.尽职尽责为患者服务
- B.遵守技术规范
- C.遵守法律、法规
- D.遵守职业道德
- E.树立敬业精神

答案：C

女，35岁。在3天前的山体滑坡中失去了丈夫与孩子，痛不欲生。参与应急处理的心理治疗师判断该女性的情绪状态属于应激反应。导致其反应的主要应激源所属类型为

- A.职业性应激源
- B.心理性应激源
- C.文化性应激源
- D.社会性应激源
- E.生理性应激源

答案：D

小强所在学校有游泳课，但他从小怕水，无论如何不敢下水。学校心理老师建议给小强套上救生圈，让他闭上眼并捏住鼻子数1、2、3，然后由老师抱着小强一起跳入水中。从心理治疗的角度，该方法属于

- A.冲击疗法
- B.系统脱敏法
- C.厌恶疗法
- D.放松训练
- E.生物反馈

答案：A

男，58岁。因最近经常头痛、头晕就诊。某医师开具处方药物后建议患者去上级医院进一步诊治。可患者拒绝服药，对医师的建议不以为然。导致医患交往障碍的最主要原因是

- A.患者信息缺乏
- B.医师沟通方式有误
- C.患者记不住医嘱
- D.医师同情心不够
- E.患者依从性差

答案：E

某乡中心小学一年级发生 9 例急性流行性腮腺炎，针对传染源采取的最有效控制措施是

- A.全校进行清洁和消毒
- B.流行性腮腺炎病例隔离治疗
- C.对密切接触者进行健康教育
- D.对一年级的学生进行医学观察
- E.指导学生做好个人防护和个人卫生

答案：B

女，26 岁。初治肺结核患者。对其采用抗结核药物治疗时，服药方式正确的是

- A.空腹顿服
- B.早餐后顿服
- C.3 餐前服用
- D.3 餐后服用
- E.早晚服用

答案：A

男，23岁。接受肺结核患者健康管理服务1个月。乡村医生在随访时发现患者已自行停药1天，原因是服药后出现皮疹、关节痛、视物不清、手脚麻木等症状。乡村医生应采取的措施是

- A.要求继续服药
- B.立即转诊
- C.对症治疗
- D.建议多饮水
- E.减量服药观察

答案：B

50. 某镇有常住居民23070人，共7730户。经调查该镇碘缺乏病患者有17例、大骨节病患者有56例、克山病患者有2例。以下说法正确的是

- A.该镇碘缺乏病的发病率最高
- B.该镇大骨节病的发病率最高
- C.该镇克山病的发病率最低
- D.该镇碘缺乏病的患病率最高
- E.该镇大骨节病的患病率最高

答案：E

51. 某乡卫生院组织辖区幼儿园大班儿童进行五官科检查。应建议家长转诊至上级医院进行诊治的情况是

- A.尚未换牙
- B.外耳道有耵聍
- C.牙齿有黑褐色斑块
- D.视力表检查视力为 1.0
- E.视力表检查两眼视力相差一行

答案 :C (:对 4 岁视力 < 0.6,5 岁和 6 岁视力 < 0.8 的视力低常儿童,或两眼视力相差两行及
以上的儿童 , 都应当在 2 周~1 个月复查一次。排除 DE。C 为龋齿的可疑表现 , 选 C。)

5 2 .某乡村医生在村里进行饮用水卫生安全巡查时 , 发现村里有几个水龙头流出的水有异常情况。乡村医生应立即报告的部门是

- A.疾病预防控制机构
- B.卫生计生监督执法机构
- C.食品监督机构
- D.卫生行政主管部门
- E.村委会

答案 : B (卫生监督协管是指乡镇卫生院、村卫生室等基层医疗卫生机构 , 协助区 (县) 卫生监督机构 , 在辖区内依法开展食源性疾病预防及相关信息报告、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告、计划生育相关信息报告等工作。故选 B)

5 3 . 男 , 36 岁。近期体检时发现空腹血糖 7.5mmol/L , 经县医院确诊为 2 型糖尿病。乡卫生院将其纳入糖尿病患者健康管理。随访评估中必查且简单易行的项目是

- A.眼底检查

- B.心电图检查
- C.皮肤检查
- D.足背动脉搏动检查
- E.腹部超声检查

答案：D

54. 女，76岁。独居。有糖尿病病史3年，在某镇卫生院进行老年人健康管理已2年。今年健康体检发现视力、听力下降明显。医生为她做了老年人生活自理能力评估，评估的内容不包括

- A.进餐
- B.梳洗
- C.穿衣
- D.如厕
- E.语言

答案：E

55. 女，25岁。计划怀孕，来乡卫生院咨询。医生为其提供的健康教育指导不适合本阶段的是

- A.建议每日口服叶酸 0.4mg
- B.不吸烟不喝酒
- C.合理安排饮食
- D.产褥期心理保健

E.调离有毒有害作业环境

答案：D

56.女，25岁。妊娠18周，到乡卫生院进行产前检查。医生应给予转诊处理的情况是

A.血压120/70mmHg

B.脉率80次/分

C.血红蛋白69g/L

D.胎心率150次/分

E.出现胎动

答案：C（血红蛋白应该在110g/L左右）

57.某年冬天，某村民组织亲友在家聚餐，用煤炉取暖。8人食用了虾、牛肉、土豆等食物，共饮用1瓶散装白酒。2小时后，4人出现昏迷、口唇黏膜呈樱桃红色。最可能的原因是

A.酒精中毒

B.土豆中毒

C.毒素中毒

D.细菌感染

E.一氧化碳中毒

答案：E

58.某镇卫生院计划为所辖6个村的居民提供家庭医生签约服务，准备采取团队服务形

式为每个村组建 2 个签约服务团队。其团队成员组成不包括

- A.全科医生
- B.内科医生
- C.护士
- D.后勤人员
- E.公共卫生人员

答案：D

59. 某年 8 月水稻收割期间，某乡村医生在 6 天内发现本村 6 例村民发热、头痛、肌痛、咳嗽、胸痛等症状，疑似钩端螺旋体病。乡村医生正确的报告方式是

- A.立即进行突发公共卫生事件信息报告
- B.确诊后再进行突发公共卫生事件信息报告
- C.只进行传染病疫情个案报告
- D.确诊后再进行传染病疫情个案报告
- E.不需要进行传染病疫情报告

答案：A

60. 新生儿，8 日龄。出生体重为 3100g，生后母乳喂养，按需哺乳，排尿 8~10 次/日，排稀黄色软便 3~4 次/日，睡眠良好，4 天时体重为 2800g，7 天时恢复至出生体重。最可能导致体重下降的原因是

- A.母乳不足
- B.营养不良

C.消化不良

D.新生儿腹泻

E.生理性体重下降

答案：E

6 1 . 男，68 岁。确诊高血压后遵医嘱定期测量血压，根据医生指导服用降压药。这种促进健康的行为属于

A.疾病的一级预防

B.合理利用卫生服务

C.预警行为

D.维护医院的利益

E.戒除不良嗜好

答案：B

6 2 . 女，67 岁。2 型糖尿病病史 12 年，在乡卫生院接受健康管理 10 年，最近 3 个月来血糖控制不稳定。今天随访检查发现空腹血糖 8.0mmol/L，无其他症状、体征。经询问，患者没有进行饮食控制，时常饮酒，很少运动。医生应给予患者生活方式的指导和建议内容不包括

A.饮食治疗

B.运动治疗

C.血糖监测

D.血常规检查

E.控酒指导

答案：D

63. 某乡卫生院在门口设置 2 个健康教育宣传栏，全年为辖区群众提供 12 种内容的印刷材料，播放 6 种影像资料，举办咨询和讲座各 9 场。该乡卫生院在健康教育服务提供方面未达到要求的是

A.宣传栏设置数量

B.印刷材料数量

C.音像资料数量

D.举办咨询的数量

E.举办讲座的数量

答案：E（乡镇卫生室至少每月一次讲座）

64. 婴儿，6 月龄。5 月龄的疫苗还未接种，按照国家免疫规划程序，此时应补种和正常接种的疫苗是

A.脊灰灭活疫苗、百白破疫苗

B.百白破疫苗、乙肝疫苗

C.百白破疫苗、水痘疫苗

D.卡介苗、乙肝疫苗

E.乙肝疫苗、乙脑疫苗

答案：B

65. 某乡村医生听说本村小学有 20 多名学生出现发热、咳嗽等症状，立即打电话到该校初步核实后将相关情况进行了报告。此次报告称为

- A. 调查报告
- B. 首次报告
- C. 进展报告
- D. 结案报告
- E. 最后报告

答案：B

66. 男，45 岁。体型肥胖，吸烟，喜欢进食烟熏食品，父母均患有糖尿病。对其开展糖尿病防控，正确的干预措施是

- A. 治疗其父母糖尿病降低遗传风险
- B. 鼓励戒烟
- C. 减少烟熏食品摄入
- D. 进食高热量低纤维食物
- E. 动员参加糖尿病筛查

答案：E

67. 女，67 岁。糖尿病病史近 10 年，纳入 2 型糖尿病患者健康管理 8 年。乡村医生今年对其进行健康检查时准备增加眼底检查，这在疾病三级预防策略中属于

- A. 病因预防
- B. 临床前期预防

C. “三早” 预防

D.发病前期预防

E.发病后期预防

答案：E（已经患病并且 8 年，所以为发病后期预防，主要为了防止并发症）

68 . 女，18 岁。2 周来因等待高考绩而精神紧张、焦虑，3 小时前突发呼吸困难来诊。

既往曾多次发作呼吸困难。查体:口唇发绀，大汗淋漓，呼气相明显延长，两肺闻及哮鸣音。

该患者呼吸困难的类型是

A.中毒性呼吸困难

B.中枢性呼吸困难

C.精神性呼吸困难

D.心源性呼吸困难

E.肺源性呼吸困难

答案：E(注意精神性呼吸困难没有查体异常)

69 . 男，35 岁。右下后牙疼痛 1 天。既往患牙有松动不适。口腔检查:在患牙的唇颊侧形

成半球形的肿胀突起，牙龈发红、水肿、表面光亮，患牙有“浮起感”，叩痛、松动明显。

最可能的诊断是

A.龋病

B.牙外伤

C.急性牙髓炎

D.急性蜂窝织炎

E.急性牙周脓肿

答案：E（浮起感为牙周脓肿特征性表现）

70.女，38岁。间断恶心、呕吐2个月。查尿hCG阳性。最恰当的处理是

A.服用胃复安

B.建议肠外营养

C.建议行胃镜检查

D.应用维生素B6

E.建议行消化道X线钡剂造影检查

答案：D（考虑妊娠，如妊娠反应严重，可酌情使用止吐药维生素B6）

71.女，16岁。心悸、乏力1月余，伴食欲亢进、体重减轻。心电图：窦性心律，心率110次/分，频发房早。为明确病因首选的辅助检查是

A.血常规

B.血电解质

C.超声心动图

D.动态心电图

E.甲状腺功能测定

答案：E

72.女，75岁。伤后出现腰背痛2天，活动时加重，无双下肢放射痛。查体：T36.5℃，腰椎活动受限，腰1节段叩痛(+)。X线片示腰椎骨质增生，椎间隙变窄，腰1椎体楔形变，

腰椎略侧弯。最可能的诊断是

- A.腰肌劳损
- B.腰椎骨关节炎
- C.腰椎管狭窄症
- D.腰椎压缩性骨折
- E.腰椎间盘突出症

答案：D（伤后出现，考虑与外伤史相关）

73.男,27岁。4天前受凉后出现寒战、高热,继之咳铁锈色痰,伴右侧胸痛。查体:T39.5℃,P112次/分,R24次/分。急性病容,口角有疱疹。血WBC $12\times 10^9/L$ 。胸部X线片示右下肺斑片状阴影。最可能的诊断是

- A.干酪性肺炎
- B.葡萄球菌肺炎
- C.肺炎链球菌肺炎
- D.肺炎支原体肺炎
- E.急性肺脓肿

答案：C

74.男,55岁。腹痛1天,为阵发性绞痛,每次持续15分钟左右,部位不固定,伴腹胀、排气减少,未排便。10年前曾行阑尾切除术。查体:腹膨隆,无压痛、反跳痛,未触及包块,肠鸣音亢进。最可能的诊断是

- A.消化性溃疡穿孔

B.急性胃肠炎

C.急性胆囊炎

D.急性肠梗阻

E.阑尾残株炎

答案：D（急性肠梗阻：腹痛常为阵发性绞痛，伴有呕吐、腹胀，停止排便排气。）

75.女，33岁。2小时前运动过程中出现剧烈头痛、呕吐。查体：神清，颈部抵抗，克尼格征(+)，双侧病理征阴性。最可能的诊断是

A.脑出血

B.神经痛

C.丛集性头痛

D.紧张型头痛

E.蛛网膜下腔出血

答案：E（脑膜刺激征阳性，考虑蛛网膜下腔出血）

76.女，32岁。寒战、发热伴尿频2天。查体：T39.5℃，右肾区叩击痛(+)。尿沉渣镜检：红细胞5~10个/高倍视野，白细胞20~30个高倍视野。对该患者应用抗生素治疗的疗程应至少为

A.3天

B.1周

C.2周

D.3周

E.4 周

答案：C（考虑急性肾盂肾炎，治疗 2 周或以上）

77. 女，20 岁。进食海鲜半天后感全身剧痒难忍，伴有腹痛、腹泻，随之全身皮肤出现大小不等、形态不一、边缘不规则的局限性、隆起性肿胀，呈淡红色。该患者的皮肤损害是

A.斑疹

B.斑块

C.结节

D.紫癜

E.风团

答案：E

78. 男，35 岁。今晨起床时晕厥 1 次，意识很快恢复，无抽搐、大小便失禁。1 周前发现血压增高，当时血压 150/90mmHg，坚持每日口服厄贝沙坦 150mg、氨氯地平 5mg 及氢氯噻嗪 12.5mg 治疗。该患者出现上述症状最可能的原因是

A.良性阵发性位置性眩晕

B.短暂性脑缺血发作

C.血管迷走性晕厥

D.体位性低血压

E.梅尼埃病

答案：D

79 . 女，24 岁。已婚。停经 49 天，少量阴道流血半天就诊。超声提示宫腔内可见妊娠囊，有胎芽及胎心搏动。最可能的诊断是

- A.葡萄胎
- B.不全流产
- C.先兆流产
- D.难免流产
- E.稽留流产

答案：C

80 . 男，25 岁。近 3 个月来反复出现发作性肢体抽搐，呼之不应。每次持续 1 分钟左右，发作后不能回忆，常述头痛。1 小时前于家中看足球赛时突然意识丧失，四肢不自主抽搐，伴大小便失禁，上述症状持续 40 分钟未缓解被送诊。为控制抽搐，首选的治疗措施是

- A.静推地西洋
- B.静滴 20%甘露醇
- C.静推 50%葡萄糖
- D.肌注苯巴比妥
- E.静推 10%葡萄糖酸钙

答案：A

81 . 男，73 岁。右鼻反复出血 3 个月，多能自行停止。查体:右鼻腔见一菜花样新生物，表面有溃疡、渗血。最恰当的处理措施是

- A.镇静观察

B.鼻腔填塞

C.烧灼止血

D.应用止血药物

E.转诊至上级医院

答案：E（考虑鼻部癌症）

82. 男，36岁。突发呕吐咖啡样物300ml，伴头晕、四肢乏力2小时来诊。既往有上腹部饥饿痛史5年。查体：P88次/分，BP110/75mmHg。肠鸣音活跃，四肢末端尚暖。估计该患者出血量占循环血容量的百分比是

A.5%~10%

B.10%~20%

C.20%~30%

D.30%~40%

E.>40%

答案：B

出血量占循环血容量的比例	主要表现
10%以下	病人一般无明显临床表现
10%~20%	可有头晕、无力等症状，多无血压、脉搏等变化
20%以上	冷汗、心悸、脉搏增快、头晕、黑蒙等急性失血症状
30%以上	常有面色苍白、心率加快、脉搏细弱、血压下降、呼吸急促等急性周围循环衰竭的表现

83 .男,54岁。间断肉眼血尿1周,多在排尿终末段出现,不伴尿路刺激征及排尿困难。

查体无异常。尿沉渣镜检红细胞满视野/高倍视野。最可能引起该患者血尿的原因是

- A.泌尿系结石
- B.尿路感染
- C.肾小球肾炎
- D.泌尿系肿瘤
- E.前列腺增生

答案：D（无痛性肉眼血尿考虑泌尿系肿瘤）

84 .女,65岁。进行性皮肤、巩膜黄染伴消瘦、乏力3个月,无腹痛、发热。发病以来

体重减轻明显。最可能出现的体征是

- A.肝、脾肿大
- B.移动性浊音阳性
- C.右上腹有压痛、反跳痛
- D.触及无压痛的肿大胆囊
- E.墨菲(Murphy)征阳性

答案：D（进行性黄疸应考虑由肿瘤所致的阻塞性黄疸或重症肝炎,多为胰头癌,常见无压痛的肿大胆囊）

85 .女,65岁。晨起排便后突感眩晕,伴有枕部疼痛、频繁恶心、呕吐,步行不稳,30

分钟后昏迷,大小便失禁,呼吸节律不规整。既往有高血压病史20年。最可能的诊断是

- A.前庭神经元炎
- B.脑栓塞
- C.梅尼埃病
- D.小脑出血
- E.短暂性脑缺血发作

答案：D

86.男,60岁。因腹痛、发热伴皮肤黄染1天来村卫生室就诊,初步诊断为急性胆管炎。医生及时拨打120向上级医院转诊。该诊疗行为说明全科医疗与专科医疗两者之间的联系是

- A.综合与分科
- B.涉及面宽与窄
- C.常见问题与疑难问题
- D.基本技术与高精尖技术
- E.各司其职、互补互利

答案：E

87.男,57岁。高血压病史15年。2个月前因脑梗死住院治疗,病情好转出院,虽留后遗症,但生活能自理。患者在家接受社区卫生服务中心提供的康复治疗及后期管理。该医疗模式属于

- A.神经科医疗服务模式
- B.传统中医服务模式

- C.全科医疗服务模式
- D.医养结合服务模式
- E.心血管专科医疗服务模式

答案：C

88.男，45岁。在菜地劳作时不慎被毒蛇咬伤左手中指。现场处理的首选方法是

- A.左手中指根部用绸带扎紧
- B.用止血带绑扎左前臂
- C.左臂肘关节以上用止血带绑扎
- D.用手指按压伤口
- E.用两只手指压紧左手中指根部

答案：A（在被毒蛇咬伤后，立即用布条类、手巾或绷带等物，在伤肢近侧5~10cm处或在伤指（趾）根部予以绑扎，在护送途中应每隔20分钟松绑一次，每次1~2分钟，以免影响血液循环造成组织坏死。）

89.女，45岁。有抑郁症病史。2小时前与家人吵架后服下20余片“地西洋”。治疗的特效解毒剂是

- A.纳洛酮
- B.阿托品
- C.氟马西尼
- D.苯海拉明
- E.异丙臻

答案：C（氟马西尼是苯二氮草类拮抗剂）

90 . 男，45岁。饮酒后神志不清4小时。查体:T36.0℃，P92次/分，R24次分，BP120/80mmHg 烦躁不安，伴有乱语多动。心、肺查体无异常。处理措施不正确的是

A.苯巴比妥肌内注射

B.纳洛酮治疗

C.50%葡萄糖静脉注射

D.维生素 B1、B6 肌内注射

E.小剂量地西洋治疗

答案：A（急性酒精中毒应慎用镇静剂，烦躁不安或过度兴奋特别有攻击行为可用地西洋，肌内注射比静脉注射安全，注意观察呼吸和血压。避免用氯丙嗪、吗啡、苯巴比妥类镇静剂。）

91 . 男，30岁。2天前左胸腹部被电动自行车撞伤。X线片示左侧第8肋骨骨折，余未见异常。今日下楼时突发腹痛，面色苍白。查体:P140次/分，BP80/60mmHg。诊断性腹腔穿刺抽出不凝血。最可能的诊断是

A.上消化道出血

B.腹膜后血肿破裂

C.迟发性脾破裂

D.小肠破裂

E.肝被膜下血肿破裂

答案：C（左侧受伤，且有不凝血，提示左侧实质性器官损伤，最常见脾损伤）

9 2 . 男 , 14 岁。因肺炎予以抗感染治疗。给药前青霉素皮试阴性 , 但静脉滴注青霉素几分钟后即出现头晕、面色苍白、呼吸困难、血压下降等表现。首选的抢救药物是

- A.多巴胺
- B.异丙嗪
- C.地塞米松
- D.肾上腺素
- E.去甲肾上腺素

答案 : D

9 3 . 女 , 30 岁。妊娠 16 周。近日因感冒出现发热等症状。最适宜选择的解热镇痛药是

- A.对乙酰氨基酚
- B.阿司匹林
- C.保泰松
- D.布洛芬
- E.吲哚美辛

答案 : A (妊娠妇女应慎用解热镇痛药 , 必须用时 , 宜选用对乙酰氨基酚。)

9 4 . 女 , 35 岁。性生活后阴道流血 1 周。妇科检查见宫颈轻度烂样改变 , 触之易出血。

下一步首选的处理是

- A.子宫颈刮片细胞学检查
- B.子宫颈活体组织病理检查
- C.阴道镜检查

D.子宫颈锥切术

E.分段诊断性刮宫

答案：A（于性交后或阴道检查后有鲜血流出，要考虑急性宫颈炎、宫颈癌、宫颈息肉或子宫黏膜下肌瘤等。有烂样改变，宫颈癌可能性大，筛查选子宫颈刮片细胞学检查）

95.女，32岁。停经42天，阴道少量流血伴左下腹胀痛2天。妇科检查：子宫正常大小，质软，左附件区略厚、轻压痛。最可能的诊断是

A.急性输卵管炎

B.子宫内膜异位症

C.卵巢囊肿蒂扭转

D.输卵管妊娠

E.先兆流产

答案：D（停经后阴道出血，且有腹部轻压痛，考虑异位妊娠）

96.男，72岁。排尿次数增多、尿线变细、排尿时间延长5年，近1年症状逐渐加重偶有尿痛，无血尿、排尿中断。首选的检查是

A.膀胱镜

B.膀胱、前列腺超声

C.膀胱、前列腺CT

D.尿脱落细胞学检查

E.直肠指检

答案：E（考虑前列腺增生，阿虎医考）

97. 女, 48岁。尿频、尿急、尿痛3天。尿常规:蛋白微量, 沉渣镜检白细胞20~30个高倍视野, 红细胞5~6个高倍视野。最可能的致病病原体是

- A.衣原体
- B.屎肠球菌
- C.变形杆菌
- D.大肠埃希菌
- E.真菌

答案: D

98. 男, 55岁。暴饮暴食后出现上腹痛伴恶心、呕吐14小时, 吐后疼痛不轻。查体: T38°C, 上腹部有压痛, 无反跳痛、肌紧张, 墨菲(Murphy)征(-)。实验室检查: 血 WBC $18.2 \times 10^9/L$, 血淀粉酶 590 索氏单位/L, 尿淀粉酶 1274 索氏单位/L。最可能的诊断是

- A.急性胰腺炎
- B.急性胆囊炎
- C.急性胃炎
- D.急性肠系膜淋巴结炎
- E.消化性溃疡穿孔

答案: A

99. 女, 45岁。晚餐进食烤肉后出现右上腹阵发性绞痛10小时, 伴恶心, 呕吐胃内容物2次, 疼痛向右肩、背部放射。查体: T38.2°C, BP110/80mmhg, 皮肤、巩膜无黄染,

右上腹有压痛，轻度肌紧张。化验血:WBC $15.5 \times 10^9/L$ ，N0.78。对明确诊断最有意义的体征是

- A.肠鸣音 3 次/分
- B.肝区叩痛阳性
- C.移动性浊音阴性
- D.腹部叩诊呈鼓音
- E.墨菲(Murphy)征阳性

答案：E（急性胆囊炎）

100 . 男，80 岁。反复上腹痛 20 年，曾诊断为“胃溃疡”，奥美拉唑治疗有效。2 天来共排柏油便 3 次，总量约 600g。既往史:1 周前诊断为“急性心肌梗死”，并接受冠脉支架植入手术。查体:BP110/68mmHg。贫血貌，双肺呼吸音粗，未闻及干湿性啰音。心率 89 次/分，律齐，第一心音低。腹平坦，无压痛，肝脾未触及肿大，移动性浊音阴性。首选的治疗方法是

- A.手术治疗
- B.内镜下治疗
- C.口服法莫替丁
- D.泵入垂体后叶素
- E.静注雷贝拉唑

答案：E（消化性溃疡、急性胃黏膜病变出血期应静脉途径给药，应首选质子泵抑制剂，也可选用雷尼替丁、法莫替丁等。）

