

终极押题卷中医执业第二单元

A1/A2 型选择题

0. 呕吐与头部位置改变有密切关系的疾病是

- A. 脑炎
- B. 耳源性眩晕
- C. 妊娠反应
- D. 尿毒症
- E. 糖尿病酮症酸中毒

答案:B

解析:耳源性眩晕是指前庭迷路感受异常引起的眩晕。当发生迷路积水(梅尼埃综合征)、晕动病(晕舟车病)、迷路炎、迷路出血或中毒、前庭神经炎或损害、中耳感染等都可引起体位平衡障碍,发生眩晕。由于前庭核通过内侧束与动眼神经核之间联系。

标签:

简单

记忆

1. 属感染性发热的病因是

- A. 风湿热
- B. 血清病
- C. 白血病
- D. 类风湿关节炎
- E. 流行性出血热

答案:E

解析:流行性出血热是由汉坦病毒引起的一种由鼠传播的自然疫源性疾病。而由病毒感染引起的发热属于感染性发热。

标签:

精华

简单

记忆

2. 呕吐隔夜食物且含腐酵气味者见于

- A. 急性胃炎
- B. 慢性胃炎
- C. 幽门梗阻
- D. 胃癌
- E. 十二指肠炎

答案:C

解析:呕吐物性质:①咖啡色,提示上消化道出血;②隔餐或隔日食物,并含腐酵气味,提示幽门梗阻;③含胆汁,提示十二指肠乳头以下的十二指肠或空肠梗阻;④有粪臭,提示低位肠梗阻;⑤有蛔虫,提示胆道蛔虫、肠道蛔虫。

标签:

精华

简单

理解

3. 不属于肝细胞性黄疸的特点是

- A. 尿胆红素阳性
- B. 尿胆原常增多
- C. 血清结合型、非结合型胆红素均增高
- D. 血清仅结合型胆红素增高
- E. 大便颜色改变不明显

答案:D

解析:临床表现 黄疸呈浅黄至深黄,有乏力、食欲下降、恶心呕吐、甚至出血等肝功能受损的症状及肝脾肿大等体征。(实验室检查特点 血清结合及非结合胆红素均增多。尿中尿胆原通常增多,尿胆红素阳性。大便颜色通常改变不明显。有转氨酶升高肝功能受损的表现。故 D 血清仅结合型胆红素增高错误。

标签:

中等

记忆

4. 患者,男,67岁。皮肤、巩膜黄染呈进行性加重,大便持续变白,病后消瘦明显。应首先考虑的是

- A. 急性病毒性肝炎
- B. 肝硬化
- C. 肝癌
- D. 胰头癌
- E. 胆总管结石

答案:D

解析:黄疸是胰头癌较早出现的症状之一,呈进行性加深,全身瘙痒,大便色浅,尿色渐深。患者可出现腹胀、食欲缺乏、消化不良、恶心呕吐等消化道症状,常有消瘦、乏力。

标签:

精华

中等

应用

5. 下列除哪项外，均符合问诊的要求
- A. 态度和蔼，言语亲切
 - B. 要将患者陈述的内容去粗取精，去伪存真
 - C. 交谈时避免使用特定意义的医学术语
 - D. 医生要多提出诱导性的问题
 - E. 对危重患者只扼要询问，待病情缓和后再补充

答案:D

解析: 问诊的具体要求如下: ①从一般到特殊地提问; ②无诱导性提问、诘难性提问及连续性提问; ③按项目的问诊评分顺序系统地问诊; ④引证核实患者提供的信息; ⑤问诊过程中应有小结; ⑥询问者注意聆听, 不轻易打断患者讲话; 不能重复问诊; ⑦不出现难堪的停顿; ⑧友善的举止, 友好的眼神; ⑨给予赞扬性肯定或鼓励; ⑩其他, 如不用医学名词和术语提问; 谦虚礼貌、尊重患者, 有同情心, 使患者感到温暖等。

标签:

简单

应用

6. 下列除哪项外，均是采录“主诉”所要求的内容
- A. 主诉是迫使患者就医的最主要的症状
 - B. 一般不超过 20 个字
 - C. 确切的主诉常可作为诊断的向导
 - D. 主诉的记录，尽量使用诊断术语
 - E. 症状不突出者，可把就医的主要目的作为主诉

答案:D

解析: 主诉应记录患者就诊的主要原因及其发生的时间。其原因通常为患者自诉的主要(或最痛苦)症状及其性质, 因此, 不能是“尽量使用诊断性术语”。为了使主要原因症状突出、扼要, 要求字数精炼简洁, 一般不超过 20 字; 症状不突出者, 可把就医主要目的作为主诉。疾病的诊断通常依据其症状、体征和辅助检查结果, 所以, 确切的主诉可作为诊断的向导。

标签:

精华

简单

应用

7. 下列哪种疾病，引起双侧瞳孔缩小
- A. 阿托品中毒
 - B. 海洛因中毒
 - C. 视神经萎缩
 - D. 脑癌
 - E. 青光眼

答案:B

解析:瞳孔缩小见于虹膜炎、有机磷中毒及毛果芸香碱、氯丙嗪、吗啡等药物作用。瞳孔扩大见于颈交感神经刺激、青光眼、阿托品作用。双侧瞳孔散大伴对光反射消失,常见于小脑扁桃体疝,患者常处于濒死状态。双侧瞳孔不等大常见于海马沟回疝。

标签:

中等

记忆

8. 草莓舌常见于下列哪种疾病

- A. 伤寒
- B. 恶性贫血
- C. 猩红热
- D. 心肺功能不全
- E. 严重脱水

答案:C

解析:地图舌见于核黄素缺乏;草莓舌见于长期发热和猩红热;牛肉舌主要见于烟酸缺乏;镜面舌见于恶性贫血、缺铁性贫血和慢性萎缩性胃炎;舌色淡红见于营养不良或贫血;舌色深红见于急性感染性疾病;舌色紫红见于心、肺功能不全。

标签:

精华

简单

记忆

9. 胸骨角常连接

- A. 第1肋软骨
- B. 第2肋软骨
- C. 第3肋软骨
- D. 第4肋软骨
- E. 第5肋软骨

答案:B

解析:胸骨体与胸骨柄的连接处所形成的微向前突起的角,称为胸骨角。胸骨角两侧与左、右第2肋软骨相连接,通常以此作为标记来计数前胸壁上的肋骨和肋间隙。气管分叉、第4胸椎下缘、上纵隔与中纵隔交界部,均位于胸骨角的水平。

标签:

简单

记忆

10. 舟状腹常见于

- A. 腹水
- B. 胃扩张
- C. 恶病质
- D. 早期妊娠
- E. 气腹

答案:C

解析:腹部凹陷如舟状者见于恶病质及严重脱水。

标签:

简单

记忆

11. 下列关于 Q-T 间期的正确叙述中, 应除外哪一项

- A. 代表心室肌除极和复极全过程所需的时间
- B. Q-T 间期越长, 心率越快
- C. 校正的 Q-T 间期为 $Q-T_c = Q-T / R-R$
- D. $Q-T_c$ 就是 R-R 间期为 1 秒时的 Q-T 间期
- E. 正常 $Q-T_c$ 的最高值为 0.44 秒, 超过此时限即属延长

答案:B

解析:Q-T 间期指 QRS 波群起点到 T 波终点间的距离, 代表心室除极开始到复极结束所需要的总时间。一般为 0.32~0.44 秒, 常常受年龄、心率及迷走神经张力的影响而变化, 也容易受药物的影响。心率越快, Q-T 间期越短, 反之越长。临床中常用 Barrett 公式求出: $Q-T = 0.39 \times (R-R) \pm 0.04$ 秒。常用校正的 Q-T 间期 ($Q-T_c$) 来纠正心率对 Q-T 的影响, $Q-T_c = Q-T / R-R$ 。 $Q-T_c$ 就是 R-R 间期为 1 秒(心率 60 次/分)时的 Q-T 间期。传统的 $Q-T_c$ 的正常 E 限值为 0.44 秒, 超过此值即认为 Q-T 间期延长。Q-T 间期在不同导联之间存在一定差异, 正常人不同导联间的 Q-T 间期差异最大可达 0.05 秒, 以 V2、V3 导联最长。

标签:

精华

中等

应用

12. 右上肺中央型肺癌可能出现的 X 线表现是

- A. 两上肺锁骨下区的片状阴影
- B. 左心缘影呈直线状斜向外下方
- C. 右上肺与肺门部形成“S”状影
- D. 肺内有多发的薄壁空洞
- E. 右肺外带阴影

答案:C

解析:实记题。

标签：
精华
中等
记忆

13. 急性粟粒型肺结核的 X 线表现哪项是错误的

- A. 密度均匀
- B. 分布均匀
- C. 大小均匀
- D. 结节影往往在 5mm 以上
- E. 结节影稍模糊

答案:D

解析:实记题。

标签：
中等
记忆

14. 梨形心脏常见于

- A. 主动脉瓣关闭不全
- B. 主动脉瓣狭窄
- C. 二尖瓣狭窄
- D. 二尖瓣关闭不全
- E. 心包积液

答案:C

解析:梨形心又称二尖瓣型心。肺动脉段凸出及心尖上翘，主动脉结节缩小或正常，状如梨形。多见于右心负荷或以其为主的心腔变化。常见疾病有二尖瓣狭窄、房间隔缺损、肺动脉瓣狭窄、肺动脉高压和肺心病等。

标签：

与专业和章节不符

15. 腹壁静脉曲张，以脐为中心，血流方向与正常解剖血流方向相同，见于

- A. 门静脉高压
- B. 肝静脉梗阻
- C. 上腔静脉梗阻
- D. 下腔静脉梗阻
- E. 肝动脉阻塞

答案:A

解析:实记题。

标签：
精华
简单

记忆

16. 不属于阻塞性肺气肿体征的是()

- A. 触觉语颤增强
- B. 叩诊呈过清音，心浊音界缩小
- C. 桶状胸
- D. 肺下界和肝浊音界下降
- E. 肺泡呼吸音降低，呼气明显延长

答案:A

解析:触觉语颤增强见于: 1. 肺实变: 见于肺炎链球菌肺炎、肺梗死、肺结核、肺脓肿及肺癌等。2. 压迫性肺不张: 见于胸腔积液上方受压而萎瘪的肺组织及受肿瘤压迫的肺组织。3. 较浅而大的肺空洞: 见于肺结核、肺脓肿、肺肿瘤所致的空洞。故本题选 A。

标签:

精华

简单

应用

17. 肺气肿时，心脏浊音界的改变多为

- A. 心浊音界向左扩大
- B. 心浊音界缩小
- C. 心浊音界向右扩大
- D. 心浊音界向两侧扩大
- E. 以上均非

答案:B

解析:临床通常所说心浊音界是指左右心缘被肺遮盖部分，在心脏叩诊时呈现的相对浊音界。叩诊音受肺含气量、胸壁厚薄及邻近器官的影响。肺气肿时，肺内含气量增多，心脏浊音界变小甚至不易叩出。显然，心浊音界增大的各种改变不能成立。

标签:

简单

记忆

18. 全身黄疸，大便呈白陶土色，可见于

- A. 溶血性贫血
- B. 急性肝炎
- C. 胰头癌
- D. 肝硬化
- E. 严重贫血

答案:C

解析:胰头癌压迫胆道出现梗阻性黄疸，可表现为全身黄疸，大便呈白陶土

色的症状。

标签:

精华

简单

应用

19. 慢性、周期性、节律性的上腹痛见于

- A. 慢性胃炎
- B. 慢性胰腺炎
- C. 消化性溃疡
- D. 慢性胆囊炎
- E. 胃癌

答案:C

解析:考消化性溃疡的症状。

标签:

精华

简单

记忆

20. 下列哪种恶性肿瘤，常可转移到左锁骨上淋巴结

- A. 甲状腺癌
- B. 肺癌
- C. 乳腺癌
- D. 胃癌
- E. 鼻咽癌

答案:D

解析:晚期胃癌可经胸导管向左锁骨上淋巴结转移，或经肝圆韧带转移至脐部。

标签:

精华

简单

记忆

21. 患者呼吸呈“暂停——浅慢——深快——浅慢——暂停”周期性变化，此为

- A. 潮式呼吸
- B. 间停呼吸
- C. 深大呼吸
- D. 叹气呼吸
- E. 点头呼吸

答案:A

解析:常见的呼吸节律改变有潮式呼吸(呼吸逐渐由浅慢变深快，继之由深快

变浅慢，直至呼吸暂停，然后再重复以上变化的周期性呼吸)、间停呼吸(有规律的呼吸几次后突然停止呼吸，间隔一段时间后又开始呼吸，即周而复始的间断呼吸)、叹息样呼吸(在正常的呼吸基础上间隔一段时间即出现一次深大呼吸，类似叹气样)及遏止性呼吸(在吸气过程中因胸部剧痛而突然停顿或断续的呼吸运动)等。

标签:

精华

简单

记忆

22. COPD 患者肺功能显示 $50\% \leq FEV1\% \leq 80\%$, 其肺功能分级是

- A. 1 级
- B. 2 级
- C. 3 级
- D. 4 级
- E. 5 级

答案:B

解析: I 级 轻度 $FEV1\%$ 占预计值 ≥ 80 (II 级 中度 $FEV1\%$ 占预计值 $50 \sim 79$ (III 级 重度 $FEV1\%$ 占预计值 $30 \sim 49$ (IV 级 极重度 $FEV1\%$ 占预计值 < 30

标签:

23. 左上肺癌患者出现声音嘶哑时被压迫的神经是

- A. 迷走神经
- B. 舌下神经
- C. 副神经
- D. 舌咽神经
- E. 喉返神经

答案:E

解析: 癌肿压迫或转移性淋巴结压迫喉返神经 (左侧多见), 则出现声音嘶哑

标签:

24. COPD 患者的体征, 错误的是

- A. 桶状胸
- B. 双肺触觉语颤减弱
- C. 叩诊呈过清音
- D. 心浊音界缩小
- E. 吸气延长

答案:E

解析: COPD 早期可无异常, 随疾病进展出现: 桶状胸, 呼吸变浅、频率增快, 双肺语颤减弱, 叩诊呈过清音, 心浊音界缩小, 肺下界和肝浊音界下移, 呼吸音减弱, 呼气延长, 部分患者可闻及散在的干啰音和 (或) 湿啰音。

标签:

25. 属短效-速效 β_2 受体激动剂的药物是

- A. 麻黄碱
- B. 氨茶碱
- C. 异丙肾上腺素
- D. 沙丁胺醇
- E. 去甲肾上腺素

答案:D

解析: β_2 受体激动剂是缓解哮喘症状的首选药物。有短效-速效 β_2 受体激动剂如沙丁胺醇、特布他林气雾剂, 短效-迟效 β_2 受体激动剂如沙丁胺醇、特布他林片剂, 长效-迟效 β_2 受体激动剂如沙美特罗气雾剂, 长效-速效 β_2 受体激动剂如福莫特罗干粉吸入剂等。

标签:

26. 下列表现, 提示哮喘病情危急的是

- A. 端坐呼吸
- B. 两肺哮鸣音减弱或消失
- C. 奇脉
- D. 口唇发绀
- E. 胸廓饱满, 叩诊呈过清音

答案:B

解析:危重发作时患者多呈嗜睡状态, 意识模糊, 严重发绀, 可见胸腹矛盾运动, 查体双肺哮鸣音减少甚至消失, 心音低弱, 脉率不规则, 呈现急性呼吸衰竭的危重状态。

标签:

27. 治疗急性肺水肿常用的正性肌力药, 错误的是

- A. 毛花苷 C
- B. 米力农
- C. 多巴酚丁胺
- D. 多巴胺
- E. 硝普钠

答案:E

解析:硝普钠为血管扩张剂。故选 E。(应用正性肌力药增强心肌收缩力 (1) 多巴酚丁胺 可增加心输出量, 起始剂量为 $2\sim 3\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$, 根据尿量和血流动力学监测结果调整剂量, 最高可用至 $20\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$ 。多巴酚丁胺可使心律失常的发生率增加, 应密切观察。(2) 洋地黄类药 毛花苷 C 静脉给药, 最适合用于有心房颤动伴有快速心室率并已知有心室扩大伴左心室收缩功能不全者。首剂可给 $0.4\sim 0.8\text{mg}$, 2 小时后可酌情再给 $0.2\sim 0.4\text{mg}$ 。急性心肌梗死发病 24 小时内不宜用洋地黄类药物。

标签:

28. 慢性心力衰竭患者不出现的体征的是

- A. 心界轻度扩大
- B. 心率增快
- C. 肺动脉瓣区第二心音亢进
- D. 舒张期奔马律
- E. 奇脉

答案:E

解析:奇脉指吸气时脉搏明显减弱或消失的现象,又称为吸停脉。常见于心包积液和缩窄性心包炎时,是心包填塞的重要体征之一。

标签:

29. 急性下壁心肌梗死出现三度房室传导阻滞时,首选的治疗方法是

- A. 静注阿托品
- B. 静滴异丙肾上腺素
- C. 安装临时人工心脏起搏器
- D. 同步直流电复律
- E. 食道调搏

答案:C

解析:房室传导阻滞:发展到第二度或第三度,伴有血流动力学障碍者宜用人工心脏起搏器做临时的经静脉心内膜右心室临时起搏治疗。

标签:

30. 心肌梗死时心电图特征性改变出现在II、III、aVF导联,定位诊断是

- A. 局限前壁
- B. 正后壁
- C. 前间壁
- D. 下壁
- E. 高侧壁

答案:D

解析:下壁特征性ECG改变导联II、III、aVF,对应性改变导联I、aVL。

标签:

31. 血管紧张素转换酶抑制剂治疗慢性心力衰竭的机制是

- A. 阻断心肌重塑
- B. 减慢心率
- C. 增强心肌收缩力
- D. 增加排尿量
- E. 心肌 β 受体密度上调

答案:A

解析:血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI):阻断心肌、小血管重塑,以达到维

护心肌功能，延缓心力衰竭进展的治疗效果。

标签：

32. 对冠心病最有确诊意义的检查是

- A. 心电图
- B. 选择性冠状动脉造影
- C. 24 小时动态心电图
- D. 超声心动图
- E. 心功能检查

答案：B

解析：根据典型心绞痛的发作特点和体征，含用硝酸甘油后可短时间内缓解，结合年龄和存在冠心病危险因素，除外其他原因所致的心绞痛，一般即可确立诊断。必要时行选择性冠状动脉造影明确诊断。

标签：

33. 急性心肌梗死发病的最初 24 小时内并发左心衰竭，应慎用的药物是

- A. 硝酸甘油
- B. 硝酸异山梨酯
- C. 多巴酚丁胺
- D. 硝普钠
- E. 毛花苷 C

答案：E

解析：急性心肌梗死发病 24 小时内不宜用洋地黄类药物。

标签：

34. 洋地黄中毒最重要的反应是

- A. 恶心、呕吐
- B. 倦怠、乏力
- C. 频发室性早搏
- D. 视力模糊、黄视
- E. 腹痛、腹泻

答案：C

解析：洋地黄中毒及其处理：①低血钾、肾功能不全以及与其他药物的相互作用都是引起洋地黄中毒的因素。②洋地黄中毒最重要的毒性反应是出现各类心律失常及加重心力衰竭，还可出现胃肠道反应如恶心、呕吐，以及中枢神经的症状如视力模糊、黄视、倦怠等。③发生洋地黄中毒时应立即停药，并进行对症处理。

标签：

35. 关于重症胰腺炎血淀粉酶的叙述，以下哪项不确切

- A. 血清淀粉酶在起病 12~14 小时开始上升，约 24 小时达高峰，48 小时左右开始下降，多持续 3~5 天

- B. 血淀粉酶水平的高低与病情严重程度不一定平行，重症患者血淀粉酶可正常或低于正常
- C. 血淀粉酶超过正常值上限 3 倍 ($>500\text{U/L}$, 苏氏法) 即可确诊急性胰腺炎
- D. 血淀粉酶持续增高常提示病情反复、并发假性囊肿或脓肿
- E. 其他急腹症如消化性溃疡穿孔、胆石症、胆囊炎、肠梗阻等亦可引起血清淀粉酶增高，但一般不超过正常值上限 2 倍

答案:A

解析:血清淀粉酶在起病 2~12h 开始上升, 约 24h 达高峰, 48h 左右开始下降, 多持续 3~5 天。

标签:

36. 直径 $\leq 3\text{cm}$ 的小肝癌, 可获得根治的非手术治疗方法是

- A. 放射治疗
- B. 分子靶向治疗
- C. 局部消融治疗
- D. 生物治疗
- E. 肺动脉灌注性化疗

答案:C

解析:局部消融治疗安全性高、并发症少、易耐受、重复性好。对于单发的直径 $\leq 3\text{cm}$ 的小肝癌可获得根治性消融。

标签:

37. 对鉴别上、下尿路感染最有意义的是

- A. 中段尿细菌培养阳性
- B. 尿路刺激症状
- C. 畏寒、发热、腰痛
- D. 肾小管浓缩功能正常
- E. 尿中白细胞管型

答案:E

解析:上尿路感染指肾盂肾炎, 下尿路感染主要指膀胱炎, 出现白细胞管型多提示为肾盂肾炎。

标签:

38. 慢性肾炎, 肾衰竭的患者, 有高度水肿及轻度左心衰竭, 同时又有严重的代谢性酸中毒, 应给药物纠正酸中毒最好用

- A. 11.2%乳酸钠
- B. 10%葡萄糖
- C. 10%葡萄糖酸钙
- D. 7.28%三羟甲在氨基甲烷
- E. 5%碳酸氢钠

答案:E

解析:慢性肾功能衰竭患者一般要补充碳酸氢钠 3--10g/d,分 2-3 次口服,出现严重代谢性酸中毒,则需积极补碱治疗,可用 5%碳酸氢钠,如难以纠正且 CO₂CP<13.5mmol/L,则应透析。

标签:

39. 急性白血病最主要的死亡原因是

- A. 严重感染
- B. 严重贫血
- C. 大出血
- D. 肝功能衰竭
- E. 中枢神经系统浸润

答案:A

解析:严重感染可致菌血症或败血症,是急性白血病最常见的死亡原因之一。

标签:

40. 关于骨髓增生异常综合征,以下哪项叙述欠妥

- A. 起源于造血干细胞
- B. 以病态造血及高风险向急性白血病转化为特征
- C. 任何年龄的人群均可发病
- D. 约 80%患者大于 50 岁
- E. 男女均可发病

答案:D

解析:骨髓增生异常综合征(MDS)是一组起源于造血干细胞,以病态造血及高风险向急性白血病转化为特征的血液病。任何年龄的人群均可发病,约 80%患者超过 60 岁;男女均可发病。

标签:

41. 甲亢时最常见的心律失常类型是

- A. 室性早搏
- B. 房性心动过速
- C. 交界性早搏
- D. 心房颤动
- E. 房室传导阻滞

答案:D

解析:心律失常,以心房颤动、房性早搏等房性心律失常多见。

标签:

42. 下列除哪项外,他汀类禁用

- A. 儿童
- B. 孕妇
- C. 哺乳期妇女
- D. 准备生育的妇女

E. 70 岁以上的老人

答案:E

解析:多数患者对他汀类药耐受性良好,极少数严重者因横纹肌溶解而致急性肾衰竭,初始用药 4~6 周应复查肝肾功能及肌酶。他汀类不宜与环孢素、雷公藤、环磷酰胺、大环内酯类抗生素以及吡咯类抗真菌药(如酮康唑)等合用。儿童、孕妇、哺乳期妇女和准备生育的妇女禁用。

标签:

43. 类风湿关节炎最早出现的关节表现是

- A. 疼痛
- B. 活动障碍
- C. 肿胀
- D. 畸形
- E. 晨僵

答案:A

解析:关节痛为类风湿性关节炎出现最早的表现。最常出现的部位为腕、掌指关节,近端指间关节,其次是趾、膝、踝、肘、肩等关节。多呈对称性、持续性,但时轻时重。

标签:

44. 下列关于全面强直-阵挛发作的临床表现,错误的是

- A. 意识丧失
- B. 大小便失禁
- C. Babinski 征(+)
- D. 瞳孔缩小,对光反射消失
- E. 对称性节律性四肢抽动

答案:D

解析:全面性强直-阵挛发作即大发作。以意识丧失和全身对称性抽搐为特征。(1)强直期:突然意识丧失,摔倒在地,全身骨骼肌持续性收缩;上睑抬起,眼球上翻,喉部痉挛,发出叫声;口先张后闭,常咬破舌;颈部和躯干先屈曲后反张;强直期持续 10~20 秒后肢端出现微颤转入阵挛期。(2)阵挛期:震颤幅度增大并延及全身,呈对称性、节律性四肢抽动,先快后慢;最后一次强烈阵挛后抽搐停止,所有肌肉松弛。在以上两期中可见心率增快,血压升高,汗液、唾液和支气管分泌物增多,瞳孔扩大等自主神经征象;呼吸暂时中断致皮肤发绀,瞳孔散大,对光反射、深反射、浅反射消失,病理反射阳性。(3)痉挛后期:阵挛期后尚有短暂的强直痉挛,造成牙关紧闭和大小便失禁。呼吸先恢复,口鼻喷出泡沫或血沫,心率、血压、瞳孔等恢复正常,肌张力松弛,意识逐渐恢复。自发作至意识恢复约 5~10 分钟。醒后感头昏、头痛、全身酸痛乏力,对抽搐全无记忆。

标签:

45. 蛛网膜下腔出血患者，为防止再出血，发病后绝对卧床的时间是

- A. 2~4 周
- B. 1~2 周
- C. 4~6 周
- D. 6~8 周
- E. 8~12 周

答案:C

解析:蛛网膜下腔出血急性期的治疗目的是防治再出血，降低颅内压，防治继发性脑血管痉挛，积极治疗原发病。（一般处理：绝对卧床 4~6 周。避免用力；保持大便通畅；注意水、电解质平衡；预防再出血和迟发性脑梗死。

标签:

46. 阿托品治疗急性有机磷杀虫药中毒达到阿托品化的表现，错误的是

- A. 瞳孔较前扩大
- B. 肺部啰音消失
- C. 颜面潮红
- D. 皮肤干燥
- E. 心率较前减慢

答案:E

解析：“阿托品化”，即应用阿托品后患者出现意识好转、皮肤干燥、颜面潮红、肺部湿性啰音消失、瞳孔较前扩大、心率较前增快等表现。

标签:

47. 关于潜伏期的概念，下列哪项是错误的

- A. 潜伏期长短一般与病原体感染量呈成反比
- B. 有些传染病在潜伏期内具有传染性
- C. 潜伏期是确定传染病的检疫期的重要依据
- D. 多数传染病的潜伏期比较恒定
- E. 传染病的隔离期是依据该病的潜伏期来确定

答案:E

解析:考查潜伏期的概念。

标签:

精华

简单

记忆

48. 伤寒的主要临床表现不包括

- A. 消化道症状
- B. 发热
- C. 皮肤瘀点、瘀斑
- D. 脾大

E. 相对缓脉

答案:C

解析:典型的临床表现可分为:①初期(侵袭期),相当于病程第1周,发热是最早的症状,体温呈阶梯状上升,于5~7日达39.5℃或以上,伴有全身不适、食欲不振、咳嗽等,部分患者出现便秘或腹泻;②极期,相当于病程第2~3周,临床表现有高热,特殊的中毒面容,相对缓脉,玫瑰疹,脾大,右下腹压痛,便秘或腹泻,易并发肠出血及肠穿孔;③缓解期,相当于病程第3~4周,体温下降,症状减轻,警惕肠穿孔肠出血;④恢复期,相当于病程第4周末开始,体温恢复正常,食欲常旺盛,但体质虚弱,一般约需1个月方全康复。

标签:

49. 确诊菌痢最可靠的依据是

- A. 典型脓血便
- B. 明显里急后重
- C. 大便培养阳性
- D. 免疫检查阳性
- E. 大便镜检发现大量脓细胞和吞噬细胞

答案:C

解析:大便培养检出痢菌即可确诊。

标签:

精华

简单

记忆

50. 下列哪项不属医院感染

- A. 无明显潜伏期的感染,在入院48小时后发生的感染
- B. 本次感染直接与上次住院有关
- C. 有明确潜伏期的感染,自入院时算起没有超过其平均潜伏期的感染
- D. 新生儿经产道时获得的感染
- E. 肿瘤患者住院化疗期间出现带状疱疹

答案:C

解析:下列情况属于医院感染:①无明显潜伏期的感染,规定在48小时后发生的感染为医院感染;有明确潜伏期者,则以自入院时起超过该平均(或常见)潜伏期的感染;②本次感染直接与上次住院有关;③在原有感染基础上出现其他部位新的感染(除外脓毒血症迁徙灶),或在原感染已知病原体基础上又分离出新的病原体(排除污染和原来的混合感染)的感染;④新生儿经产道时获得的感染;⑤由于诊疗措施激活的潜在性感染,如疱疹病毒、结核杆菌等的感染。

标签:

精华
简单
记忆

51. 有关隔离的描述，错误的是
- A. 是控制传染病流行的重要措施
 - B. 便于管理传染源
 - C. 可防止病原体向外扩散给他人
 - D. 根据传染病的平均传染期来确定隔离期限
 - E. 某些传染病患者解除隔离后尚应进行追踪观察

答案:D

解析:隔离的期限是根据传染病的 longest 传染期而确定，同时尚应根据临床表现和微生物检验结果来决定。

标签:

精华
简单
记忆

52. 《中华人民共和国中医药条例》明确对中医药发展的政策是国家

- A. 保护、支持、发展中医药事业
- B. 保护、扶持、发展中医药事业
- C. 保护、发展中医药事业
- D. 扶持、发展中医药事业
- E. 积极保护中医药事业

答案:B

解析:国家保护、扶持、发展中医药事业，实行中西医并重的方针，鼓励中西医相互学习、相互补充、共同提高，推动中医、西医两种医学体系的有机结合，全面发展我国中医药事业。

标签:

精华
简单
记忆

53. 以下哪一种情形可不注销执业医师注册

- A. 死亡的
- B. 被宣告失踪的
- C. 受民事处罚的
- D. 受吊销医师执业证书行政处罚的
- E. 中止医师执业活动满 2 年的

答案:C

解析:记实题。

标签:

简单

记忆

54. 《素问·阴阳应象大论》指出药食气味中“气厚”之品的性能是

- A. 宣散
- B. 通
- C. 发泄
- D. 发热
- E. 泄泻

答案:D

解析:《素问·阴阳应象大论》:“气薄则发泄,厚则发热。”气为阳,气薄为阳中之阴,有发汗解表作用,如麻黄、桂枝之属;气厚为阳中之阳,有助阳发热作用,如附子、干姜之属。

标签:

55. 《素问·阴阳应象大论》说:“壮火之气衰,少火之气壮”,其中“壮火”“少火”的本义是

- A. 药食气味纯阳与温和之别
- B. 人体阳气亢盛与平和之别
- C. 病理之火与生理之火的区别
- D. 邪火与正气之别
- E. 相火与君火之别

答案:A

解析:《素问·阴阳应象大论》:“壮火之气衰,少火之气壮”:药食气味纯阳之品,可使人体正气虚衰;药食气味温和之品,可使人体正气壮盛。气,指人体正气。药食气味纯阳者为壮火,药食气味温和者为少火。后世对《内经》这一含义有所发挥,将壮火、少火引申为人体的病理之火和生理之火。

标签:

56. 下述各种传染过程中,哪种感染类型增多会造成该疾病的传播流行

- A. 病原体被消灭或排出体外
- B. 病原携带状态
- C. 隐性感染
- D. 潜在性感染
- E. 显性感染

答案:B

解析:病原携带状态是指病原体进入人体后,在人体内生长繁殖并不断排出体外,成为重要的传染源,而人体不出现任何症状。由此可出现病毒的传播流行。

标签:

精华
简单
应用

57. 《素问·评热病论》中“劳风”的症状是

- A. 强上冥视，唾出若涕，恶风振寒
- B. 汗出烦满，烦满不为汗解，恶风
- C. 汗出辄复热，恶风
- D. 面足俱肿，恶风
- E. 全身浮肿，恶风，口干，溺黄

答案:A

解析：《素问·评热病论》：劳风法在肺下，其为病也，使人强上冥视，唾出若涕，恶风而振寒，此为劳风之病。（劳风的病因为因劳而虚，因虚而受风，邪气化热壅肺；病机为太阳受风，卫用郁遏，肺失清肃，痰热壅积。主要症状为恶风振寒，强上冥视，唾出若涕，甚则咳出青黄痰块。

标签：

58. 据《灵枢·决气》，血脱的主要表现是

- A. 色白，天然不泽
- B. 耳聋
- C. 目不明
- D. 腠理开，汗大泄
- E. 其脉空虚

答案:A

解析：《灵枢·决气》：“血脱者，色白，天然不泽。血主营养，脉为“血之府”，血脱则肌肤无以滋养，则皮肤淡白、枯槁无华；血液脱失，不能充盈脉管，则脉道空虚，治宜补血、生血，药如当归、白芍、熟地等。”

标签：

59. 原文“手足厥寒，脉细欲绝者，当归四逆汤主之。若其入内有久寒者”中的“内有久寒”是指

- A. 腹中素有寒湿
- B. 胸中素有寒饮
- C. 肝胃的陈寒痼疾
- D. 血虚寒凝日久
- E. 寒邪凝滞经脉

答案:C

解析：内有久寒即沉寒痼冷。指真阳不足，阴寒之邪久伏体内所致的病证。以昼夜恶寒、手足厥冷为主证。或腹痛泄泻、完谷不化；或呕恶清涎、饮食少进；或小便频数不禁、尿色清白；或腰腿沉重、如坐水中；或阳痿不举、精寒自出；或遍身关节拘急疼痛。治宜温阳散寒。一说痼冷治法“虽贵乎温

补，不贵乎太刚，惟于滋血养气中，佐以姜、桂、雄、附为愈”（宋·杨士瀛《仁斋直指方论》）

标签：

60. 战汗与气脱的区别是

- A. 倦卧不语
- B. 大汗出
- C. 肤冷
- D. 脉静
- E. 神清

答案:D

解析:但诊其脉，若虚软和缓，虽倦卧不语，汗出肤冷，却非脱证：若脉急疾，躁扰不卧，肤冷汗出，便为气脱之证矣。

标签：

61. 据原文，“少阴病，得之二三日以上，（），黄连阿胶汤主之。”填空项应为

- A. 心烦不得眠者
- B. 心中烦，不得卧
- C. 反发热，脉沉者
- D. 口中和，其背恶寒者
- E. 心烦腹满，卧起不安者

答案:B

解析：《伤寒论》：少阴病，得之二三日以上，心中烦，不得卧，黄连阿胶汤主之。

标签：

62. 已通过执业医师考试但未经注册取得执业证书的

- A. 不得从事医师执业活动
- B. 可在预防机构从事医师执业活动
- C. 可在保健机构从事医师执业活动
- D. 可在执业医师指导下，在预防、保健机构，从事医师执业活动
- E. 可在执业医师指导下从事医师执业活动

答案:A

解析：《中华人民共和国执业医师法》第十四条规定，医师经注册后，可以在医疗、预防、保健机构中按照注册的执业地点、执业类别、执业范围执业，从事相应的医疗、预防、保健业务。未经医师注册取得执业证书，不得从事医师执业活动。

标签：

简单
记忆

63. 对于素体阴虚的湿热病患者，以下表述不确切的是

- A. 须要顾其津液
- B. 清凉到十分之六七，往往热减身寒
- C. 慎投补剂，恐炉烟虽熄，灰中有火
- D. 常见面色苍
- E. 滋阴化湿是常法

答案:E

解析:面色苍者，须要顾其津液，清凉到十分之六七，往往热减身寒者，不可就云虚寒，而投补剂，恐炉烟虽熄，灰中有火也，须细察精详，方少少与之，慎不可直率而往也。（若素体阴虚而感受湿热邪气，出现面色苍白者，应以清热化湿兼顾津液，但亦不可过于寒凉。若用药后出现热减身寒者，不可误以为虚寒而随意投温补之剂，补则余火复炽，反而加重病情。

标签:

64. 流行性出血热早期休克的主要原因是

- A. 小血管通透性增加，血浆外渗，血容量锐减
- B. 播散性血管内凝血
- C. 心肌损害
- D. 肾功能不全，水、电解质平衡失调
- E. 肠道大出血或继发感染

答案:A

解析:早期休克是因全身小血管通透性增加，血浆外渗引起血容量下降引起。

标签:

精华

中等

应用

65. 乙型肝炎患者，其血化验中抗-HBc 抗体的出现，其意义是提示

- A. 患者系乙肝急性期，或慢性乙肝急性发作
- B. 是属于乙肝恢复期抗体，表示预后良好
- C. 提示病情恶化
- D. 表示过去已感染乙肝病毒的标志物
- E. 提示患者 2~56 因子重叠感染的指标

答案:A

解析:实记题。

标签:

精华

中等

应用

66. 叶天士《温热论》认为，温病在表夹风，在用辛凉轻剂的基础上，其治

法为

- A. 透风于热外
- B. 透湿于风外
- C. 渗湿于热下
- D. 透湿于热上
- E. 透风于湿外

答案:A

解析:在表初用辛凉轻剂。挟风则加入薄荷、牛蒡子之属,挟湿加芦根、滑石之流。或透风于热外,或渗湿于热下,不与热相搏,势必孤矣。

标签:

67. 关于营分证的治法, 以下哪项不恰当

- A. 撤去气药
- B. 急急透斑
- C. 透热转气
- D. 凉营清热
- E. 当用苦泄

答案:E

解析:营分受热, 则血液受劫, 心神不安, 夜甚无寐, 或斑点隐隐, 即撤去气药。如从风热陷入者, 用犀角、竹叶之属; 如从湿热陷入者, 犀角、花露之品, 参入凉血清热方中。若加烦躁, 大便不通, 金汁亦可加入, 老年或平素有寒者, 以人中黄代之, 急急透斑为要。(入营犹可透热转气, 如犀角、玄参、羚羊角等物。

标签:

68. HIV 感染的细胞不包括下列哪项

- A. 单核巨噬细胞
- B. 神经元细胞
- C. 骨髓干细胞
- D. B 细胞
- E. CD4⁺T 淋巴细胞

答案:B

解析:解析: HIV 主要感染 CD4⁺T 淋巴细胞, 也能感染单核巨噬细胞亚群、B 细胞、小神经胶质细胞及骨髓干细胞。故 B 错误。

标签:

中等

记忆

69. 关于病原体在传染过程中的作用, 下列哪项是错误的

- A. 在同一传染病中, 入侵病原体的数量一般与致病力成正比
- B. 在同一传染病中, 入侵病原体的数量一般与潜伏期成正比

- C. 病原体的毒力与致病力成正比
- D. 病原体的侵袭力与致病力成正比
- E. 在不同传染病中，能引起疾病发生的最低病原体数量相差很大

答案:B

解析:考查病原体在传染过程中的作用。

标签:

精华

中等

记忆

70. 病原体侵入人体后，引起机体发生免疫应答，同时通过病原体本身的作用或机体的变态反应，导致组织损伤，引起病理改变与临床表现，此种情况是

- A. 隐性感染
- B. 显性感染
- C. 重复感染
- D. 潜伏感染
- E. 机会性感染

答案:B

解析:显性感染又称临床感染，是指病原体侵入人体后，不但引起机体发生免疫应答，还导致组织损伤，引起病理改变和临床表现。

标签:

精华

简单

记忆

71. 患者，男，59岁。劳累及情绪激动后，多次出现短时间胸骨后疼痛，下列哪项血清检查对明确诊断最有参考意义

- A. 钾
- B. 钠
- C. 氯化物
- D. 钙
- E. 胆固醇及甘油三酯

答案:E

解析:血脂是人体中一种重要物质，有许多非常重要的功能，但是不可超过一定的范围。如果血脂过多，容易造成“血稠”，在血管壁上沉积，逐渐形成小斑块，这就是人们常说的动脉粥样硬化。这些斑块增多、增大，逐渐堵塞血管，使血流变慢，严重时血流可中断。这种情况如果发生在心脏，就易引起冠心病。

标签:

精华
中等
应用

72. 患者，男性，30 岁。因发热、乏力、恶心、食欲减退 10 天来诊。查体：皮肤、巩膜黄染，肝右肋下 1cm，脾左肋下可及。WBC 5.0×10^9 /L，NO.48，LO.50，Hb130g/L，血清总胆红素 $102 \mu\text{mol} / \text{L}$ ，直接胆红素 $70.4 \mu\text{mol} / \text{L}$ ，ALT1320U/L，ALP102U/L。最可能的诊断是

- A. 淤胆型肝炎
- B. 伤寒
- C. 急性黄疸型肝炎
- D. 急性重型肝炎
- E. 慢性肝炎

答案:C

解析:发病 10 天，在急性期内，故可除外慢性肝炎的诊断，血清总胆红素 $102 \mu\text{mol} / \text{L}$ ，结合胆红素 $70.4 \mu\text{mol} / \text{L}$ ，ALT1320U/L，均显著升高提示为黄疸性肝炎。由于 ALP102U/L 正常，故可除外淤胆型肝炎的诊断。

标签:

精华
中等
应用

73. 患者，男性，45 岁，北京某医院呼吸科医生。2003 年 4 月初在救治不明原因肺炎患者 4 日后出现发热，体温 38.8°C ，周身酸痛，实验室检查血 WBC 4.5×10^9 /L，胸片示两肺无明显异常。最适合的诊断是

- A. SARS 疑似病例
- B. SARS 临床诊断病例
- C. SARS 医学观察病例
- D. SARS 确定诊断病例
- E. 上呼吸道感染

答案:A

解析:分析本题的主要临床表现及实验室检查，对于有流行病学依据，有临床症状，但尚无肺部 X 线影像学变化者，也应作为疑似病例。对此类病例，需动态复查 X 线胸片或胸部 CT，一旦肺部病变出现，在排除其他疾病的前提下，可以作出临床诊断。

标签:

中等
应用

74. 患者，男，28 岁，3 个月前患急性菌痢，后因劳累及饮食不当反复发作性腹泻，大便为黏液便，诊断应首先考虑

- A. 急性细菌性痢疾
- B. 急性阿米巴痢疾
- C. 霍乱
- D. 慢性细菌性痢疾
- E. 肠炎

答案:D

解析:有急性菌痢史,病程超过 2 个月,反复发作腹泻及黏液便,考虑为慢性细菌性痢疾。

标签:

精华

简单

应用

75. 患者,男,56岁。乙肝病史6年,呕血1天。检查:腹壁静脉曲张,肝肋下未触及,脾肋下3cm,腹水征(+). HBsAg(+),白蛋白降低, A/G<1,丙氨酸转氨酶升高。其诊断为

- A. 慢性肝炎
- B. 肝硬化合并上消化道出血
- C. 消化性溃疡合并上消化道出血
- D. 白血病
- E. 原发性肝癌

答案:B

解析:肝硬化诊断依据:①病毒性肝炎、长期饮酒病史;②肝功能减退和门静脉高压症的临床表现;③肝脏质地坚硬有结节感;④肝功能实验阳性;⑤肝活检有假小叶形成并发症,如上消化道出血、肝性脑病、感染、肝肾综合征、原发性肝癌、电解质和酸碱平衡紊乱等。

标签:

精华

中等

应用

76. 患者,女,66岁。今日胸痛发作频繁,2小时前胸痛再次发作,含化硝酸甘油不能缓解。检查:血压90/60mmHg,心律不齐。心电图II、III、aVF导联ST段抬高呈弓背向上的单向曲线。应首先考虑的是

- A. 心绞痛
- B. 急性心包炎
- C. 急性前间壁心肌梗死
- D. 急性下壁心肌梗死
- E. 急性广泛前壁心肌梗死

答案:D

解析:急性下壁心肌梗死的症状。

标签:

与专业和章节不符

精华

77. 患者,男,40岁,腹泻1日,大便大量水样便,继之呕吐10多次,口渴,尿少。体检:眼窝下陷,声音哑,BP60/30mmHg(8.0/4.0kPa),脉弱,最重要的确诊方法是

- A. 测血浆比重及红细胞容积
- B. 大便及呕吐物培养
- C. 大便悬滴动力学试验
- D. 血清凝集试验
- E. 结肠镜检查

答案:B

解析:夏季发病,严重泻、吐及严重脱水,应高度怀疑为霍乱,确诊需做大便及呕吐物的细菌培养。

标签:

精华

简单

应用

78. 一患儿以肠梗阻入院手术,术中医师将膀胱认作囊肿切除,造成患儿排尿功能严重受损。该事件中,医师的行为属

- A. 意外事件
- B. 术中并发症
- C. 直接故意
- D. 间接故意
- E. 过失

答案:E

解析:实记题。

标签:

精华

简单

记忆

79. 患者甲输液中发生反应,经对症处置,症状消失,当天夜里出现心悸,呼吸困难,晨5时死亡。家属认为是医院的责任,拒不从病房移走尸体。第2天上午上班,院方决定做尸检请法医魏某做。下午魏某告知院方因紧急会议不能去做,家属也不同意尸检,第3天又请到法医李某,经与家属协商,第4天进行了尸检,李某未能对死因做出解释。使纠纷无法结论,对这一结果

- A. 只能以死因不明定论
- B. 魏某承担因拖延而延迟尸检，无法结论的责任
- C. 李某承担因未做出解释而无法结论的责任
- D. 院方承担因请人不当而无法结论的责任
- E. 家属承担因不同意尸检延迟尸检而无法结论的责任

答案:E

解析:实记题。

标签:

精华

简单

应用

80. 患者患胆管癌，术中术者用手指钝性剥离胆总管而撕破静脉急性大出血，慌乱中用钳夹止血，造成静脉完全离断，虽经吻合，患者终因急性肝功能衰竭而死亡。产生的后果属于

- A. 医疗意外
- B. 医疗差错
- C. 病情重笃而发生的难以避免的死亡
- D. 医疗事故
- E. 手术难以避免的并发症

答案:D

解析:实记题。

标签:

简单

记忆

81. 患者，女，43岁。黄带质稠味秽，外阴痒甚，伴少腹胀痛。舌质红，苔黄腻，脉弦滑。临床最佳辨证是

- A. 葛根芩连汤证
- B. 白头翁汤证
- C. 茵陈蒿汤证
- D. 栀子柏皮汤证
- E. 黄连汤证

答案:B

解析:根据题干可辨证为白头翁汤证(白头翁汤:(症:发热,口渴欲饮水,下痢脓血,腹痛,里急后重,肛门灼热,小便短赤,舌红苔黄,脉滑数。(理:厥阴肝经湿热下迫大肠。(法:清热凉肝,凉血解毒。(方:白头翁汤。(药:白头翁汤由白头翁、黄连、黄柏、秦皮四味药组成。方中白头翁清热凉肝,凉血解毒,黄连、黄柏清热解毒,苦寒坚阴止利,秦皮清热解毒,涩肠止利。全方共奏清热燥湿,凉血解毒之功。

标签:

82. 患者，男，50 岁。患阿米巴痢疾达 15 年之久，每次发作均见腹胀，纳差，食后胀甚，里急后重，排黏液性血便，伴见低热、心烦，口干欲饮。舌质红，苔黄略腻，脉濡数。临床最佳辨证是

- A. 葛根芩连汤证
- B. 黄芩汤证
- C. 白头翁汤证
- D. 乌梅丸证
- E. 芍药汤证

答案:C

解析:根据题干可判断为白头翁汤症(白头翁汤:症:发热,口渴欲饮水,下痢脓血,腹痛,里急后重,肛门灼热,小便短赤,舌红苔黄,脉滑数。(理:厥阴肝经湿热下迫大肠。(法:清热凉肝,凉血解毒。(方:白头翁汤。(药:白头翁汤由白头翁、黄连、黄柏、秦皮四味药组成。方中白头翁清热凉肝,凉血解毒,黄连、黄柏清热解毒,苦寒坚阴止利,秦皮清热解毒,涩肠止利。全方共奏清热燥湿,凉血解毒之功。

标签:

83. 男性患者,66 岁,原发性高血压病史 20 余年,高血压性心脏病伴心功能不全,心电图示二度房室传导阻滞,双肺底可闻及小水泡音,不能应用的降压药物是

- A. 氢氯噻嗪
- B. 硝苯地平
- C. 卡托普利
- D. 哌唑嗪
- E. 美托洛尔

答案:E

解析:原发性高血压病史 20 余年,高血压性心脏病伴心功能不全,心电图示二度房室传导阻滞,此时不能应用 β -受体阻滞剂,故本题选 E 美托洛尔。

标签:

84. 女性患者,29 岁,风湿热病史 7 年,现呼吸困难、咳嗽、咳痰、咯血,查体心尖部闻及舒张中晚期杂音,心电图显示左房增大,该患者的诊断是

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 主动脉瓣狭窄
- C. 二尖瓣关闭不全
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 联合瓣膜病变

答案:A

解析:心尖区舒张中晚期隆隆样杂音是二尖瓣狭窄的特征性杂音。

标签:

85. 患者因心悸、眩晕、晕厥急诊，心电图检查显示三度房室传导阻滞，听诊可出现的异常表现是

- A. 第二心音增强
- B. 第二心音减弱
- C. 第三心音
- D. 第四心音
- E. 大炮音

答案:E

解析:三度房室传导阻滞常有疲倦、乏力、眩晕、晕厥等，可反复诱发心绞痛、心力衰竭等，严重时可发生阿-斯综合征。听诊第一心音强度不等，第二心音可呈正常或反常分裂；间或听到心房音或响亮的第二心音，为心房、心室几乎同时收缩所致，称为“大炮音”。

标签:

86. 某女，35岁。餐后突起上腹束带状持续性疼痛，呕吐8小时。查体:脉搏116次/分，收缩压68mmHg。上腹有压痛，肠鸣音无明显异常。血WBC $14 \times 10^9/L$ ，血淀粉酶510U/L(苏氏法)。最可能的诊断是

- A. 溃疡病穿孔
- B. 急性胰腺炎
- C. 胆囊结石
- D. 急性胃炎
- E. 急性胆囊炎

答案:B

解析:根据症状及实验室检查可初步推断为急性胰腺炎(确诊AP应具备下列3条中的任意2条:①急性、持续性中上腹痛;②血淀粉酶或脂肪酶超过正常值上限3倍;③急性胰腺炎的典型影像学改变。

标签:

87. 患者慢性肝炎病史6年，近1个月来病情恶化，为早期诊断肝硬化，最有价值的检查是

- A. 肝活检
- B. B超检查
- C. AFP检查
- D. X线检查
- E. 放射性核素检查

答案:A

解析:肝活组织检查见假小叶形成是诊断肝硬化的金标准。

标签:

88. 男性患者，50岁，1个月来上腹胀满不适，餐后加重，明显反酸、恶心、

呕吐，查体：腹部可见蠕动波，触之有震水音，可能的诊断是

- A. 十二指肠球部溃疡并幽门梗阻
- B. 胃体溃疡并幽门梗阻
- C. 慢性胃体炎并幽门梗阻
- D. 慢性胃炎并幽门梗阻
- E. 胃角溃疡并幽门梗阻

答案：B

解析：根据餐后加重等症状可判断为胃体溃疡并幽门梗阻。

标签：

89. 男性，26岁。明显的“三多一少”症状10年，经胰岛素治疗，症状时轻时重，有明显的低血糖症状，近2个月眼睑及下肢水肿，乏力，腰痛，BP160/100mmHg，尿蛋白(++)，颗粒管型少许，尿糖(++)。应诊断为

- A. 糖尿病肾病
- B. 肾盂肾炎
- C. 肾动脉硬化
- D. 肾炎
- E. 胰岛素副作用

答案：A

解析：诊断糖尿病肾病的指标：早期肾病，出现微量白蛋白尿，即AER持续在20~200ug/min。临床肾病，尿蛋白逐渐增多，AER大于200ug/min，即尿蛋白排出量大于300mg/24h和，相当于尿蛋白总量大于0.5g/24h和，肾小球滤过率下降，可伴有浮肿和高血压，肾功能逐渐减退，尿毒症期，多数肾单位闭锁，AER降低，血肌酐和尿素氮升高，血压升高。

标签：

90. 女性患者，56岁，身高155cm，体重55kg，体检发现空腹血糖6.4mmol/L，做口服葡萄糖耐量试验，空腹血糖6.6mmol/L，餐后2小时血糖8.4mmol/L，正确的是

- A. 可诊断糖尿病
- B. 应重复口服葡萄糖耐量试验
- C. 可排除糖尿病
- D. 空腹血糖过高
- E. 糖耐量降低

答案：E

解析：糖耐量受损：餐后2h血糖7.8~11.0mmol/L和（或）空腹血糖受损6.1~6.9mmol/L；

标签：

91. 女性患者，25岁，因甲状腺肿大就诊，检查甲状腺III度肿大，触之坚硬并有触痛，无震颤，¹³¹I吸收率下降，最可能的诊断是

- A. 甲状腺癌
- B. 亚急性甲状腺炎
- C. 甲状腺功能亢进症
- D. 甲状腺囊肿
- E. 慢性甲状腺炎

答案:B

解析:亚急性甲状腺炎发病与病毒感染有关。多有发热,短期内甲状腺肿大,触之坚硬而疼痛。白细胞正常或升高,血沉增高,摄¹³¹I率下降,TGAb、TPOAb正常或轻度升高。

标签:

92. 患者,女性,18岁。发热1个月,近1周出现面颊对称性红斑、手指关节肿痛。实验室检查:血红蛋白90g/L,白细胞 $3.0 \times 10^9/L$,尿蛋白(+++),抗dsDNA抗体阳性。应首先考虑诊断

- A. 缺铁性贫血
- B. 慢性肾炎
- C. 类风湿关节炎
- D. 系统性红斑狼疮
- E. 风湿热

答案:D

解析:根据面部红斑等症状及实验室检查可初步判断为SLE。

标签:

93. 女性患者,19岁。弛张热7天,2天来两面颊部出现对称性、水肿性红斑,指端及甲周有红斑。血常规:血红蛋白90g/L,白细胞 $3.4 \times 10^9/L$ 。尿常规:蛋白(+++),管型0~2个/HP。ANA(+). 首选的治疗是

- A. 环孢素
- B. 泼尼松
- C. 血浆置换
- D. 环磷酰胺
- E. 阿司匹林

答案:B

解析:根据症状及实验室检查可诊断为SLE,糖皮质激素为治疗SLE的基础药物。故首选B 泼尼松。

标签:

94. 患者,女,47岁,既往健康,晨练时突然出现剧烈头痛伴喷射性呕吐,拟诊为蛛网膜下腔出血,尽快确诊应首选的检查是

- A. 脑血流图
- B. 脑脊液检查
- C. 脑血管造影

D. 出凝血项目检测

E. 免疫学检查

答案:B

解析:脑脊液检查:脑脊液在起病 12 小时后呈特征性改变,为均匀血性,压力增高,离心后呈淡黄色。

标签:

95. 李某,男,46 岁。糖尿病史多年,仰头时突然下肢无力而跌倒,伴视物不清,休息 30 分钟后恢复,首先应考虑下述哪种疾病

A. 间歇性跛行

B. 周期性麻痹

C. 短暂性脑缺血发作

D. 缺血性脑卒中

E. 重症肌无力

答案:C

解析:中老年患者突然出现一过性局限性神经功能缺失的症状和体征,持续时间短暂,24 小时内症状和体征消失,急诊 CT 或 MRI 检查未发现与症状相关的病灶,即可诊断 TIA。

标签:

96. 患者,女,73 岁,高血压病史 20 余年,进餐时与家人争吵,随后突然剧烈头痛、头晕、呕吐,继之出现“三偏征”就诊,诊断为脑出血,应进行降压治疗的血压水平是

A. $\geq 130/80\text{mmHg}$

B. $\geq 140/90\text{mmHg}$

C. $\geq 160/95\text{mmHg}$

D. $\geq 180/100\text{mmHg}$

E. $\geq 200/110\text{mmHg}$

答案:E

解析:如血压显著升高 ($\geq 200/110\text{mmHg}$),在降颅压同时可慎重平稳降血压治疗。

标签:

97. 患者,男,66 岁,情绪激动后突然剧烈头痛、头晕、呕吐,随之出现“三偏征”伴瞳孔缩小、光反射消失,诊断为脑出血,其最可能的出血部位是

A. 壳核出血

B. 丘脑出血

C. 脑桥出血

D. 小脑出血

E. 脑叶出血

答案:B

解析:丘脑出血(内囊内侧型):“三偏”征,以感觉障碍明显。上、下肢瘫痪程度基本均等;眼球上视障碍,可凝视鼻尖,瞳孔缩小,光反射消失。

标签:

A3/A4 型选择题

(98-1~98-3 题共用题干)

男性,64岁。有肺源性心脏病史5年,经常头痛、头晕,1周来咳嗽加重,咳黄痰,呼吸困难,头痛加重,昨日起嗜睡,谵语。查体:神志不清,颜面水肿,球结膜水肿,口唇发绀,颈静脉充盈,双肺广泛干、湿啰音,肝肋下4cm,腹水征(+),下肢水肿,膝反射减弱,巴宾斯基征(+)。pH7.20, PaCO₂100mmHg, PaO₂40mmHg, HCO₃⁻23mmol/L, BE-8mmol/L。

98. 该患者神志不清,最可能是由于发生了

- A. 高血压脑病
- B. 脑梗死
- C. 肺性脑病
- D. 感染中毒性脑病
- E. 以上都不是

答案:C

解析:根据题干可判断为肺性脑病。肺性脑病是指由于严重缺氧及高碳酸血症导致中枢神经系统功能障碍,出现意识模糊、谵妄甚至昏迷等系列精神神经症状的临床综合征。

标签:

99. 患者发生了哪一类型的酸碱平衡失调

- A. 失代偿性呼吸性酸中毒
- B. 代偿性呼吸性酸中毒
- C. 呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒
- D. 代谢性酸中毒
- E. 呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒

答案:C

解析:根据 pH7.20, PaCO₂100mmHg, PaO₂40mmHg, HCO₃⁻23mmol/L, BE-8mmol/L 可判断发生了呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒。

标签:

100. 该患者立即应采取的治疗措施是

- A. 选用有效抗生素
- B. 改善通气和低流量吸氧
- C. 使用呼吸兴奋剂
- D. 使用降压药
- E. 甘露醇静脉滴注

答案:B

解析:改善呼吸功能,纠正呼吸衰竭 采取综合措施,包括缓解支气管痉挛、清除痰液、通畅呼吸道、持续低浓度给氧、应用呼吸中枢兴奋剂等。必要时施行机械通气。

标签:

(101-1~101-3 题共用题干)

一患慢性肾炎 5 年的患者,长期低盐、低蛋白饮食,乏力、恶心、呕吐 20 天,血压 140/100mmHg,无水肿,血红蛋白 60g/L,尿蛋白(+),颗粒管型 0~3 个/HP,血白蛋白 30g/L,球蛋白 25g/L,血尿素氮 20mmol/L,血肌酐 1220umol/L,血钠 125mmol/L。

101. 此患者首先采取哪项治疗饮食

- A. 蛋白饮食 1g/(kg•d),多给动物蛋白,不限盐
- B. 蛋白饮食 0.6g/(kg•d),以动物蛋白为主,限盐
- C. 蛋白饮食 0.3g/(kg•d),以植物蛋白为主,不限盐
- D. 高蛋白饮食,以植物蛋白为主,限盐
- E. 高蛋白饮食,不限盐

答案:B

解析:考虑患者为慢性肾小球肾炎、慢性肾功能不全、尿毒症、肾性贫血、肾性高血压、低蛋白血症,故应选用严格限制蛋白质摄入量,每日 0.6~0.8g/kg;碳水化合物与脂肪热量之比约为 3:1。如热量不足可增加蔗糖、麦芽糖与葡萄糖的摄入。饮食应确保低磷、适当的钙。每日补充维生素以 B、C、E 及叶酸。微量元素以铁、锌为主,避免摄入铝。

标签:

102. 同时首先选择下列哪项治疗

- A. 降血压
- B. 呋塞米 100mg,每日 1 次静注
- C. 补充血浆、红细胞
- D. 透析治疗
- E. 0.85%氯化钠注射液 500ml 静点

答案:D

解析:考虑患者为慢性肾小球肾炎、慢性肾功能不全、尿毒症、肾性贫血、肾性高血压、低蛋白血症,故可首先选择透析进行治疗。

标签:

103. 患者出现贫血的主要原因是

- A. 失血
- B. 缺铁
- C. 低蛋白血症
- D. 红细胞生存时间缩短
- E. 促红细胞生成因子分泌减少

答案:E

解析:肾性贫血的原因是促红细胞生成素分泌减少。

标签:

B1 型选择题

(104-1~104-2 题共用备选答案)

- A. 急性发热
- B. 黄疸
- C. 呕吐
- D. 腹泻
- E. 血便

104. 肠梗阻可见腹痛, 并伴有

答案:C

解析:腹痛、呕吐、腹胀、便秘和停止排气是肠梗阻的典型症状。

标签:

精华

简单

应用

105. 肠套叠可见腹痛, 并伴有

答案:E

解析:腹痛、血便、腹部肿块是肠套叠的典型症状。

标签:

精华

简单

记忆

(106-1~106-2 题共用备选答案)

- A. 肾功能正常
- B. 肾衰竭代偿期
- C. 肾衰竭失代偿期
- D. 肾衰竭期
- E. 肾衰竭终末期

106. 当Ccr为51~80ml/min时, 肾功能的分期是()

答案:B

解析:根据Ccr一般可将肾功能分为4期:①肾衰竭代偿期:Ccr51~80mL/min。②肾衰竭失代偿期:Ccr50~20mL/min。③肾衰竭期(尿毒症早期):Ccr19~10mL/min。④肾衰竭终末期(尿毒症晚期):Ccr<10mL/min。

标签:

与专业和章节不符

107. 当 Ccr 为 50~20ml/min 时, 肾功能的分期是()

答案:C

解析: 根据 Ccr 一般可将肾功能分为 4 期: ① 肾衰竭代偿期: Ccr51~80ml/min。② 肾衰竭失代偿期: Ccr50~20ml/min。③ 肾衰竭期 (尿毒症早期): Ccr19~10ml/min。④ 肾衰竭终末期 (尿毒症晚期): Ccr < 10ml/min。

标签:

与专业和章节不符

(108-1~108-2 题共用备选答案)

- A. 剧烈头痛伴喷射性呕吐
- B. 大量呕吐隔夜食物
- C. 呕吐伴腹痛及肛门停止排便、排气
- D. 呕吐伴眩晕
- E. 呕吐伴上腹痛

108. 颅内高压可见

答案:A

解析: 颅内高压可见剧烈头痛伴喷射性呕吐

标签:

简单

应用

109. 前庭障碍可见

答案:D

解析: 前庭障碍性呕吐常伴有眩晕, 见于迷路炎、梅尼埃病、晕动病。

标签:

简单

应用

(110-1~110-2 题共用备选答案)

- A. 肺实变
- B. 肺气肿
- C. 肺不张
- D. 气胸
- E. 支气管哮喘

110. 病侧呼吸活动度减弱伴叩诊为浊音, 呼吸音消失者, 见于

答案:C

解析: 阻塞性肺不张 (1) 望诊 患侧胸廓下陷, 肋间隙变窄, 呼吸动度减弱或消失。(2) 触诊 气管移向患侧, 语颤减弱或消失。(3) 叩诊 患侧呈浊音或实音。(4) 听诊 呼吸音消失, 听觉语音减弱或消失。

标签:

精华
简单
记忆

111. 病侧呼吸活动度减弱伴叩诊为鼓音，呼吸音消失者，见于

答案:D

解析:气胸 ((1) 望诊 患侧胸廓饱满，肋间隙增宽，呼吸动度减弱或消失。
((2) 触诊 气管移向对侧，患侧语音震颤减弱或消失。 ((3) 叩诊 患侧呈鼓音。左侧气胸时，心界叩不出；右侧气胸时，肝浊音界下移。 ((4) 听诊 患侧呼吸音减弱或消失。

标签:

精华
简单
记忆

(112-1~112-2 题共用备选答案)

- A. 短暂性脑缺血发作
- B. 蛛网膜下腔出血
- C. 冠心病
- D. 心肌病
- E. 脑出血

112. 高血压病累及心脏多见的是

答案:C

解析:高血压病累及心脏多见冠心病。

标签:

113. 高血压病累及脑最常见的是

答案:E

解析:高血压病累及脑最常见的是脑出血。

标签:

(114-1~114-2 题共用备选答案)

- A. 洋地黄
- B. β 受体阻滞剂
- C. 血管紧张素转换酶抑制剂
- D. 血管紧张素 II 受体拮抗剂
- E. 利尿剂

114. 减少心力衰竭患者病情反复，降低猝死率的药物是

答案:B

解析: β 受体阻滞剂可对抗交感神经激活，阻断心肌重塑，长期应用达到延缓病情进展、减少复发和降低猝死的治疗目的。

标签:

115. 明显改善心力衰竭患者临床症状，减少住院率的药物是

答案:A

解析:洋地黄类药物:可明显改善症状,减少住院率,提高运动耐量,增加心排血量。

标签:

(116-1~116-2 题共用备选答案)

- A. 粒细胞显著减少
- B. 红细胞大小不等、中心淡染
- C. 异型淋巴细胞增多
- D. 原始粒细胞增多
- E. 幼稚淋巴细胞增多

116. 白细胞减少症血液一般检查的特点是,

答案:A

解析:白细胞减少症血液一般检查:白细胞数一般为 $(2\sim 4)\times 10^9/L$,中性粒细胞百分比正常或轻度减低,淋巴细胞相对增多;粒细胞可有核左移或右移,胞浆有毒性颗粒、空泡等变性。红细胞及血小板大致正常。

标签:

117. 缺铁性贫血血液一般检查的特点是

答案:B

解析:缺铁性贫血典型表现为小细胞低色素性贫血。MCV $< 80f1$,MCHC $< 32\%$ 。成熟红细胞苍白区扩大,大小不一。白细胞和血小板计数一般正常或轻度减少。

标签:

(118-1~118-2 题共用备选答案)

- A. 病原体被清除
- B. 隐性感染
- C. 显性感染
- D. 病原携带状态
- E. 潜伏性感染

118. 感染过程的表现中最易识别的是

答案:C

解析:

标签:

简单

记忆

119. 感染过程中最常见的表现是

答案:B

解析:略

标签:

简单

记忆

(120-1~120-2 题共用备选答案)

A. 抗-HAVIgG

B. 抗-HEV

C. 抗-HCV

D. 抗-HAVIgM

E. HCVRNA

120. 甲型肝炎近期感染的标志是

答案:D

解析:甲肝近期感染的指标为抗-HAVIgM, 而抗-HAVIgG 表示为既往感染, 因为抗-HAVIgG 可以长期存在。

标签:

精华

中等

记忆

121. 丙型肝炎的确诊指标是

答案:E

解析:丙型肝炎的确诊需要依靠 HCVRNA, 而抗-HCV 在病毒清除后可长期存在, 且在一些免疫性疾病中也会有阳性。

标签:

精华

中等

记忆

(122-1~122-3 题共用备选答案)

A. 全身单核巨噬细胞系统增生性反应

B. 正常肠黏膜上有孤立小脓肿及溃疡

C. 肠黏膜急性弥漫性渗出性炎症

D. 肠黏膜弥漫水肿及肠壁增厚

E. 小肠黏膜充血肿胀、松弛, 表面有灰白糠皮状薄膜

122. 急性菌痢病变特点为

答案:C

解析:急性菌痢病变特点是急性弥漫性渗出性炎症。

标签:

简单

记忆

123. 霍乱病变特点为

答案:E

解析:霍乱病变特点是小肠黏膜充血、肿胀、松弛,表面有灰白糠皮状白膜。

标签:

简单

记忆

(124-1~124-2 题共用备选答案)

- A. 桂枝汤
- B. 桂枝加葛根汤
- C. 葛根汤
- D. 麻黄汤
- E. 小青龙汤

124. 太阳病,项背强几几,无汗恶风,治疗宜用

答案:C

解析:《伤寒论》:“太阳病,项背强几几,无汗,恶风,葛根汤主之。”

标签:

125. 太阳病,头痛,发热,身疼,腰痛,骨节疼痛,无汗而喘,脉浮紧,治疗宜用

答案:D

解析:《伤寒论》:太阳病,头痛发热,身疼腰痛,骨节疼痛,恶风,无汗而喘者,麻黄汤主之。

标签:

(126-1~126-2 题共用备选答案)

- A. 大黄、黄芩、黄连、半夏、干姜、人参、大枣、炙甘草
- B. 大黄、黄芩、黄连、半夏、生姜、人参、大枣、炙甘草
- C. 黄芩、黄连、半夏、干姜、生姜、人参、大枣、炙甘草
- D. 黄芩、黄连、半夏、干姜、大枣、炙甘草、人参
- E. 黄芩、黄连、半夏、生姜、大枣、炙甘草

126. 生姜泻心汤的药物组成是

答案:C

解析:生姜泻心汤:症:心下痞硬,干噎食臭,腹中雷鸣,下利。舌苔厚腻。(理:寒热错杂,水食停滞。(法:辛开苦泄,消食和中,散水消痞。(方:生姜泻心汤。(药:生姜泻心汤由生姜、半夏、黄连、黄芩、干姜、大枣、人参、炙甘草组成。方中生姜四两为君,宣散水气,和胃降逆;半夏降逆止呕开结,干姜温中散寒;黄连、黄芩泄热消痞;大枣、人参、炙甘草补益脾胃。本方在半夏泻心汤基础上加生姜四两为君,减干姜为一两,重在宣散水气,和胃降逆。

标签:

127. 半夏泻心汤的药物组成是

答案:D

解析:组成:半夏半升 黄芩 干姜 人参各三两 黄连一两 大枣十二枚 炙甘草三两 (功用:寒热平调,散结除痞。(主治:寒热错杂之痞证。心下痞,但满而不痛,或呕吐,肠鸣下利,舌苔腻而微黄。(配伍意义:此方所治原系小柴胡汤证误行泻下,损伤中阳,少阳邪热乘虚内陷,以致寒热错杂之心下痞证。

标签:

(128-1~128-4 题共用备选答案)

- A. 脉浮,骨节疼痛,恶风
- B. 脉浮,跗肿,其腹如鼓
- C. 脉沉迟,喘息
- D. 脉沉,腹满
- E. 脉沉迟,发热,胸满,四肢头面肿

128. 风水的临床表现为

答案:A

解析:风水,关之于肺。因风邪袭表,肺主皮毛,卫外不固,故脉浮恶风;肺失宣降,水湿停滞,流注于关节,故骨节疼痛。

标签:

129. 皮水的临床表现为

答案:B

解析:皮水,关之肺脾,此时正虚为主不兼风邪,因肺气虚失于通调水道,脾气虚运化失司,故水湿内停,泛滥肌肤则一身浮肿,腹胀如鼓,不口渴,水停仍于上中焦,故应因势利导,发汗为宜。

标签:

130. 正水的临床表现为

答案:C

解析:正水,关乎于肾,肾阳虚不能蒸化水湿,故水湿停滞,泛滥肌肤则浮肿;水湿上逆犯肺则喘;肾阳虚弱,失于温养,则可表现为腰膝酸冷,脉迟。

标签:

131. 石水的临床表现为

答案:D

解析:石水,是皮水进一步加重所致,其病机为肾阳衰微,水湿不能蒸化,凝聚下焦,则(小腹结满,小便不利,腰膝酸冷;不能上逆于肺,则不喘。

标签:

(132-1~132-2 题共用备选答案)

- A. 汗出肤冷,倦卧不语,脉虚和缓
- B. 肤冷汗出,躁扰不卧,脉弦而数
- C. 肤冷汗出,躁扰不卧,脉象急数

- D. 肤冷汗出，躁扰不卧，脉虚而缓
E. 汗出肤冷，倦卧不语，脉象细数

132. 战汗后邪退气虚正安的主要表现为

答案:A

解析:但诊其脉，若虚软和缓，虽倦卧不语，汗出肤冷，却非脱证：若脉急疾，躁扰不卧，肤冷汗出，便为气脱之证矣。更有邪盛正虚，不能一战而解，停一二日再战汗而愈者，不可不知。

标签:

133. 战汗后气脱的主要表现为

答案:C

解析:但诊其脉，若虚软和缓，虽倦卧不语，汗出肤冷，却非脱证：若脉急疾，躁扰不卧，肤冷汗出，便为气脱之证矣。更有邪盛正虚，不能一战而解，停一二日再战汗而愈者，不可不知。

标签:

(134-1~134-3 题共用备选答案)

- A. 二尖瓣关闭不全
B. 主动脉瓣关闭不全
C. 纤维蛋白性心包炎
D. 左侧胸膜炎
E. 二尖瓣狭窄

134. 查体发现胸骨左缘第 3、4 肋间听到屏气后仍存在的摩擦音的是()

答案:C

解析:纤维蛋白性心包炎可于胸骨左缘第 3、4 肋间听到屏气后仍存在的摩擦音。

标签:

与专业和章节不符

135. 查体发现心尖部听到隆隆样舒张中晚期杂音的是()

答案:E

解析:二尖瓣狭窄可于心尖部听到隆隆样舒张中晚期杂音。

标签:

与专业和章节不符

(136-1~136-2 题共用备选答案)

- A. 麻黄汤
B. 桂枝汤
C. 三仁汤
D. 枳实导滞汤
E. 黄芩滑石汤

136. 湿温病，症见“脉缓身痛，舌淡黄而滑，渴不多饮，或竟不渴，汗出热

解，继而复热”者，以何方主治

答案:E

解析:黄芩滑石汤，出自《温病条辨》卷二。主治脉缓身痛，舌淡黄而滑，渴不多饮，或竟不渴，汗出热解，继而复热，内不能运水谷之湿，外复感时令之湿。

标签:

137. 湿温病，症见“头痛恶寒，身重疼痛，舌白不渴，脉弦细而濡，面色淡黄，胸闷不饥，午后身热，状若阴虚，病难速已”者，以何方主治

答案:C

解析:头痛恶寒，身重疼痛，舌白不渴，脉弦细而濡，面色淡黄，胸闷不饥，午后身热，（状若阴虚，病难速已，名曰湿温。汗之则神昏耳聋，甚则目瞑不欲言；下之则洞泄；润之则病深不解。长夏深秋冬日同法，三仁汤主之。

标签:

（138-1~138-2 题共用备选答案）

- A. 淀粉酶
- B. 血清转氨酶
- C. 谷氨酰基转肽酶
- D. 血清碱性磷酸酶
- E. 肌酸磷酸激酶

138. 对诊断骨质疏松最有意义的是

答案:D

解析:实记题。

标签:

简单

记忆

139. 对诊断心肌梗死最有意义的是

答案:E

解析:淀粉酶提示急性胰腺炎。血清转氨酶、谷氨酰基转肽酶与肝脏疾病引起的肝功能损伤有关。血清碱性磷酸酶临床:卷义:①肝胆疾病，如阻塞性黄疸时，由于胆汁排泄不畅，使碱性磷酸酶(AKP)滞留血中而增高；急慢性黄疸型肝炎或肝癌时也可使 AKP 升高；②骨骼系统疾病，如骨细胞瘤、骨折恢复期、骨转移癌等，血清 AKP 增高。肌酸磷酸激酶急性心肌梗死时血清酶中升高最早的是肌酸磷酸激酶(CPK)。

标签:

简单

记忆

（140-1~140-2 题共用备选答案）

- A. 肺大疱

- B. 肺脓肿
- C. 浸润型肺结核空洞形成
- D. 慢性纤维空洞型肺结核
- E. 周围型肺癌空洞形成

140. X 线下见右上肺有多发的厚壁空洞，周围有较广泛的纤维条索影。应首先考虑的是

答案:D

解析:慢性纤维空洞型肺结核的症状。

标签:

精华

中等

应用

141. X 线下见右下肺出现大片的浓密阴影。其内见一个含有液平面的圆形空洞，洞内壁光整，洞壁较厚应首先考虑的是

答案:B

解析:肺脓肿的症状。

标签:

精华

中等

应用

(142-1~142-2 题共用备选答案)

- A. 劣药
- B. 假药
- C. 残次药品
- D. 仿制药品
- E. 特殊药品

142. 药品成分含量不符合国家药品标准的是

答案:A

解析:假药是成分不符国家药品标准，劣药是含量不符国家药品标准。

标签:

简单

记忆

143. 药品所含成分与国家药品标准规定的成分不符合的是

答案:B

解析:假药是成分不符国家药品标准，劣药是含量不符国家药品标准。

标签:

简单

记忆

(144-1~144-2 题共用备选答案)

- A. 责令暂停6个月以上1年以下执业活动
- B. 吊销其执业证书
- C. 追究刑事责任
- D. 罚款
- E. 承担赔偿责任

144. 造成医疗事故，情节严重的

答案:B

解析:实记题。

标签:

精华

简单

记忆

145. 隐匿、伪造或者擅自销毁医学文书及有关资料，构成犯罪的

答案:C

解析:实记题。

标签:

精华

简单

记忆

(146-1~146-2 题共用备选答案)

- A. 与中医药有关的评审或者鉴定活动
- B. 中医药专业技术职称任职资格评审
- C. 获得定点资格的中医医疗机构
- D. 非营利性中医医疗机构
- E. 中医药人员培训规划

146. 成立专门的中医药评审组织或者由中医药专家参加评审的是

答案:B

解析:实记题。

标签:

简单

记忆

147. 应当体现中医药特色，遵循中医药自身的发展规律的是

答案:A

解析:实记题。

标签:

简单

记忆