

男, 45 岁, 高处坠落伤 7 小时伤后未排尿, 查体: 神志清, BP80/55mmHg, 血氧饱和度 90%, 颈部、背部、腰部、胸部无压痛, 心率 122 次/分, 腹部无压痛、肌紧张, 上肢感觉活动正常, 骨盆分离挤压实验(+), 髋关节活动受限, 大腿见多处皮肤擦伤并有沙粒污染, 下肢感觉运动正常, 入院后首先要进行的处理是 (D)

- A. 立即留置导尿
- B. 临时固定骨盆
- C. 立即清创, 防止创面感染
- D. 立即开通静脉补液通路
- E. 立即完相关检查, 明确诊断

治疗风湿性疾病的药物, 下列哪项是错误的 (E)

- A. 布洛芬
- B. 青霉胺
- C. 环磷酰胺
- D. 强的松
- E. PGE (前列腺素)

位于脊髓后索内侧传导下部躯干及下肢深感觉的是 (D)

- A. 脊髓丘脑束
- B. 皮质脊髓束
- C. 楔束
- D. 薄束
- E. 内侧丘系

如患者颅脑损伤为左额极、颞极脑挫裂伤伴脑内血肿, 最可能的损伤机制是 (B)

- A. 挤压伤
- B. 减速性损伤
- C. 加速性损伤
- D. 坠落伤
- E. 继发伤

上消化道出血诱发肝性脑病的主要机制是 (A)

- A. 经肠道细菌作用而产氨增加

- B. 引起失血性休克
- c. 脑组织缺血缺氧
- D. 血液苯乙胺和酪胺增加
- E. 破坏血 - 脑屏障, 假性神经递质入脑