

2021 年 7 月临床执业医师月度考试（第二单元）

- 1、（A1 型选择题）咳嗽伴发热不常见于
- A.急性上呼吸道感染
 - B.急性下呼吸道感染
 - C.肺结核
 - D.自发性气胸
 - E.胸膜炎
- 2、（A1 型选择题）大量咯血指的是
- A.每日咯血量 100ml
 - B.每日咯血量 200ml
 - C.每日咯血量 300ml
 - D.一次咯血量 80ml
 - E.每日咯血量在 500ml 以上
- 3、（A1 型选择题）主动脉瓣关闭不全，出现周围血管征的原因是
- A.外周动脉硬化

- B.回心血量增加
- C.心输出量增大
- D.收缩压增高、舒张压下降
- E.中小动脉弹性增加

4、（A1 型选择题）慢性阻塞性肺病（COPD）最重要的病因是

- A.呼吸道感染
- B.长期吸烟
- C.大气污染
- D.营养不良
- E.寒冷气候

5、（A1 型选择题）呼吸困难伴一侧胸痛见于

- A.心包积液
- B.肺栓塞
- C.阻塞性肺气肿
- D.肺间质纤维化
- E.支气管哮喘

6、（A1 型选择题）呼吸深慢见于

- A.情绪激动
- B.代谢性酸中毒
- C.大量胸腔积液
- D.重症肺炎
- E.气胸

7、（A1 型选择题）肥厚型梗阻性心肌病

- A.Graham-Steel 杂音
- B.Austin-Flint 杂音
- C.心尖区收缩中期喀喇音
- D.胸骨左缘 3~4 肋间收缩期喷射性杂音
- E.胸骨左缘 2 肋间 Gibson 杂音

8、（A1 型选择题）引起大叶性肺炎最常见病原菌为

- A.葡萄球菌
- B.溶血性链球菌
- C.肺炎克雷伯杆菌

D.肺炎球菌

E.结核菌

9、（A1 型选择题）二尖瓣狭窄患者出现右心衰竭时最可能缓解的临床表现是

A.肝大

B.颈静脉怒张

C.肝脏压痛

D.呼吸困难

E.双下肢水肿

10、（A1 型选择题）急性心肌梗死时血心肌坏死标记物中升高最早的是

A.肌红蛋白

B.肌钙蛋白

C.乳酸脱氢酶（LDH）

D.谷草转氨酶（AST）

E.肌酸磷酸激酶同工酶（CPK-MB）

11、（A1 型选择题）动脉导管未闭可听到

- A. Graham-Steel 杂音
 - B. Austin-Flint 杂音
 - C. 胸骨左缘 3~4 肋间收缩期喷射性杂音
 - D. 胸骨左缘 2 肋间粗糙、响亮连续性机械性杂音
 - E. 心尖区收缩中期喀喇音
- 12、（A1 型选择题）合并双侧肾动脉狭窄的高血压患者降压不宜首选
- A. 钙通道阻滞剂
 - B. 利尿剂
 - C. 血管紧张素转化酶抑制剂
 - D. β 受体阻滞剂
 - E. α 受体阻滞剂
- 13、（A1 型选择题）判断肺结核有无传染性最主要的依据是
- A. 结核菌素试验阳性
 - B. 血沉增快
 - C. 反复痰中带血
 - D. 痰结核杆菌检查阳性

E.胸部 X 线有空洞

14、（A1 型选择题）红细胞增多常见于

A.糖尿病

B.急性中毒

C.严重的组织损伤

D.支气管哮喘

E.严重慢性心肺疾病

15、（A1 型选择题）血压 170/100mmHg 伴心肌梗死患者应诊断为高血压病

A.2 级（低危）

B.2 级（中危）

C.2 级（高危）

D.3 级（极高危）

E.2 级（极高危）

16、（A1 型选择题）周围血管征主要见于

A.肺动脉瓣重度关闭不全

- B.主动脉瓣狭窄
- C.二尖瓣重度关闭不全
- D.二尖瓣狭窄
- E.主动脉瓣重度关闭不全

17、（A1 型选择题）红细胞增多的诊断标准

- A.成年男性红细胞 $> 7.0 \times 10^{12}/L$ ，成年女性红细胞 $> 6.0 \times 10^{12}/L$
- B.成年男性红细胞 $> 7.0 \times 10^{12}/L$ ，成年女性红细胞 $> 6.5 \times 10^{12}/L$
- C.成年男性红细胞 $> 6.0 \times 10^{12}/L$ ，成年女性红细胞 $> 5.5 \times 10^{12}/L$
- D.成年男性红细胞 $> 6.5 \times 10^{12}/L$ ，成年女性红细胞 $> 6.0 \times 10^{12}/L$
- E.成年男性红细胞 $> 5.5 \times 10^{12}/L$ ，成年女性红细胞 $> 5.0 \times 10^{12}/L$

18、（A1 型选择题）结核性与癌性胸膜炎的最主要鉴别点是

- A.胸水 ADA 测定
- B.胸水生长速度
- C.胸水细胞学和细菌学检查
- D.胸水 CEA 测定
- E.胸痛程度

19、（A1 型选择题）关于室性期前收缩的心电图特点

- A.提前出现的与窦性传导的 QRS 波一致
- B.其 T 波方向与 QRS 主波方向一致
- C.宽大 QRS 波前无 P 波
- D.代偿间期不完全
- E.QRS 波时间 <0.12 秒

20、（A1 型选择题）阵发性室上性心动过速的心率一般在

- A.100~150 次/分
- B.150~250 次/分
- C.200~250 次/分
- D.250~300 次/分
- E.300~350 次/分

21、（A1 型选择题）Virchow 淋巴结是指

- A.非特异性淋巴结炎
- B.淋巴结结核
- C.肺癌向右侧锁骨上窝转移引起的

D.胃癌向左侧锁骨上淋巴结群转移引起的

E.肾癌向右侧锁骨上淋巴结群转移引起的

22、（A1 型选择题）甲状腺功能亢进时，腹泻的主要发生机制是

A.肠液分泌增多

B.肠内容物渗透压增高

C.肠腔内渗出物增加

D.肠蠕动增强

E.VIP 的作用

23、（A1 型选择题）可引起低血钾的药物是

A.呋塞米

B.螺内酯

C.氨苯蝶啶

D.阿米洛利

E.依那普利

24、（A1 型选择题）干性支气管扩张是指

A.干咳为主

- B.仅有早晨咳嗽及咳痰
- C.纤维支气管镜检见支气管黏膜干燥、萎缩
- D.病变局限于上叶
- E.仅有反复咯血，一般无咳嗽、咳痰

25、（A1 型选择题）心脏骤停一旦确诊，应立即

- A.人工呼吸
- B.胸外按压
- C.电复律
- D.开通气道
- E.利多卡因静注

26、（A1 型选择题）肝呈弥漫性肿大、质韧，常见疾病是

- A.肝囊肿
- B.脂肪肝
- C.肝淤血
- D.肝脓肿
- E.慢性肝炎

27、（A1 型选择题）上消化道出血最常见于

A.食管静脉曲张破裂

B.消化性溃疡

C.急性胃黏膜病变

D.食管癌

E.壶腹癌

28、（A1 型选择题）单纯收缩期高血压的诊断标准是

A.SBP \geq 180mmHg

B.SBP 为 140~160mmHg

C.SBP \geq 140mmHg 或 DBP $<$ 90mmHg

D.SBP \geq 140mmHg 和 DBP $<$ 90mmHg

E.SBP \geq 160mmHg 和 DBP $<$ 90mmHg

29、（A1 型选择题）诊断支原体肺炎的主要依据不包括

A.临床表现

B.X 线表现

C.肺功能检查

D.血清冷凝集试验

E.培养、分离支原体

30、（A1 型选择题）咯血不常见于

A.肺结核

B.风心病二尖瓣狭窄伴肺动脉高压

C.胸膜炎

D.肺癌

E.支气管扩张症

31、（A1 型选择题）慢性阻塞性肺疾病的主要特征是

A.小气道阻塞

B.大气道阻塞

C.双肺哮鸣音

D.桶状胸

E.胸片示肺纹理增粗

32、（A1 型选择题）在慢性肺心病的发生、发展过程中，导致肺血管阻力增加的最主要因素是

- A.高碳酸血症
- B.缺氧
- C.呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒
- D.电解质紊乱
- E.肺部感染

33、（A1 型选择题）肠结核的好发部位为

- A.回肠
- B.空肠
- C.回盲部
- D.升结肠
- E.十二指肠

34、（A1 型选择题）支气管扩张引起大咯血的原因为

- A.支气管动脉先天性解剖畸形
- B.合并重度支气管炎
- C.支气管动脉与肺动脉终末支扩张血管瘤破裂
- D.支气管发生囊性扩张

E.支气管黏膜溃疡

35、（A1 型选择题）支气管哮喘典型的临床症状是

A.胸闷

B.胸痛

C.反复发作性伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难

D.干咳

E.咯血

36、（A1 型选择题）治疗成人呼吸窘迫综合征最有效的措施为

A.低浓度持续吸氧

B.高浓度吸氧

C.呼气末正压通气

D.正压机械通气

E.应用糖皮质激素

37、（A1 型选择题）血气分析中反映通气性因素的指标是

A.PaO₂

B.PaCO₂

C.AG

D.SB

E.BE

38、（A1 型选择题）下列贫血属于正常细胞性贫血的疾病是

A.缺铁性贫血

B.巨幼细胞性贫血

C.海洋性贫血

D.铁粒幼细胞性贫血

E.再生障碍性贫血

39、（A1 型选择题）急性左心衰应选用的利尿剂为

A.氢氯噻嗪

B.螺内酯

C.氨苯蝶啶

D.呋塞米

E.阿米洛利

40、（A1 型选择题）早期发现肺结核的首选方法是

A.纤维支气管镜检查

B.结核菌素试验

C.血清酶联免疫试验

D.痰结核杆菌检查

E.胸部 X 线检查

41、（A1 型选择题）在心肌梗死的急性期，梗死区导联表现有

A.ST 段弓背向上抬高

B.坏死型 Q 波

C.T 波直立

D.缺血型 T 波倒置

E.上述均可出现

42、（A1 型选择题）无创机械通气应用的基本条件错误的是

A.清醒能够合作

B.血流动力学稳定

C.呼吸道里有大量脓痰

D.不需要气管插管保护

E.能耐受鼻/面罩

43、（A1 型选择题）下列属于扩张型心肌病特征的是

- A.主要表现为舒张功能障碍
- B.为伴有特异性系统性疾病的心肌病
- C.心室充盈受限和舒张期容量下降
- D.心肌扩大，室壁运动普遍减弱
- E.右室心肌被纤维脂肪组织所替代

44、（A1 型选择题）医院内获得性肺炎，最常见的致病菌是

- A.病毒
- B.革兰阴性球菌
- C.厌氧菌
- D.革兰阳性杆菌
- E.真菌

45、（A1 型选择题）急性肺脓肿最具特征的症状是

- A.畏寒高热
- B.咳嗽伴咯血

- C.呼吸困难
- D.咳嗽伴胸痛
- E.咳大量脓臭痰

46、（A1 型选择题）二尖瓣狭窄的主要病因是

- A.病毒感染
- B.先天畸形
- C.风湿热
- D.老年瓣膜钙化
- E.高血压

47、（A1 型选择题）急性心肌梗死最常见的心律失常是

- A.心房颤动
- B.房室传导阻滞
- C.窦房传导阻滞
- D.室性期前收缩
- E.加速性室性自主心律

48、（A1 型选择题）脾肿大最显著的疾病是

- A.急性粒细胞白血病
- B.急性淋巴细胞白血病
- C.急性单核细胞白血病
- D.慢性淋巴细胞白血病
- E.慢性粒细胞白血病

49、（A1 型选择题）洋地黄中毒最常见的心律失常为

- A.房室传导阻滞
- B.非阵发性交界性心动过速
- C.心房颤动
- D.交界性逸搏心律
- E.室性期前收缩二联律

50、（A1 型选择题）变异型心绞痛的主要特点是

- A.心绞痛发作时常可见 Q 波
- B.常于劳累后发作
- C.情绪激动是常见诱因
- D.发作时 ST 段明显下移

E.发作时 ST 段上移

51、（A1 型选择题）以下哪项不是心包炎的常见类型

A.心肌损伤后综合征

B.化脓性或结核性

C.非特异性

D.痛风性

E.肿瘤性

52、（A1 型选择题）血管检查所见的临床意义，哪项正确

A.奇脉-休克

B.短绌脉-心包积液

C.交替脉-高血压

D.水冲脉-动脉导管未闭

E.重搏脉-急性心肌梗死

53、（A1 型选择题）动脉粥样硬化病变最常累及哪一支冠状动脉

A.左冠状动脉主干

B.左冠状动脉前降支

C.左冠状动脉回旋支

D.右冠状动脉后降支

E.右冠状动脉窦房结支

54、（A1 型选择题）最易发生幽门梗阻症状的溃疡是

A.胃角溃疡

B.胃窦溃疡

C.球后溃疡

D.胃多发性溃疡

E.幽门管溃疡

55、（A1 型选择题）Beck 三联征是指

A.血压突然升高，颈静脉显著怒张，心音低钝遥远

B.血压突然下降，颈静脉显著怒张，心音增强

C.血压突然下降，颈静脉显著塌陷，心音低钝遥远

D.血压突然下降，颈静脉显著塌陷，心音增强

E.血压突然下降，颈静脉显著怒张，心音低钝遥远

56、（A1 型选择题）心脏压塞时不出现

- A.脉压变大
- B.奇脉
- C.Ewart 征
- D.颈静脉怒张
- E.肝肿大

57、（A1 型选择题）溃疡性结肠炎的病理改变错误的是

- A.隐窝脓肿
- B.非干酪性肉芽肿
- C.腺体萎缩变形、排列紊乱、数目较少
- D.淋巴细胞、浆细胞、单核细胞等浸润
- E.潘氏细胞化生

58、（A1 型选择题）关于咳嗽的描述下列正确的是

- A.只有呼吸道感染才能引起咳嗽
- B.干咳仅见于肺癌早期
- C.感染时引起的咳嗽较重，非感染因素引起的咳嗽较轻
- D.中枢神经因素引起的咳嗽，是从桥脑发出冲动所致

E.支气管扩张症咳嗽往往于清晨或夜间变动体位时加重，并伴咳痰

59、（A1 型选择题）急性糜烂性胃炎出血的主要症状是

A.恶心、呕吐

B.腹胀、腹泻

C.腹部不适

D.食欲减退

E.呕血、黑便

60、（A1 型选择题）左心衰竭常表现为

A.侧卧时呼吸困难减轻

B.肺底有干啰音

C.常采取端坐呼吸体位

D.常伴淤血性肝肿大

E.喜欢平卧

61、（A1 型选择题）下列治疗方法哪种对再生障碍性贫血最有效

A.雄激素

B.糖皮质激素

C.脾切除术

D.右旋糖酐铁注射

E.止血药物

62、（A1 型选择题）与呼吸困难无明显关系的疾病包括

A.肺炎

B.脑出血

C.大量腹腔积液

D.急性一氧化碳中毒

E.急性胃炎

63、（A1 型选择题）对出血坏死型胰腺炎最具诊断价值的是

A.血脂肪酶增高

B.血淀粉酶增高

C.血胆红素增高

D.血钙降低

E.B 超检查胰腺增大

64、（A1 型选择题）大气道堵塞时

- A. 呼气费力
- B. 呼气时伴有哮鸣音
- C. 重者出现吸气时“三凹征”
- D. 常见于支气管哮喘
- E. 常伴有湿啰音

65、（A1 型选择题）咯血最常见于

- A. 肺癌
- B. 血小板减少性紫癜
- C. 支原体肺炎
- D. 支气管扩张症
- E. 风湿热

66、（A1 型选择题）形成血浆胶体渗透压的主要物质是

- A. NaCl
- B. 球蛋白
- C. 清蛋白
- D. 纤维蛋白

E. 血红蛋白

67、（A1 型选择题）血清铁减低，总铁结合力增高及转铁蛋白饱和度减低见于

A. 海洋性贫血

B. 感染性贫血

C. 缺铁性贫血

D. 再生障碍性贫血

E. 铁粒幼细胞性贫血

68、（A1 型选择题）间停呼吸是由于

A. 抑郁症

B. 急性胸膜炎

C. 胸膜恶性肿瘤

D. 神经衰弱

E. 呼吸中枢兴奋性降低

69、（A1 型选择题）大量心包积液可存在

A. 交替脉

B.重搏脉

C.奇脉

D.水冲脉

E.短绌脉

70、（A1 型选择题）上消化道出血范围是

A.贲门以上出血

B.幽门以上出血

C.空回肠交界处以上出血

D.Treitz 韧带以上出血

E.回盲部以上出血

71、（A2 型选择题）男，66岁，金属音咳嗽1个月余，伴乏力、消瘦，40年吸烟史，考虑可能的疾病是

A.肺空洞

B.肺炎

C.肺肿瘤

D.胸腔积液

E.胸膜增厚

72、（A2 型选择题）男性，27 岁，已婚。一周前因生气而出现心情不佳，四肢发麻，抽动、双下肢瘫痪，但无神经系统损害的体征，该患者可能的诊断是

A.神经衰弱

B.抑郁症

C.分离运动性障碍

D.癫痫

E.反应性精神障碍

73、（A2 型选择题）37 岁，男性，活动后心悸、气喘 1 年余。查体：轻度贫血，心率快，律齐，胸骨右缘第 2 肋间闻及响亮而粗糙的收缩期杂音（3/6 级）。首先考虑的疾病为

A.动脉导管未闭

B.主动脉瓣狭窄

C.二尖瓣关闭不全

D.室间隔缺损

E.主动脉瓣关闭不全

74、（A2 型选择题）女，33 岁。2 小时前突然呕鲜血约 1000ml 来院，2 年前诊断为慢性乙型肝炎。查体：贫血貌，BP90/60mmHg,P120 次/分，肝肋下未触及,脾肋下 3cm。血红蛋白 60g/L，红细胞 $2.6 \times 10^{12}/L$ ，血小板 $60 \times 10^9/L$ ，最有效的紧急止血措施是

- A.口服止血药
- B.补充凝血因子
- C.三腔二囊管压迫
- D.静脉注射生长抑素制剂
- E.冷盐水洗胃

75、（A2 型选择题）男，22 岁，入住新居后频繁咳嗽并气喘，查体肺部有哮鸣音，考虑病因为

- A.肺梗死
- B.自发性气胸
- C.支气管哮喘
- D.胸腔积液
- E.肺炎

76、（A2 型选择题）女，28 岁，风湿性心脏病，二尖瓣狭窄并关闭不全。

心悸、气短、下肢水肿。每天服地高辛 0.25mg，间断服氢氯噻嗪已 2 个月，心电图示室性期前收缩、二联律。首选哪种治疗措施

- A.利多卡因
- B.钾盐
- C.美西律
- D.普萘洛尔
- E.停用地高辛，给予钾盐和苯妥英钠

77、（A2 型选择题）男，55 岁，在洗浴时昏倒，被人发现送来急诊，体检：昏迷状、血压 170/100mmHg,口唇呈樱桃红色，两肺满布湿鸣音，双侧巴宾斯基征（+）。该患者最可能是

- A.脑出血
- B.心肌梗死
- C.糖尿病酮症酸中毒
- D.一氧化碳中毒
- E.低血糖昏迷

78、（A2 型选择题）女性，48 岁，反复咳嗽、咳痰、喘 5 年余，冬季加重，一周前上述症状加重，经治疗无效住院。体检：胸廓对称，双肺干湿啰

音，X 线胸片示双肺纹理增强，其诊断可能为

- A.慢性喘息型支气管炎急性发作
- B.慢性支气管炎急性发作
- C.慢性支气管炎迁延期
- D.慢性喘息型支气管炎迁延期
- E.慢性喘息型支气管炎缓解期

79、（A2 型选择题）女性，32 岁，发热 1 周伴呼吸困难，用硝酸甘油无效，体检：心音低沉，有舒张期附加音，血压 110/80mmHg（14.7/10.7kPa），肘部静脉压 180mmH₂O，心电图：ST 段抬高，弓背向下，未见病理性 Q 波，诊断可能为

- A.急性心肌梗死
- B.急性渗出性心包炎
- C.变异性心绞痛
- D.稳定型心绞痛
- E.缩窄性心包炎

80、（A2 型选择题）男，26 岁，经常胸闷心悸，经检查诊断为二尖瓣脱垂，其体征应具有下列哪项

- A.第一心音亢进
- B.开瓣音
- C.收缩中晚期喀喇音
- D.心尖区舒张期杂音
- E.收缩早期喷射音

81、（A2 型选择题）男，6 岁，持续发热一周，体温可达 $39.6\sim 40.2^{\circ}\text{C}$ ，每天体温波动在 1°C 之内，此热型属于

- A.波浪热
- B.稽留热
- C.间歇热
- D.弛张热
- E.不规则热

82、（A2 型选择题）患者，女，13 岁。患 Graves 病。治疗宜首选

- A. ^{131}I 治疗
- B.立即手术治疗
- C.镇静剂

D.抗甲状腺药物

E.鼓励多食海带

83、（A2 型选择题）女，66 岁，高血压病 10 年，血压一直维持 130～140/85～95mmHg。近 1 年来尿蛋白（+），发现糖耐量异常。降压药物的最佳选择是

A.利尿剂

B.转换酶抑制剂

C.α 受体阻滞剂

D.钙通道阻滞剂

E.血管扩张剂

84、（A2 型选择题）风心病患者感心悸、胸闷，心脏听诊心律不齐，心电图示:P 波消失，代之以 f 波，R-R 间期绝对不匀齐，室率 120 次/分，心电图诊断最可能为

A.室上性心动过速

B.房早二联律

C.心房颤动

D.阵发性房性心动过速

E.阵发性室性心动过速

85、（A2 型选择题）— 50 岁男性出现发热、尿频、尿急、尿痛症状，最可能的诊断为

A.糖尿病

B.膀胱结核

C.急性肾盂肾炎

D.神经源性膀胱

E.膀胱癌

86、（A2 型选择题）患者，女，30 岁，咳嗽 1 个月余，伴低热、痰中带血 10 天，胸片示:右肺上叶尖段炎症，伴有空洞形成。最可能的诊断是

A.肺脓肿

B.支气管扩张

C.浸润性肺结核

D.癌性空洞伴感染

E.金黄色葡萄球菌肺炎

87、（A2 型选择题）女，24 岁，无症状。查体：心界正常，心率 80 次/分，期前收缩 1~3 次/分，心音正常，无杂音。心电图示室性期前收缩，处理

措施是

- A.美托洛尔
- B.美西律
- C.胺碘酮
- D.莫雷西嗪
- E.不予药物治疗，定期复查

88、（A1 型选择题）女性，60 岁，近来咽第一口饭时常有哽噎感，首先应考虑

- A.食管炎
- B.食管息肉
- C.贲门失弛缓症
- D.食管癌
- E.食管憩室

89、（A2 型选择题）女性，68 岁，反复咳嗽、咳痰 30 年，活动后气短 12 年。动脉血气分析示 $\text{PaCO}_2 50\text{mmHg}$ ， $\text{PaO}_2 45\text{mmHg}$ ，能够延长寿命，防止肺动脉高压发展的最有效的家庭治疗是

- A.抗生素控制感染

B.长期家庭氧疗

C.吸入糖皮质激素

D.呼吸肌锻炼

E.支气管舒张剂治疗

90、（A2型选择题）男性，65岁，吸烟40余年，慢性咳嗽、咳痰20余年。近2年来劳累时有气急，查体：两肺呼吸音减弱，肺下界下移，两肺底有细小湿啰音。最可能的诊断是

A.大叶性肺炎

B.胸腔积液

C.肺气肿

D.支气管哮喘

E.气胸

91、（A2型选择题）女，40岁，有风湿性心脏病，二尖瓣狭窄伴关闭不全16年，近日感心悸、气急、心率156次/分，律不齐，心电图示心房颤动，在下列治症中应选用

A.电击

B.奎尼丁

C.利多卡因

D.普萘洛尔

E.洋地黄

92、（A2 型选择题）女，33 岁，午后发热 1 周伴干咳、左胸痛，活动后气急 2 天。胸透提示左侧胸腔积液，血白细胞 $7.8 \times 10^9/L$ ，胸水为淡血性渗出液，淋巴细胞 65%。最可能的诊断是

A.化脓性胸膜炎

B.癌性胸腔积液

C.结核性胸膜炎

D.细菌性肺炎伴胸膜炎

E.肺栓塞并胸腔积液

93、（A2 型选择题）男，20 岁。低热、腹痛、腹泻伴腹胀 2 个月。体查：腹壁揉面感，腹部移动性浊音阳性。腹水为渗出液。为明确诊断，下列哪项检查最有价值

A.血培养

B.结核菌素试验

C.腹水细菌培养

D.腹膜活检

E.血沉

94、（A2 型选择题）女性患者，66 岁，有慢性支气管炎、肺气肿病 30 年，咳、痰、喘加重 10 天，血气检查：
pH7.21,PaCO₂76mmHg,PaO₂57mmHg,HCO₃⁻327mmol/L,BE-6mmol/L，据此结果该患者酸碱失衡的类型最可能是

A.代谢性酸中毒

B.呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒

C.呼吸性酸中毒

D.代谢性碱中毒

E.呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒

95、（A2 型选择题）女，45 岁，上腹不适 5 年伴暖气，胃镜检查见胃窦黏膜苍白，皱襞变细而平坦，活检发现中度不典型增生，最重要的措施是

A.外科手术切除

B.定期作胃酸分泌功能测定

C.定期复查胃肠钡餐检查

D.定期胃镜检查追踪观察

E.防止幽门梗阻发生

96、（A2 型选择题）患者因急性心肌梗死入院。入院第 3 天，于心尖部出现 3/6 收缩期杂音，同时心力衰竭加重。使用纠正心衰的药物效果很差而死亡。最可能的诊断为心肌梗死并发

A.室间隔穿孔

B.急性肺心病

C.梗死后综合征

D.乳头肌或腱索断裂

E.心室游离壁破裂

97、（A2 型选择题）女，43 岁，黄疸，肝脾肿大半年，进食时突然呕吐暗红色液体 300ml，其病因可能为

A.食管癌

B.食管贲门黏膜撕裂综合征

C.食管静脉曲张破裂

D.急性胃黏膜损伤

E.胃体上部溃疡

98、（A2 型选择题）女性，30 岁，肥胖，紫纹（-），血浆皮质醇

552mmol/L (20 μ g/dl) (正常值 6~16 μ g/dl)，为了明确诊断应首选下列哪项检查

- A.测定血浆 ACTH
- B.肾上腺 CT 扫描
- C.垂体磁共振检查
- D.小剂量地塞米松抑制试验
- E.葡萄糖耐量试验

99、(A2 型选择题) 女，30 岁，糖尿病史及应用胰岛素 10 年，1 周前自行停药，3 小时来昏迷，呼吸深且慢，可能原因

- A.呼吸肌麻痹
- B.肺炎
- C.酸中毒
- D.急性左心衰
- E.大量胸腔积液

100、(A2 型选择题) 男性，40 岁，因右腹股沟斜疝行手术治疗。术中发现疝囊壁的一部分由盲肠组成，此时的诊断为

- A.Richter 疝

- B.滑动疝
- C.Littre 疝
- D.难复性疝
- E.易复性疝

101、（A2 型选择题）男，45 岁，近 1 个月来粪便中有黏液或脓血，每天大便 4~5 次，肛门坠胀感，此时最先要做的检查为

- A.X 线钡灌肠造影
- B.B 超检查
- C.直肠指诊
- D.纤维结肠镜检查
- E.大便常规及培养

102、（A2 型选择题）女，30 岁，呼吸困难 3~4 年，查体：负性心尖搏动，心尖区舒张期杂音及开瓣音。该患者负性心尖搏动说明

- A.左室轻度增大
- B.左室明显增大
- C.右室明显增大

D.右室轻度增大

E.左右室皆增大

103、（A2 型选择题）男性，40 岁，反复下肢水肿 10 年，心前区不适 2 小时，心电图交界性逸搏、阵发性窦性停搏，B 超示双肾缩小，血钾 7.6mmol/L，血肌酐 760 μ mol/L。目前采取的最合适的治疗是

A.安装起搏器

B.利尿

C.透析

D.肾上腺素静注

E.硝酸甘油扩张血管

104、（A2 型选择题）— 14 岁男孩，反复双下肢对称性皮肤瘀点、瘀斑，伴有四肢关节肿痛，有血尿和水肿。血小板计数正常。最可能的诊断为

A.原发性血小板减少性紫癜

B.血友病

C.维生素 K 缺乏症

D.过敏性紫癜

E.重症肝炎

105、（A2 型选择题）女性，42 岁，因车祸出现双下肢肌肉挤压伤，尿液呈酱油色，第 2 日，24h 尿量 250ml，下列化验及检查结果不符合急性肾衰竭的是

A.血钾 5.5mmol/L

B.血镁 1.4mmol/L

C.血红蛋白 60g/L

D.血肌酐 245 μ mol/L

E.血磷 2.1mmol/L

106、（A2 型选择题）女，33 岁，慢性肾炎 6 年。查血 BUN18mmol/L，Cr285 μ mol/L，血红蛋白 80g/L，尿蛋白（++），最合适的治疗为

A.肾移植

B.血液透析

C.低蛋饮食+酮酸

D.腹膜透析

E.中草药

107、（A2 型选择题）女，2 岁，在独自游戏时突然出现刺激性咳嗽，呼吸困难，其病因最可能是

- A.大叶性肺炎
- B.自发性气胸
- C.气管异物
- D.左心衰竭
- E.右心衰竭

108、（A2 型选择题）女性，19 岁，学生。近 1 年来经常脑内反复思考问题，如做数学题时，反复核对答案，明知不对，但又无法控制，最可能的诊断是

- A.神经衰弱
- B.焦虑症
- C.强迫症
- D.癔症
- E.精神分裂症

109、（A2 型选择题）女性，61 岁。5 年前体检发现血压为 150/90mmHg，近一年出现心前区不适，心悸，逐渐加重。查体：血压为 160/100mmHg，心尖搏动向左下移位。该患者心尖搏动向左下移位最可能是下列哪种情况

- A.主动脉扩张

- B.左心室增大
- C.右心室增大
- D.左、右心室均增大
- E.心包积液

110、（A2 型选择题）男，20 岁，因服吲哚美辛数片后觉胃痛，今晨呕咖啡样胃内容物 400ml 来诊。既往无胃病史。首选的检查是

- A.血清胃泌素测定
- B.B 型超声检查
- C.X 线胃肠钡餐
- D.胃液分析
- E.急诊胃镜检查

111、（B1 型选择题）细菌性痢疾出现

- A.地图形溃疡
- B.边缘呈火山口样隆起的溃疡
- C.边缘整齐如刀切的圆形溃疡
- D.长轴与局部肠管纵轴平行的溃疡

E.口小底大的烧瓶状溃疡

112、（B1 型选择题）溃疡型胃癌出现

A.地图形溃疡

B.边缘呈火山口样隆起的溃疡

C.边缘整齐如刀切的圆形溃疡

D.长轴与局部肠管纵轴平行的溃疡

E.口小底大的烧瓶状溃疡

113、（B1 型选择题）消化性溃疡病出现

A.地图形溃疡

B.边缘呈火山口样隆起的溃疡

C.边缘整齐如刀切的圆形溃疡

D.长轴与局部肠管纵轴平行的溃疡

E.口小底大的烧瓶状溃疡

114、（B1 型选择题）固定性湿啰音

A.支气管扩张

B.支气管哮喘

- C. 支气管肺癌
- D. 慢性支气管炎、肺气肿
- E. 特发性肺间质纤维化

115、（B1 型选择题）双肺布满哮鸣音，呼气相延长

- A. 支气管扩张
- B. 支气管哮喘
- C. 支气管肺癌
- D. 慢性支气管炎、肺气肿
- E. 特发性肺间质纤维化

116、（B1 型选择题）意识清楚，兴趣减退，思维迟缓、言语动作减少

- A. 情感淡漠
- B. 抑郁状态
- C. 痴呆状态
- D. 脑衰弱综合征
- E. 缄默状态

117、（B1 型选择题）意识清楚，记忆力差，生活自理能力下降，缺乏同

情心,本能活动增多

- A.情感淡漠
- B.抑郁状态
- C.痴呆状态
- D.脑衰弱综合征
- E.缄默状态

118、（B1 型选择题）心肌炎的表现

- A.心衰时收缩期杂音较响，随心衰好转而减轻
- B.有类似心绞痛发作，特征性杂音，猝死率高
- C.有感冒病史，心律失常，心肌酶升高
- D.两侧血压不对称，上腹部有血管杂音
- E.发作后,心电图出现动态演变

119、（B1 型选择题）扩张型心肌病的表现

- A.心衰时收缩期杂音较响，随心衰好转而减轻
- B.有类似心绞痛发作，特征性杂音，猝死率高
- C.有感冒病史，心律失常，心肌酶升高

D.两侧血压不对称，上腹部有血管杂音

E.发作后,心电图出现动态演变

120、（B1 型选择题）肥厚梗阻型心肌病的表现

A.心衰时收缩期杂音较响，随心衰好转而减轻

B.有类似心绞痛发作，特征性杂音，猝死率高

C.有感冒病史，心律失常，心肌酶升高

D.两侧血压不对称，上腹部有血管杂音

E.发作后,心电图出现动态演变

121、（B1 型选择题）治疗脑膜白血病

A.羟基脲

B.阿糖胞苷

C.DA 方案

D.别嘌醇

E.鞘内注射甲氨蝶呤

122、（B1 型选择题）防止高尿酸血症肾病

A.羟基脲

B.阿糖胞苷

C.DA 方案

D.别嘌呤醇

E.鞘内注射甲氨蝶呤

123、（B1 型选择题）慢性粒细胞白血病常首选的化疗药物

A.羟基脲

B.阿糖胞苷

C.DA 方案

D.别嘌呤醇

E.鞘内注射甲氨蝶呤

124、（B1 型选择题）酸中毒不宜

A.静脉给予支链氨基酸

B.应用抗生素

C.口服乳果糖

D.肥皂水灌肠

E.应用精氨酸

125、（B1 型选择题）肝性脑病患者不宜

- A. 静脉给予支链氨基酸
- B. 应用抗生素
- C. 口服乳果糖
- D. 肥皂水灌肠
- E. 应用精氨酸

126、（B1 型选择题）骨性关节炎好发于

- A. 肘关节
- B. 膝关节
- C. 踝关节
- D. 肩关节
- E. 近端指间关节

127、（B1 型选择题）类风湿关节炎好发于

- A. 肘关节
- B. 膝关节
- C. 踝关节

D.肩关节

E.近端指间关节

128、（B1 型选择题）气胸

A.Biots 呼吸

B.Kussmaul 呼吸

C.端坐呼吸

D.异常呼吸音

E.呼气时间延长

129、（B1 型选择题）糖尿病酮症

A.Biots 呼吸

B.Kussmaul 呼吸

C.端坐呼吸

D.异常呼吸音

E.呼气时间延长

130、（B1 型选择题）左心功能不全

A.Biots 呼吸

B.Kussmaul 呼吸

C.端坐呼吸

D.异常呼吸音

E.呼气时间延长

131、（A2 型选择题）男性，52 岁，反复咳嗽、咳痰 6 年，每逢冬季加重，2 周来上述症状加重，并咳脓痰，体检双肺底可闻湿啰音。此患者最可能的诊断是

A.支气管哮喘

B.支气管扩张

C.慢性喘息型支气管炎

D.慢性阻塞性肺气肿

E.慢性支气管炎急性发作期

132、（A2 型选择题）男性，52 岁，反复咳嗽、咳痰 6 年，每逢冬季加重，2 周来上述症状加重，并咳脓痰，体检双肺底可闻湿啰音。此患者 3 年来逐渐出现呼吸困难，活动后加重，下列哪项检查所见，对判断呼吸困难的原因最有意义

A.肺功能检查残气/肺总量 $> 40\%$

- B.X 线透亮度增加，心影狭小
- C.呼吸音减弱，呼气延长
- D.心电图示肢体导联低电压
- E.桶状胸，叩诊过清音，肺肝界下移

133、（A3/A4 型选择题）女性，30 岁，发现室间隔缺损 20 年。1 个月来出现不规则发热，体温 37.5℃左右。入院前已经不规则使用抗生素 2 周。查体：皮肤、结膜下有瘀点，胸骨左缘 3、4 肋间 4/6 级收缩期杂音，脾大，杵状指。化验血红蛋白 75g/L。初步诊断为

- A.慢性白血病
- B.贫血性心脏病
- C.系统性红斑狼疮
- D.亚急性感染性心内膜炎
- E.室间隔缺损，心力衰竭

134、（A3/A4 型选择题）女性，30 岁，发现室间隔缺损 20 年。1 个月来出现不规则发热，体温 37.5℃左右。入院前已经不规则使用抗生素 2 周。查体：皮肤、结膜下有瘀点，胸骨左缘 3、4 肋间 4/6 级收缩期杂音，脾大，杵状指。化验血红蛋白 75g/L。该患者可能的致病菌是

- A.真菌

B.肠球菌

C.肺炎链球菌

D.金黄色葡萄球菌

E.草绿色链球菌

135、（A3/A4 型选择题）女性，30 岁，发现室间隔缺损 20 年。1 个月来出现不规则发热，体温 37.5℃左右。入院前已经不规则使用抗生素 2 周。查体：皮肤、结膜下有瘀点，胸骨左缘 3、4 肋间 4/6 级收缩期杂音，脾大，杵状指。化验血红蛋白 75g/L。若患者的血培养结果为阴性，有助于诊断的检查是

A.胸片

B.全血分析

C.超声心动图

D.肝肾功能

E.肝、胆、脾超声

136、（A3/A4 型选择题）女性，30 岁，发现室间隔缺损 20 年。1 个月来出现不规则发热，体温 37.5℃左右。入院前已经不规则使用抗生素 2 周。查体：皮肤、结膜下有瘀点，胸骨左缘 3、4 肋间 4/6 级收缩期杂音，脾大，杵状指。化验血红蛋白 75g/L。本病与风湿热鉴别时，最有帮助的是

A.血沉

- B.体温高度
- C.肝肾功能
- D.皮肤瘀点
- E.白细胞计数

137、（A3/A4 型选择题）女性，56 岁，3 个月前因肺癌行手术治疗。10 天来感气短、下肢水肿。1 天来症状加重。查体：BP105/84mmHg，呼吸急促，颈静脉怒张，双肺未闻及啰音，心界两侧扩大，HR120 次/分，心音遥远，有奇脉，肝脏肋下 2cm，下肢水肿。心电图示窦速。该患者诊断为

- A.心力衰竭
- B.心包压塞
- C.呼吸衰竭
- D.心动过速
- E.上腔静脉综合征

138、（A3/A4 型选择题）女性，56 岁，3 个月前因肺癌行手术治疗。10 天来感气短、下肢水肿。1 天来症状加重。查体：BP105/84mmHg，呼吸急促，颈静脉怒张，双肺未闻及啰音，心界两侧扩大，HR120 次/分，心音遥远，有奇脉，肝脏肋下 2cm，下肢水肿。心电图示窦速。为了证实诊断，应该立即做哪一项检查

- A.胸片
- B.心电图
- C.心导管检查
- D.超声心动图
- E.心脏同位素

139、（A3/A4 型选择题）女性，56 岁，3 个月前因肺癌行手术治疗。10 天来感气短、下肢水肿。1 天来症状加重。查体：BP105/84mmHg，呼吸急促，颈静脉怒张，双肺未闻及啰音，心界两侧扩大，HR120 次/分，心音遥远，有奇脉，肝脏肋下 2cm，下肢水肿。心电图示窦速。证实诊断后,应立即采取哪一项急救措施

- A.吸氧
- B.多巴胺
- C.西地兰
- D.补充血容量
- E.心包穿刺抽液

140、（A3/A4 型选择题）女性，56 岁，3 个月前因肺癌行手术治疗。10 天来感气短、下肢水肿。1 天来症状加重。查体：BP105/84mmHg，呼吸急促，颈静脉怒张，双肺未闻及啰音，心界两侧扩大，HR120 次/分，心音遥远，有奇

脉，肝脏肋下 2cm，下肢水肿。心电图示窦速。首次行该操作时，抽液量应

- A.50ml
- B.80ml
- C.100~200ml
- D.300ml
- E.1000ml

141、（A3/A4 型选择题）女，33 岁，患胆囊结石 5 年。饱餐后持续上腹疼痛 16 小时，向腰背部放射，伴恶心、呕吐、发热。查体：上腹明显压痛，Murphy 征阴性，肋脊角无压痛及叩痛。诊断首先考虑为

- A.急性胃炎
- B.泌尿系结石
- C.急性胰腺炎
- D.肠梗阻
- E.消化性溃疡

142、（A3/A4 型选择题）女，33 岁，患胆囊结石 5 年。饱餐后持续上腹疼痛 16 小时，向腰背部放射，伴恶心、呕吐、发热。查体：上腹明显压痛，Murphy 征阴性，肋脊角无压痛及叩痛。为了明确诊断，首选的检查是

- A.胃镜
- B.尿常规
- C.血淀粉酶
- D.尿淀粉酶
- E.X 线钡餐检查

143、（A3/A4 型选择题）男性，30 岁，发现“风湿性瓣膜病”2 年。2 周前因感冒出现呼吸困难，咳嗽，不能平卧。查体:半卧位，颈静脉充盈，双肺底湿啰音。心率 127 次/分，心房颤动，可闻开瓣音，心尖部舒张期杂音,肝肋下 0.5cm，下肢轻度水肿。以下哪项结果与病情不符合

- A.心电图示左房肥大
- B.心电图示右室肥大
- C.X 线示心影呈“梨形心”
- D.X 线示心影呈“靴形心”
- E.超声心动图示后叶前向移动和瓣叶增厚

144、（A3/A4 型选择题）男性，30 岁，发现“风湿性瓣膜病”2 年。2 周前因感冒出现呼吸困难，咳嗽，不能平卧。查体:半卧位，颈静脉充盈，双肺底湿啰音。心率 127 次/分，心房颤动，可闻开瓣音，心尖部舒张期杂音,肝肋下 0.5cm，下肢轻度水肿。此时首选的治疗是

A.静脉注射维拉帕米

B.静脉注射利多卡因

C.静脉注射毛花苷 C

D.静脉注射胺碘酮

E.电复律

145、（A3/A4 型选择题）男性，30 岁，发现“风湿性瓣膜病”2 年。2 周前因感冒出现呼吸困难，咳嗽，不能平卧。查体:半卧位，颈静脉充盈，双肺底湿啰音。心率 127 次/分，心房颤动，可闻开瓣音，心尖部舒张期杂音,肝肋下 0.5cm，下肢轻度水肿。经过治疗病情平稳，口服地高辛 0.25mg/天维持治疗。1 天前感胸闷、恶心，HR67 次/分。心电图示心房颤动伴频发室性期前收缩。此时的治疗应在补钾基础上

A.地高辛减半量

B.停用地高辛

C.维持原剂量

D.地高辛增加剂量

E.继续使用，同时静注利多卡因

146、（A3/A4 型选择题）男性，30 岁，发现“风湿性瓣膜病”2 年。2 周前因感冒出现呼吸困难，咳嗽，不能平卧。查体:半卧位，颈静脉充盈，双肺底湿

啰音。心率 127 次/分，心房颤动，可闻开瓣音，心尖部舒张期杂音，肝肋下 0.5cm，下肢轻度水肿。病情好转后，为了缓解二尖瓣狭窄，首选的治疗方法是

- A.继续药物治疗
- B.二尖瓣闭式分离术
- C.二尖瓣直视分离术
- D.人工瓣膜置换术
- E.经皮二尖瓣球囊扩张术

147、（A3/A4 型选择题）男性，30 岁，发现“风湿性瓣膜病”2 年。2 周前因感冒出现呼吸困难，咳嗽，不能平卧。查体：半卧位，颈静脉充盈，双肺底湿啰音。心率 127 次/分，心房颤动，可闻开瓣音，心尖部舒张期杂音，肝肋下 0.5cm，下肢轻度水肿。患者未行特殊治疗。半年后，发现下肢水肿逐渐明显，而呼吸困难明显减轻。其原因是

- A.病情自然好转
- B.病情自然痊愈
- C.恢复成了窦性心律
- D.添加了其他瓣膜损害
- E.右心衰减轻了左房压

148、（A3/A4 型选择题）女，30 岁，冬春季节上腹痛发作已有 4 年，近半个月来上腹痛加重，伴反酸及饥饿痛，并有半夜痛，痛醒后进食使疼痛缓解，一小时前突然发作上腹部刀割样剧痛，大汗淋漓，面色苍白，腹痛迅速蔓延至全腹而来院急诊。该患者在体检时最有意义的体征是

- A. 肠鸣音亢进
- B. 振水音阳性
- C. 腹部板状强直
- D. 移动性浊音阳性
- E. 肝浊音界消失

149、（A3/A4 型选择题）女，30 岁，冬春季节上腹痛发作已有 4 年，近半个月来上腹痛加重，伴反酸及饥饿痛，并有半夜痛，痛醒后进食使疼痛缓解，一小时前突然发作上腹部刀割样剧痛，大汗淋漓，面色苍白，腹痛迅速蔓延至全腹而来院急诊。首选用哪项检查来协助作出诊断

- A. 血白细胞分类计数
- B. 血清淀粉酶
- C. 腹部平片
- D. B 型超声
- E. 急诊胃镜检查

150、（A3/A4 型选择题）女，30 岁，冬春季节上腹痛发作已有 4 年，近半个月来上腹痛加重，伴反酸及饥饿痛，并有半夜痛，痛醒后进食使疼痛缓解，一小时前突然发作上腹部刀割样剧痛，大汗淋漓，面色苍白，腹痛迅速蔓延至全腹而来院急诊。据上述症状、体征及检查考虑诊断为何病

- A.胆石症
- B.胆道蛔虫病
- C.急性胰腺炎
- D.溃疡病穿孔
- E.消化道出血

答案

1、正确答案：D

答案解析：

2、正确答案：E

答案解析： 【解析】 24 小时咯血量在 100ml 以内为小量咯血；100～500ml 为中等量咯血；在 500ml 以上、或一次咯血量达 500ml 以上、或不论咯

血量多少只要出现窒息者，均为大咯血。

3、正确答案：D

答案解析：【解析】：主动脉瓣关闭不全，主动脉反流，使收缩压升高，舒张压降低，脉压增大，出现周围血管征。

4、正确答案：B

答案解析：记忆题

5、正确答案：B

答案解析：

6、正确答案：B

答案解析：解析：呼吸深慢又称为库斯莫尔呼吸，节律匀齐，呼吸深而大（吸气慢而深，呼气短促），病人不感呼吸困难的呼吸。常见于酸中毒的患者。

7、正确答案：D

答案解析：

8、正确答案：D

答案解析：解析：肺炎链球菌性肺炎是最常见的细菌性肺炎，约占社区获得性肺炎的 40%~50%，典型 X 线表现为肺段、肺叶实变，也是引起大叶性肺炎

最常见的致病菌。

9、正确答案：D

答案解析：解析：这个知识点经常考，二尖瓣狭窄导致肺静脉压增高，肺静脉压力增高导致肺动脉增高，长期肺动脉高压引起肺小动脉痉挛，最终导致肺小动脉硬化，更加加重肺动脉高压，肺动脉高压增加右心室后负荷，引起右心室肥厚扩张，最终致右心衰竭，此时肺动脉压力有所减低，肺循环血液有所减少，肺淤血一定程度缓解，所以呼吸困难得到缓解。

10、正确答案：A

答案解析：记忆题

11、正确答案：D

答案解析：解析：动脉导管未闭可听到胸骨左缘第2肋间可闻及连续性机械样杂音，收缩晚期增强并向锁骨上窝传导；肺动脉高压严重者，仅可闻及收缩期杂音或无杂音，肺动脉瓣第2音亢进。

12、正确答案：C

答案解析：解析：ACEI及ARB药物禁用于孕妇、双侧肾动脉狭窄、单肾伴肾动脉狭窄、主动脉狭窄、严重梗阻性心肌病。ACEI及ARB药物如用于双侧肾动脉狭窄者，可导致血肌酐水平的急剧上升，加重肾衰竭。故选C。

13、正确答案：D

答案解析：解析：要想判断肺结核是否有传染性，主要是看痰液当中的检查，痰液当中如果能找到结核菌，就有传染性。痰液当中找不到结核菌就没有传染性，所以痰培养或者是痰找抗酸杆菌是比较关键。

14、正确答案：E

答案解析：

15、正确答案：E

答案解析：

16、正确答案：E

答案解析：解析：周围血管征指的是在某些疾病条件下，检查周围血管时所发现的血管搏动或波形的改变。常见于主动脉瓣关闭不全、动脉导管未闭、主动脉瓣狭窄、缩窄性心包炎与急性心包炎、冠状动脉粥样硬化性心脏病、高血压性心脏病、梗阻型肥厚型心肌病、甲状腺功能亢进症、贫血等。

17、正确答案：C

答案解析：记忆题

18、正确答案：C

答案解析：

19、正确答案：C

答案解析： 解析：室性期前收缩的心电图特点是：提前出现的宽大 QRS 波，宽大 QRS 波前无 P 波，其 T 波方向与 QRS 主波方向相反，常有完全性代偿间期，QRS 波时间 $\geq 0.12s$ 。

20、正确答案：B

答案解析：记忆题

21、正确答案：D

答案解析： 解析：恶性肿瘤淋巴结转移：胃癌、食管癌多向左侧锁骨上淋巴结群转移，因此处系胸导管进颈静脉的入口，这种肿大淋巴结称为 Virchow 淋巴结，常为胃癌、食管癌转移的标志。

22、正确答案：D

答案解析： 解析：甲状腺功能亢进时，由于进食多而易饥，加之过多的甲状腺素分泌，兴奋胃肠平滑肌使胃肠蠕动增快，引起消化不良，大便频繁。而与肠内容物渗透压增高、渗出物增多、肠液分泌增多及 VIP 作用关系不大。

23、正确答案：A

答案解析：

24、正确答案：E

答案解析： 解析：干性支气管扩张指的是患者以反复咯血为唯一表现，其病变多位于引流良好的上叶支气管。

25、正确答案：B

答案解析：解析：心脏骤停一旦确诊，应立刻进行下列两项处理，首先立即尝试胸外按压恢复心律，其次是清理患者呼吸道，保持气道通畅。

26、正确答案：C

答案解析：

27、正确答案：B

答案解析：记忆题

28、正确答案：D

答案解析：记忆题

29、正确答案：C

答案解析：

30、正确答案：C

答案解析：

31、正确答案：A

答案解析：解析：COPD 系由多种有害因素的长期刺激致终末细支气管远端的病变，造成不可逆的小气道阻塞。大气道阻塞见于异物、肿瘤等所导致气流不能进入肺内，与 COPD 所致的气流呼出不畅相反；双肺哮鸣音虽可见于喘息

型慢支，但更多见于支气管哮喘；桶状胸见于严重肺气肿患者，亦可发生于老年或矮胖体型者；胸片示肺野透亮度增加仅能提示肺气肿的存在。

32、正确答案：B

答案解析：

33、正确答案：C

答案解析：记忆题

34、正确答案：C

答案解析：【解析】支气管扩张症的典型表现是长期慢性咳嗽、咯大量脓痰、反复咯血和反复肺部感染。由于支气管动脉和肺动脉的终末枝常伴随气管腔扩张并吻合，有的毛细血管扩张成血管瘤，以致病人在咳嗽时，引起血管壁或血管瘤破裂，引起反复咯血或大咯血。咯血或大咯血都容易出现窒息，需积极进行止血治疗，组织抢救。

35、正确答案：C

答案解析：解析：本题考查支气管哮喘典型的临床症状表现。支气管哮喘的典型症状为反复发作性伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难。其他答案不是该病的典型症状，故本题选 C 答案。

36、正确答案：C

答案解析：【解析】吸氧、应用糖皮质激素都是 ARDS 的治疗措施，但最有

效的措施是呼气末正压通气(PEEP)。呼气末正压通气使呼气末肺容量增加，闭陷了的小气道和肺泡再开放，肺泡内的正压也可减轻肺水肿的进一步形成或恶化，从而改善弥散通气和通气 / 血流比例，达到改善氧合功能和肺顺应性的目的。

37、正确答案：B

答案解析：

38、正确答案：E

答案解析：解析：正常细胞性贫血红细胞平均体积（MCV）80~100fl，红细胞平均血红蛋白浓度 32~35%，常见于再血障碍性贫血、纯红细胞再生障碍性贫血、溶血性贫血、骨髓病性贫血、急性失血性贫血。

39、正确答案：D

答案解析：

40、正确答案：E

答案解析：解析：肺结核的诊断可以结合病史、症状体征、影像学诊断、痰结核分枝杆菌检查等，其中胸部 X 线检查是诊断肺结核的重要方法，可以发现早期轻微病变，故选 E 。 A、B、C、D 均属于诊断的一个方面，但不是早期发现肺结核的最主要方法，故不选 。

41、正确答案：E

答案解析：

42、正确答案：C

答案解析：

43、正确答案：D

答案解析：解析：扩张型心肌病的病理改变是心肌细胞肥大、变性，间质纤维化。扩张型心肌病的主要特征是左心室或右心室明显扩大和心肌收缩功能减退，常伴心力衰竭、心律失常、血栓栓塞并发症。

44、正确答案：B

答案解析：解析：医院内获得性肺炎指病人入院时不存在，也不处于感染潜伏期，而在入院 48 小时后在院内发生肺炎。常见病原菌为革兰阴性杆菌，包括铜绿假单胞菌、肺炎杆菌、大肠埃希菌等。

45、正确答案：E

答案解析：解析：咳大量脓臭痰是肺脓肿与肺炎等其他肺实变明显不同的特点。

46、正确答案：C

答案解析：风湿性心脏病是二尖瓣狭窄最主要的病因。

47、正确答案：D

答案解析：记忆题

48、正确答案：E

答案解析：解析：慢性粒细胞白血病患者有乏力、低热、多汗或盗汗、体重减轻等代谢亢进的症状，常以脾脏肿大为最显著体征，往往就医时已达脐或脐以下，质地坚实、平滑，无压痛。其余各项疾病亦可有脾脏肿大表现，但不似慢性粒细胞白血病时脾脏肿大典型及多见。

49、正确答案：E

答案解析：解析：洋地黄中毒可出现各种心律失常，但以室性期前收缩二联律最为多见。

50、正确答案：E

答案解析：解析：变异性心绞痛的发病原因是由于冠状动脉的痉挛而引起的。这种痉挛可能会导致冠状动脉的收缩。这样会使动脉血管内腔缩窄，引起心脏供血减缓甚至停止。故会在心电图上出现短暂的ST段抬高。

51、正确答案：D

答案解析：

52、正确答案：D

答案解析：

53、正确答案：B

答案解析：解析：冠状动脉粥样硬化最常发生于左冠状动脉的前降支。

54、正确答案：E

答案解析：解析：幽门梗阻主要发生于十二指肠溃疡或幽门管溃疡。

55、正确答案：E

答案解析：解析：贝克三联征（Beck 三联征）：在心包积液、心包积血或缩窄性心包炎等心脏扩张受限时，出现心室舒张的障碍，出现以下体征：①心音遥远，心搏动减弱；②颈静脉怒张；③低血压。

56、正确答案：A

答案解析：解析：大量积液可使收缩压降低，而舒张压变化不大，故脉压变小。按积液时心脏压塞程度，脉搏可正常、减弱或出现奇脉。大量积液可累及静脉回流，出现颈静脉怒张、肝肿大、皮下水肿及腹水等。

57、正确答案：B

答案解析：非干酪性肉芽肿是克罗恩病的特征病理改变。

58、正确答案：E

答案解析：

59、正确答案：E

答案解析：解析：上消化道出血是其最突出的症状，可表现为呕血或黑粪

60、正确答案：C

答案解析：

61、正确答案：A

答案解析：

62、正确答案：E

答案解析：急性胃炎是指的是在各种外在或者内在因素引起的急性广泛性或局限性的胃黏膜的急性的炎症。与呼吸困难无明显关系。

63、正确答案：D

答案解析：解析：水肿型和出血坏死型胰腺炎都表现上腹剧痛向左腰背部放射、发热、呕吐，血尿淀粉酶、脂肪酶增高，B超检查胰腺增大等。出血坏死型胰腺炎表现较重，腹膜炎范围宽、体征重，腹胀明显，肠鸣音弱或消失，可见 Cullen 征和 Grey-Turner 征，腹水呈血性或脓性，可伴休克，可并发脏器功能障碍和严重的代谢障碍，白细胞增高，血糖升高，血钙降低，MODS 等。

64、正确答案：C

答案解析：

65、正确答案：D

答案解析：解析：咳嗽伴咯血，常见于支气管扩张、肺结核、肺脓肿、支气管肺癌、二尖瓣狭窄、支气管结石、肺含铁血黄素沉着症等。

66、正确答案：C

答案解析：血浆胶体渗透压主要由血浆蛋白构成,其中白蛋白含量多、分子量相对较小，是构成血浆胶体渗透压的主要成分。渗透压大小：清蛋白>球蛋白>纤维蛋白原

67、正确答案：C

答案解析：解析：海洋性贫血及铁粒幼细胞性贫血都是总铁结合力降低、血清铁及转铁蛋白饱和度升高，故不选 A、E。感染性贫血血清铁、总铁结合力及转铁蛋白饱和度减低，故不选 B。缺铁性贫血血清铁减低，总铁结合力增高及转铁蛋白饱和度减低，故选 C。再生障碍性贫血是一种获得性骨髓造血功能衰竭症，是正细胞正色素性贫血，故不选 D。

68、正确答案：E

答案解析：间停呼吸(Biots 呼吸) 表现为有规律的呼吸几次后，突然停止一段时间，又开始呼吸，周而复始。发生机制是由于呼吸中枢的兴奋性降低，使调节呼吸的反馈系统失常，只有在严重的缺氧和二氧化碳积聚到一定的时候，才能有效刺激呼吸中枢，进入到下一个呼吸周期。间停呼吸的临床意义:多发生于中枢神经系统疾病，如脑炎、脑膜炎、颅内高压及某些中毒，如糖尿病酮症酸中毒、巴比妥中毒等。

69、正确答案：C

答案解析：

70、正确答案：D

答案解析：解析：上消化道出血是指 Treitz 韧带以上的消化道,包括食管、胃、十二指肠或胰胆等病变引起的出血。

71、正确答案：C

答案解析：老年男性，乏力,消瘦，吸烟 40 年，首先考虑肺肿瘤。

72、正确答案：C

答案解析：

73、正确答案：B

答案解析：根据临床表现及杂音位置特点可以诊断为主动脉瓣狭窄。

74、正确答案：D

答案解析：解析：该患者有慢性乙型肝炎，脾大，怀疑肝炎后肝硬化导致的食管、胃底静脉曲张破裂大出血。生长抑素是目前临床上用于治疗胃底静脉曲张破裂大出血的药物。故选 D。三腔二囊管压迫目前已不推荐使用，其应用只限于药物不能控制出血时暂时止血。

75、正确答案：C

答案解析：环境改变后咳嗽气喘，肺部哮鸣音，首先考虑支气管哮喘

76、正确答案：E

答案解析：解析:心电图提示可能发生洋地黄中毒,因此首要措施是停用洋地黄类药物。

77、正确答案：D

答案解析：

78、正确答案：A

答案解析：

79、正确答案：B

答案解析：

80、正确答案：C

答案解析：

81、正确答案：B

答案解析：

82、正确答案：D

答案解析：

83、正确答案：B

答案解析：

84、正确答案：C

答案解析：

85、正确答案：C

答案解析：

86、正确答案：C

答案解析：解析：肺结核的临床症状：咳嗽、咳痰、咯血、胸痛、呼吸困难。全身症状中发热最常见，部分患者有倦怠、盗汗、食欲减退、体重减轻等。浸润性肺结核病变多发生在肺尖和锁骨下，影像学为小片状可融合和形成空洞。故选C。

87、正确答案：E

答案解析：

88、正确答案：D

答案解析：老年女性，食后哽噎感，首先考虑食管癌。

89、正确答案：B

答案解析：解析：COPD 患者应长期家庭氧疗，目的是纠正低氧血症，能延长 COPD 患者的生存期，降低病死率。

90、正确答案：C

答案解析：解析:患者有吸烟史,慢性咳嗽,咳痰,劳累时有气急,两肺呼吸音减弱,肺下界下移均为肺气肿体征。

91、正确答案：E

答案解析：

92、正确答案：C

答案解析：

93、正确答案：D

答案解析：;解析:根据题干所述,提示为结核性腹膜炎,而腹腔镜活组织检查具有确诊价值,故选 D 。

94、正确答案：B

答案解析：

95、正确答案：D

答案解析：中度不典型增生，最重要的措施是定期胃镜检查追踪观察，防止进一步加重，甚至癌变。

96、正确答案：D

答案解析：

97、正确答案：C

答案解析：

98、正确答案：D

答案解析：

99、正确答案：C

答案解析：根据临床表现诊断为低血糖所致的糖尿病酮症酸中毒。

100、正确答案：B

答案解析：解析：若盲肠（包括阑尾）、乙状结肠或膀胱随之下移而成为疝囊壁的一部分。这种疝称为滑动疝，也属难复性疝。

101、正确答案：C

答案解析：解析：该患者1个月来粪便中有黏液或脓血，不能排除结直肠肿瘤可能，所以应常规首要进行直肠指检。

102、正确答案：C

答案解析：

103、正确答案：C

答案解析：

104、正确答案：D

答案解析：双下肢对称性皮炎，多为过敏性紫癜

105、正确答案：C

答案解析：

106、正确答案：C

答案解析：

107、正确答案：C

答案解析：幼儿玩耍突然出现刺激性咳嗽，呼吸困难，极有可能将异物吃进去卡到气管所致。

108、正确答案：C

答案解析：解析：强迫症是以强迫症状为主要表现的一类神经症，强迫症状包括强迫观念和强迫行为。强迫症的诊断要点：符合神经症的一般特点，至少一项症状持续3个月以上，患者对强迫症感到苦恼并影响日常生活和工作。

109、正确答案：B

答案解析：心尖搏动向左下移位最可能是左心室增大

110、正确答案：E

答案解析：【解析】：吲哚美辛为非甾体抗炎药，可能引起糜烂性出血性胃炎。胃镜检查是目前上消化道出血的首选检查方法。检查多主张在出血后

24~48 小时内进行，称急诊胃镜检查。故选 E。

111、正确答案：A

答案解析：

112、正确答案：B

答案解析：

113、正确答案：C

答案解析：

114、正确答案：A

答案解析：

115、正确答案：B

答案解析：

116、正确答案：B

答案解析：

117、正确答案：C

答案解析：

118、正确答案：C

答案解析：

119、正确答案：A

答案解析：

120、正确答案：B

答案解析：

121、正确答案：E

答案解析：

122、正确答案：D

答案解析：

123、正确答案：A

答案解析：

124、正确答案：E

答案解析：

125、正确答案：D

答案解析：

126、正确答案：B

答案解析：

127、正确答案：E

答案解析：

128、正确答案：E

答案解析：

129、正确答案：B

答案解析：

130、正确答案：C

答案解析：

131、正确答案：E

答案解析：

132、正确答案：A

答案解析：

133、正确答案：D

答案解析：

134、正确答案：E

答案解析：

135、正确答案：C

答案解析：

136、正确答案：D

答案解析：

137、正确答案：B

答案解析：

138、正确答案：D

答案解析：

139、正确答案：E

答案解析：

140、正确答案：C

答案解析：

141、正确答案：C

答案解析：

142、正确答案：C

答案解析：

143、正确答案：D

答案解析：

144、正确答案：C

答案解析：

145、正确答案：B

答案解析：

146、正确答案：E

答案解析：

147、正确答案：E

答案解析：

148、正确答案：E

答案解析：

149、正确答案：C

答案解析：

150、正确答案：D

答案解析：

