

第二单元

A1 型选择题(1~85 题)

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 消毒窝洞理想的药物应该是
 - A. 消毒力弱,刺激性小,不损伤深层牙髓活力
 - B. 刺激性小,渗透性小,向深层组织侵袭
 - C. 刺激性大,消毒力强,足以杀灭细菌
 - D. 消毒力强,刺激性小,渗透性小,不使牙体组织变色
 - E. 消毒力适中,刺激性小,渗透性大,不使牙体组织变色
2. 发生于婴儿翼突钩处的溃疡最常见的是
 - A. Bednar 溃疡
 - B. 褥疮性溃疡
 - C. 阿弗他溃疡
 - D. Riga-Fede 溃疡
 - E. 白塞病
3. 制备倒凹是为了
 - A. 获得良好的抗力形
 - B. 便于充填
 - C. 美观
 - D. 获得良好的固位形
 - E. 便于放置盖髓剂
4. 牙周疾病流行特征不包括
 - A. 地区分布
 - B. 时间分布
 - C. 城乡分布
 - D. 年龄分布
 - E. 细菌种群分布标准
5. 牙内陷最严重情况是
 - A. 畸形舌侧窝
 - B. 牙中牙
 - C. 畸形舌侧尖
 - D. 畸形根面沟
 - E. 锥形牙
6. 下列牙周病的维护治疗,哪一项不正确
 - A. 维护治疗与预后密切相关
 - B. 应在基础治疗一结束时,即进入维护期
 - C. 复查间隔应根据患者具体情况而定
 - D. 对治疗反应好的患者不需维护期治疗
 - E. 复查时应对残存的病情进行必要的治疗
7. 根柱较长、牙龈无明显退缩的 II 度根分叉病变最理想的治疗方法是
 - A. 根面平整术
 - B. GTR 手术
 - C. 牙龈切除术
 - D. 改良 Widman 翻瓣术及骨修整术
 - E. 根向复位瓣及骨修整术
8. 对于牙本质过敏症首选的治疗方法有
 - A. 药物脱敏
 - B. 牙髓治疗
 - C. 牙周洁治
 - D. 垫底充填
 - E. 树脂充填
9. 乳牙患龋的高峰年龄是
 - A. 3~4 岁

- B. 5~6 岁
C. 7~8 岁
D. 9~10 岁
E. 11~12 岁
10. 我国发生的严重急性呼吸窘迫综合征 (SARS), 很快波及许多省市。这种发病情况称为
A. 暴发
B. 流行
C. 季节性升高
D. 周期性流行
E. 长期变异
11. 下颌第一前磨牙开髓时, 最易侧穿的部位
A. 舌侧
B. 近中颈部
C. 远中颈部
D. 颊侧
E. 以上都不是
12. 以下疾病中不具有癌变倾向的是
A. 口腔白斑病
B. 口腔红斑病
C. 口腔扁平苔藓
D. 盘状红斑狼疮
E. 坏死性黏膜腺周围炎
13. 恒牙龋病的好发牙位为
A. 下颌第一磨牙
B. 上颌第一磨牙
C. 前磨牙
D. 上前牙
E. 下前牙
14. 窝沟封闭术的基础是
A. 酸的发明
B. 釉质结构、牙本质结构的了解
C. 酸蚀技术的应用
D. 黏结树脂的发明
E. 酸蚀技术和黏结树脂的发展与完善
15. 以下哪一部位的菌斑与牙周组织的破坏关系最为密切
A. 光滑面菌斑
B. 殆面点隙裂沟菌斑
C. 邻面菌斑
D. 颈缘菌斑
E. 龈下菌斑
16. 窝洞制备中不属于抗力形设计的是
A. 盒状洞形
B. 有一定深度
C. 邻殆面洞制备阶梯
D. 邻殆面洞制备梯形
E. 窝洞外形呈圆缓曲线
17. 下列根管扩大成形时的注意事项, 错误的是
A. 较细的根管或根管口有阻塞时, 可先用球钻或大号扩孔钻将根管口稍扩大
B. 凡旋转式的器械, 一般旋转不要超过半圈
C. 遇狭窄或钙化根管可配合使用 EDTA 加大力量通过
D. 边扩锉边冲洗
E. 应在工作长度内进行操作
18. 奶瓶龋好发于
A. 上颌乳切牙的光滑面和第一乳磨牙的殆面
B. 下颌乳切牙的光滑面和第一乳磨牙的殆面
C. 上颌前牙的光滑面和磨牙的殆面
D. 下颌前牙的光滑面和磨牙的殆面
E. 全部乳牙
19. 学校饮水氟浓度是公共饮水氟浓度的多少倍
A. 1.5 倍

- B. 2.5 倍
C. 3.5 倍
D. 4.5 倍
E. 5.5 倍
20. 下列关于根管充填的时机,不正确的是
A. 无自觉症状
B. 无明显叩痛
C. 根管内无渗出
D. 根尖区暗影消失
E. 髓腔无异味
21. 治疗盘状红斑狼疮可选用
A. 三氮唑核苷
B. 氯化喹啉
C. 氯己定
D. 氟康唑
E. 维甲酸
22. 关于根管充填的目的和作用,不正确的是
A. 消除根管内残余感染
B. 阻断根管与根尖组织的交通
C. 封闭根管系统,阻止再感染
D. 促进根尖周病变愈合
E. 去除牙髓组织
23. 下列哪项不属于急性浆液性根尖周炎的临床表现
A. 可有牙体硬组织疾患,或可看到深牙周袋
B. 叩痛(+ ~ ++)
C. 疼痛不能定位
D. 患牙可有 I° 松动
E. X 线检查根尖周组织影像无明显变化
24. 口腔科感染控制的最突出问题是
A. 手机头消毒较困难
B. 对消毒灭菌原理知之不多
C. 对制度执行不严
D. 消毒灭菌缺少严格分类
E. 是对控制感染的正确估价
25. 急性化脓性根尖周炎最常见的排脓途径为
A. 根尖孔—根管—冠部缺损
B. 根尖周—骨膜下—黏膜下
C. 根尖周—骨膜下—皮肤
D. 根尖周—骨膜下—上颌窦
E. 根尖部—牙周袋
26. 做牙髓活力温度测验时,应将冷热刺激源置于
A. 待测牙唇(颊)面颈 1/3 或中 1/3 处
B. 待测牙殆面中央
C. 待测牙腭舌侧中 1/3
D. 待测牙唇颊面切殆 1/3
E. 待测牙舌腭侧切殆 1/3
27. 去除龈下菌斑与牙结石属于社区牙周保健
A. 基本急诊保健
B. 一级水平
C. 二级水平
D. 三级水平
E. 四级水平
28. 根管和根尖周的感染是
A. 以厌氧菌为主的混合感染
B. 以需氧菌为主的混合感染
C. 厌氧菌的感染
D. 需氧菌的感染
E. 兼性厌氧菌的感染
29. 未经磨耗的年轻恒磨牙咬合面沟嵴清晰,备洞时不易确定洞形的边缘,最理想的龋病治疗方法是
A. 银汞充填
B. 复合树脂充填
C. 窝沟封闭
D. 再矿化治疗 + 银汞充填
E. B + C

30. 在深龋中,细菌可以通过暴露的牙本质小管感染牙髓。下列说法正确的是
- 牙本质厚度 $< 2\text{mm}$, 牙髓内可找到细菌
 - 牙本质厚度 $< 1.1\text{mm}$, 牙髓内可找到细菌
 - 牙本质厚度 $< 0.5\text{mm}$, 牙髓内可找到细菌
 - 牙本质厚度 $< 0.2\text{mm}$, 牙髓内可找到细菌
 - 牙本质厚度 $< 1.5\text{mm}$, 牙髓内可找到细菌
31. 龋病的一级预防包括
- 根管治疗、健康教育
 - 早期诊断、早期治疗
 - 窝沟封闭、氟防龋
 - 健康教育、充填治疗
 - 早期诊断、氟防龋
32. X 线检查在下列疾病的诊断中具有十分重要的意义,除外
- 急性浆液性根尖周炎
 - 邻面龋
 - 畸形中央尖
 - 根折
 - 慢性根尖周炎
33. 牙本质过敏症主要表现为
- 自发痛
 - 阵发痛
 - 夜间痛
 - 激发痛
 - 放射痛
34. 以下哪一种疾病愈合后一般不留瘢痕
- 腺周口疮
 - 带状疱疹
 - 白塞病中的生殖器溃疡
 - 口腔黏膜纤维性变
 - 褥疮性溃疡
35. 龋病的好发牙面依次是
- 舌面、邻面、咬合面
 - 颊面、咬合面、邻面
 - 咬合面、邻面、颊面
 - 咬合面、舌面、邻面
 - 舌面、咬合面、颊面
36. 金属成品冠修复乳牙窝洞的错误操作是
- 颊面近颈部 $1/3$ 隆起,应较多地切削
 - 颊舌面与邻面相交处制成圆钝状移行
 - 殆面去除 1.0mm 的牙体表面较好
 - 殆面制备时着重切割殆面嵴
 - 牙颈部能有台阶
37. 关于牙萌出异常的描述错误的是
- 早萌多见于下颌恒切牙
 - 早萌的牙根发育不全,甚至无牙根
 - 全口牙迟萌多为系统性疾病或遗传因素影响
 - 恒牙迟萌或异位常常是由于乳牙滞留
 - 一般乳牙很少有异位或萌出困难
38. 某社区准备进行饮水加氟防龋措施。资料显示该地区饮水氟浓度为 $0.1 \sim 0.3\text{mg/kg}$, 氟牙症指数低于 0.6 。经过仔细论证以后。专家小组认为还应该补充考虑的指标是
- 12 岁儿童龋均
 - 6 岁儿童龋均
 - 15 岁龋均
 - 18 岁龋均
 - 35 ~ 44 岁组龋均
39. 不属于楔状缺损致病因素的是
- 横刷牙

- B. 酸蚀
C. 应力疲劳
D. 牙龈退缩
E. 牙颈部结构薄弱
40. 不常发生牙内吸收的牙是
A. 做过盖髓术的牙齿
B. 做过活髓切断术的牙齿
C. 受过外伤的牙齿
D. 再植牙
E. 做过贴面的牙齿
41. 引起根尖周病化学因素的下列叙述中, 最全面的一项是
A. 主要是根管内用药不当的刺激
B. 化学性刺激均为医源性刺激
C. 超出根尖孔的塑化剂刺激
D. 主要是牙髓失活剂超过用药期限的刺激
E. 根管治疗超填物的刺激
42. 诊断深龋时的注意事项错误的是
A. 探龋洞的深度和感觉
B. 问自觉症状及其时间
C. 叩诊是否有异常反应
D. 探清楚穿髓孔的有无
E. 温度测验必须进入龋洞
43. 根管治疗术后疗效评估观察时间为
A. 1年
B. 半年
C. 2年
D. 3~5年
E. 5年以上
44. 乳牙慢性根尖周炎瘻管常出现的位置是
A. 颊侧根分叉黏膜
B. 舌侧黏膜
C. 龈沟内
D. 根尖区黏膜
E. 近中根尖黏膜
45. 逆行性牙髓炎的诊断要点包括
A. 有牙髓治疗史
B. 长期牙周炎病史
C. X线片显示髓腔内有局限性不规则的膨大区域
D. 无自觉症状
E. X线片显示髓腔内有阻射的钙化物
46. 目前认为人类主要致龋菌是
A. 唾液链球菌
B. 乳酸杆菌
C. 血链球菌
D. 变形链球菌
E. 轻链球菌
47. 下列哪种发育异常的牙是由两个正常的牙胚融合而成的
A. 融合牙
B. 双生牙
C. 结合牙
D. 额外牙
E. 牙中牙
48. 布莱克窝洞分类的根据是
A. 牙的解剖形态
B. 窝洞所在的部位
C. 龋洞发生的部位
D. 不同牙面的功能
E. 龋损发生的深度
49. 某患者经口腔健康检查发现有牙龈炎, 医生在洁治后推荐他使用以下措施作为辅助治疗
A. 氯己定漱口液
B. 口服抗生素
C. 饭后清水漱口

- D. 静脉注射抗生素
E. 口服甲硝唑
50. 根尖周囊肿最重要的诊断依据是
A. 根尖周 X 线透射区周边有白线围绕
B. 根管内有浅黄透明囊液
C. 囊液可见胆固醇结晶
D. 牙髓无活力
E. 包括以上各项
51. 急性坏死性溃疡性龈炎组织学的分区如下, 除外
A. 坏死区
B. 带状充血区
C. 多形核白细胞浸润区
D. 慢性炎症浸润区
E. 修复区
52. 甲硝唑治疗重度牙周炎的主要作用是能有效杀灭牙周部位的
A. 需氧菌
B. Aa 等兼性厌氧菌
C. Pg 等厌氧微生物
D. 多种念珠菌
E. 局部过度反应的白细胞
53. 下列疾病中哪个属于自身免疫性疾病
A. 白念珠菌病
B. 多形红斑
C. 天疱疮
D. 梅毒
E. 单纯疱疹
54. 牙周病的医源性因素应除外
A. 冠桥及银汞充填的悬突边缘
B. 正畸矫治器过于伸入龈下
C. 过凸的修复体外形
D. 两牙邻面均有充填体
E. 基牙的咬合负担过大
55. 楔状缺损好发于
A. 切牙
B. 尖牙
C. 第一前磨牙
D. 第二前磨牙
E. 磨牙
56. 隐裂发生最多的牙齿是
A. 上颌前磨牙
B. 下颌第一磨牙
C. 上颌第一磨牙
D. 下颌第二磨牙
E. 上颌第二磨牙
57. 与牙周组织破坏关系最为密切的菌斑是
A. 龈下菌斑
B. 龈上菌斑
C. 龈下附着菌斑
D. 龈下非附着菌斑
E. 光滑面菌斑
58. 关于种植体周围组织病变的描述错误的是
A. 种植体周围组织病变的始动因子是菌斑微生物
B. 咬合负载过重是重要促进因素
C. 吸烟是影响种植体周围骨丧失的重要因素
D. 手术技术和术后处理不当易引起种植体周围组织病变
E. 两段式种植体容易感染牙周致病菌
59. 牙周治疗前应预防性应用抗生素, 除外
A. 高血压
B. 风湿性心脏病和先天性心脏病
C. 装有人工心脏瓣膜
D. 糖尿病
E. 尿毒症、肾移植术后
60. 菌斑微生物是牙周病始动因素的证据之一, 以下描述正确的是
A. 牙周病必须用抗生素治疗

- B. 刷牙后牙面会形成菌斑
C. 牙周炎与全身疾病相关
D. 局部机械治疗无效
E. 实验性龈炎
61. 乳牙环状龋多位于
A. 牙冠切 1/3 处
B. 牙冠切 1/3 ~ 中 1/3 处
C. 牙冠中 1/3 ~ 颈 1/3 处
D. 牙冠颈 1/3 处
E. 牙冠殆 1/3 ~ 中 1/3 处
62. 以下哪个细菌在 HIV 阳性患者牙周病中起重要作用
A. 伴放线聚集杆菌
B. 白色念珠菌
C. 牙龈卟啉单胞菌
D. 中间普氏菌
E. 福赛坦菌
63. 关于广泛型侵袭性牙周炎的发病特点哪一项不正确
A. 发病年龄从青春期至 35 岁
B. 病损累及大多数牙
C. 部分有局限型侵袭性牙周炎病史
D. 菌斑的沉积量极大
E. 严重及快速的骨破坏
64. 下列关于牙龈炎的临床表现,说法正确的是
A. 探诊后出血多出现于牙龈颜色改变之后
B. 在炎症明显的部位,牙周探诊的深度常小于组织学上的龈沟深度
C. 可以点彩的有无来判断牙龈有无炎症
D. 重症龈炎可有上皮附着的降低
E. 若炎症局限于龈沟(袋)壁内侧时,牙龈表面仍可保持相当致密
65. 下列哪一项不是牙龈增生的原因
A. 感染
B. 内分泌失调
C. 药物性
D. 创伤性
E. 特发性
66. 氟化物涂布牙齿在不同年龄涂布重点不同,正确的是
A. 1 岁时氟化物应用有效抑制下颌乳前牙龋
B. 2 岁左右儿童涂布药物对乳磨牙有保护作用
C. 4 ~ 5 岁儿童涂布药物增强第一恒磨牙抗酸性
D. 3 岁时涂布药物对控制上颌乳前牙有积极作用
E. 6 岁儿童涂布药物增强第二恒磨牙抗酸性
67. 口炎型口疮的特征是
A. 一般 1 ~ 5 个溃疡,直径 2 ~ 4mm,多发生于唇颊黏膜
B. 多为单个大溃疡,直径超过 1cm,多发于颊、软腭等处
C. 数目多少、直径大小变化很大,可见明显的局部刺激因素
D. 溃疡单发,病程长,呈潜掘状
E. 多发溃疡可达几十个,直径 1 ~ 2mm,似“满天星”,亦可融合成片
68. 黏性放线菌损伤牙周组织的机制包括
A. 影响成纤维细胞功能
B. 合成中性粒细胞趋化物
C. 抗原刺激宿主产生过敏反应
D. 刺激破骨细胞,造成骨吸收
E. 以上都是

69. 下列关于急性坏死性溃疡性龈炎(ANUG)的主要临床表现,说法错误的是
- 病程较短,一般为数天至1~2周
 - 主要特征性损害为龈乳头和边缘龈的坏死
 - 病变往往仅累及附着龈
 - 疼痛明显
 - 有腐败性口臭
70. 下列关于ANUG的治疗,说法不正确的是
- 首次就诊时,要彻底洁治
 - 局部使用氧化剂冲洗
 - 口服抗生素和支持治疗
 - 对全身性因素进行矫正和治疗
 - 口腔卫生指导
71. 非附着性龈下菌斑中最主要的细菌为
- 革兰阳性兼性菌
 - 革兰阳性需氧菌
 - 变形链球菌
 - 革兰阴性厌氧菌
 - 唾液链球菌
72. 混合牙列期最容易患龋的恒牙是
- 切牙
 - 尖牙
 - 前磨牙
 - 第一恒磨牙
 - 第二恒磨牙
73. 下列哪项不是急性龋的特点
- 多见于青年人
 - 病变组织颜色浅
 - 病变进展快
 - 牙髓组织容易感染
 - 质地干且脆
74. 白塞病又称为
- 口干-眼干-关节炎综合征
 - 贝赫切特综合征
 - 史-约综合征
 - 梅-罗综合征
 - 哈钦森综合征
75. 静止龋主要是在下列何种情况下产生的
- 机体抵抗力增加
 - 牙齿再矿化能力增加
 - 致龋的环境发生变化
 - 口内致龋病菌种类变化
 - 牙齿的抗酸力增加
76. 使用龈下刮治器时,刀刃与牙面应成
- 45°角左右
 - 90°角左右
 - 80°角左右
 - 15°角左右
 - 125°角左右
77. 禁用皮质类固醇的疾病是
- 扁平苔藓
 - 盘状红斑狼疮
 - 单纯疱疹
 - 复发性口腔溃疡
 - 多形红斑
78. 一般来说,下列哪一种疾病的牙龈增生最为严重
- 妊娠性龈炎
 - 青春性牙龈炎
 - 遗传性牙龈纤维瘤
 - 增生性牙龈炎
 - 药物性牙龈增生
79. 下列不是慢性龈缘炎自觉症状的是
- 刷牙或咬硬物时牙龈出血
 - 牙龈局部发痒
 - 牙龈经常出现自发性出血
 - 牙龈肿胀感
 - 口腔异味

80. 复发性单纯疱疹性口炎与复发有关的诱因不包括
- A. 局部机械损伤
 - B. 过度疲劳
 - C. 妇女月经期
 - D. 微量元素缺乏
 - E. 感冒

81. 牙龈炎最主要的致病细菌是
- A. 变形链球菌
 - B. 伴放线放线杆菌
 - C. 牙龈卟啉单胞菌
 - D. 黏性放线菌
 - E. 金黄色葡萄球菌

82. 梅毒的病原体是
- A. 细菌
 - B. 病毒
 - C. 真菌
 - D. 螺旋体
 - E. 寄生虫

A2 型选择题 (86 ~ 109 题)

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

86. 患者,男,72 岁。下前牙龋充填后 3 天,出现肿痛。查:有下尖牙近中邻面树脂充填物完好,叩痛(+),松动 I 度,颊龈沟变浅、充血,热牙胶测试无反应。该牙上次治疗存在的问题最可能是
- A. 牙髓情况判断错误
 - B. 充填时未垫底
 - C. 备洞时刺激牙髓
 - D. 意外穿髓
 - E. 充填材料选择不当

83. 妊娠期龈瘤通常开始于
- A. 妊娠第 8 个月
 - B. 妊娠第 4 个月
 - C. 妊娠第 3 个月
 - D. 妊娠第 6 个月
 - E. 妊娠第 5 个月

84. 梅-罗综合征的临床表现为
- A. 地图舌、口角炎、贫血
 - B. 裂舌、面瘫、肉芽肿性唇炎
 - C. 裂舌、口角炎、腺性唇炎
 - D. 地图舌、面瘫、贫血
 - E. 舌乳头炎、面瘫、肉芽肿性唇炎

85. 区别牙龈炎和牙周炎的重要标志是
- A. 牙周探诊深度是否超过 3mm
 - B. 有无龈下结石
 - C. 结合上皮是否从釉牙骨质界向根方增殖和迁移形成牙周袋
 - D. 有无牙槽骨吸收
 - E. 患牙是否松动

87. 患儿,女,5 岁。家长请教医生幼儿刷牙能否用含氟牙膏,医生的回答是
- A. 最好不用
 - B. 应该不用
 - C. 监督使用
 - D. 间断使用
 - E. 长期使用

88. 患者,男,29 岁。左下后牙,牙龈小泡 8 个月余,要求治疗。查体:左下第一前磨牙无龋,殆面磨损可见牙本质暴露,牙髓无活

力,叩诊(+),X线片示根尖呈喇叭形。

该牙的可能病因为

- A. 磨损
- B. 畸形中央尖
- C. 殆创伤
- D. 釉质发育不全
- E. 深龋

89. 患者,女,65岁。发现舌背红色斑块1年,病损时常变换位置,无自觉症状,偶有刺痛。患者可能的诊断为

- A. 沟纹舌
- B. 舌乳头炎
- C. 地图舌
- D. 肉芽肿性舌炎
- E. 溃疡性舌炎

90. 患者因咬合面龋坏,复合树脂充填后咬合痛。查:左上第一磨牙殆面树脂充填物在,咬诊疼痛,冷测(++),去除刺激后疼痛持续几秒钟。治疗方案应为

- A. 去除充填物,氧化锌丁香油安抚
- B. 去除充填物,氢氧化钙护髓,重新充填
- C. 去除充填物,改用玻璃离子充填
- D. 根管治疗
- E. 脱敏治疗

91. 患儿,男,13岁。正在做正畸治疗,医生推荐每周用氟化钠水漱口防龋,其氟浓度应为

- A. 0.005%
- B. 0.2%
- C. 0.5%
- D. 0.02%
- E. 0.1%

92. 患者,男,19岁。前牙外伤1小时来诊。查:左上中切牙牙冠完整,位于牙列中,牙髓活力测试无反应,松动I度,叩诊(+),X线检查示根尖1/3有水平折裂线。此时

宜采取的治疗方案是

- A. 根管治疗术
- B. 活髓切断术
- C. 固定,观察
- D. 根管治疗+根尖切除术
- E. 拔除

93. 患者,男,46岁。左上后牙食物嵌塞,要求补牙。该牙半年前曾有冷热刺激痛、自发痛,现无明显不适。查体:左上第二前磨牙远中龋达牙本质深层,冷测无反应,未探及穿髓孔,叩诊(-)。应诊断为

- A. 深龋
- B. 可复性牙髓炎
- C. 慢性牙髓炎
- D. 牙髓坏死
- E. 龈乳头炎

94. 患者,男,41岁。左上后牙自发性持续性跳痛2天。查体:左上第二前磨牙牙殆面近远中向可见隐裂,冷测无反应,叩诊(+++),松动II度。可诊断为

- A. 牙隐裂
- B. 急性浆液性牙髓炎
- C. 急性浆液性根尖周炎
- D. 急性化脓性牙髓炎
- E. 急性化脓性根尖周炎

95. 患者,女,20岁。上切牙远中移位,间隙增宽,影响美观,求治。检查:上前牙牙周袋深5mm,第一恒磨牙松动I度,牙周袋深6mm。X线片显示:上前牙区牙槽骨水平吸收,第一磨牙牙槽骨弧形吸收。诊断为

- A. 青少年后期牙周炎
- B. 慢性牙周炎
- C. 侵袭性牙周炎
- D. 快速进展型牙周炎
- E. 成人牙周炎

96. 对某学生做临床检查时发现其牙龈因炎症有颜色改变,无肿胀或水肿,探诊后出血。复诊龈沟出血指数标准后记分为
- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
 - E. 5
97. 患者,男,21岁。因牙齿松动半年就诊。无全身疾病,无青霉素过敏史。接诊医生诊断为广泛型侵袭性牙周炎。经牙周系统治疗后复查的间隔期开始应为
- A. 每2~4个月1次
 - B. 每2~3个月1次
 - C. 每1~2个月1次
 - D. 每3~4个月1次
 - E. 每3~6个月1次
98. 患者,男,78岁。戴全口义齿10年,因进食疼痛、不适1个月就诊。检查:上腭义齿承托区相对应的黏膜充血,上腭义齿基托黏膜面涂片见白色念珠菌菌丝。该患者治疗中不应使用的药物为
- A. 制霉菌素
 - B. 复方氯己定
 - C. 克霉唑
 - D. 金霉素含漱液
 - E. 小苏打
99. 患者,男,55岁。左下后牙床肿痛3天。检查:左下第一磨牙颊侧牙龈处有局限性肿胀、隆起。扪及波动感,该牙未见龋坏,温度测验有感觉。反应与对照牙相同,颊侧近中及中央处探诊深度7mm。最可能的诊断为
- A. 急性牙龈脓肿
 - B. 急性坏死性龈炎
 - C. 急性牙周脓肿

- D. 急性根尖周脓肿
 - E. 急性龈乳头炎
100. 患儿,女,12岁。检查发现:前牙唇侧牙龈红肿、肥大,龈缘有大量软垢,乳头呈球状突起。颜色暗红,质地软,探诊易出血。X线检查牙槽骨无明显吸收。其最可能的诊断是
- A. 慢性牙龈炎
 - B. 急性坏死性溃疡性龈炎
 - C. 青春期龈炎
 - D. 侵袭性牙周炎
 - E. 药物增生性龈炎
101. 男,13岁。2岁前生活在高氟区,2岁后迁移至非高氟区。可能会出现氟牙症的牙是
- A. 第一双尖牙
 - B. 第二双尖区
 - C. 第一恒磨牙
 - D. 第二恒磨牙
 - E. 切牙
102. 牙龈缘肿胀坚实,呈炎性增生。镜下见上皮纤维结缔组织增生束,束间可见淋巴细胞和浆细胞浸润;毛细血管增生不明显。该疾病是
- A. 炎症水肿型慢性龈炎
 - B. 纤维增生型慢性龈炎
 - C. 慢性龈炎
 - D. 急性坏死性溃疡性龈炎
 - E. 药物增生性龈炎
103. 患儿,9岁。检查发现第一恒磨牙,中切牙及下颌侧切牙近切缘和牙尖出现釉质缺损。推断其发生障碍的时间为
- A. 胎儿10个月
 - B. 出生时

- C. 出生后第 1 年
D. 出生后第 2 年
E. 出生后第 3 年
104. 患儿,女,6 岁。右下颌第二乳磨牙残冠,髓室底完整,近中根根吸收约 1/3,X 线检查有继承恒牙,相邻第一恒磨牙未萌出。首选治疗方法为
- A. 暂不处理
B. 根管治疗,保留牙齿
C. 拔除乳牙
D. 拔除乳牙并立即做间隙保持器
E. 拔除乳牙待相邻第一恒磨牙萌出后做间隙保持器
105. 患儿,女,7 岁。口内检查发现下颌后部牙槽骨上有两个形态似磨牙的牙齿存在。为鉴别是否有恒磨牙。下列不正确的说明是
- A. 下颌第二乳磨牙的外形呈斜方形
B. 下颌第二乳磨牙的近中颊尖、远中颊尖及远中尖的大小基本相等
C. 乳牙的牙颈嵴突出,与牙根分界清楚
D. 乳牙牙冠颜色偏白
E. 以上都不是
106. 患儿,男,8 岁。第一恒磨牙窝沟着色且能卡住探针,疑有龋坏。该儿童应选用的预防治疗措施是
- A. 窝沟封闭
B. 现场试验
C. 局部用氟
D. 口腔健康教育
E. 充填治疗
107. 患儿,男,8 岁 5 个月。乳中切牙已脱落,右上颌中切牙已萌出半年余,左上颌中切牙未见萌出。X 线检查显示有左上颌中切牙牙胚。左上颌中切牙不萌出的原因不可能是
- A. 乳牙病变
B. 乳牙过早脱落
C. 乳牙滞留
D. 局部牙龈角化增生
E. 遗传
108. 患者,男,27 岁。口腔经常发生溃疡,此次左颊黏膜已溃疡半个多月仍疼痛不适。查:全身情况良好,口腔检查牙周无炎症,牙齿排列整齐。左颊黏膜近口角区见一深在溃疡,可探至肌层,直径 1.5cm 左右,边缘整齐,界限清晰,溃疡边缘红肿隆起,周围充血明显。拟诊断为
- A. 颊部鳞癌
B. 口腔结核
C. 腺周口疮
D. 坏死性涎腺化生
E. 创伤性溃疡
109. 对一名老年人做口腔健康检查,发现该名老年人口腔中牙龈退缩的牙面有 50 个,其中患根龋的牙面 4 个,因根龋充填的牙面 4 个。该名老年人的根龋指数是
- A. 15%
B. 16%
C. 17%
D. 20%
E. 25%

B1 型选择题 (110 ~ 134 题)

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从 中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂 黑。某一个备选答案可能被选择一次,多次或不被选择。

(110 ~ 111 共用备选答案)

- A. 四环素
- B. 螺旋霉素
- C. 甲硝唑
- D. 青霉素
- E. 罗红霉素

下列疾病治疗时,如用抗菌药治疗,应首 选的药物是

- 110. 急性坏死性溃疡性龈炎
- 111. 急性牙周脓肿

(112 ~ 114 共用备选答案)

- A. 牙齿结构异常
- B. 牙齿形态异常
- C. 牙齿数目异常
- D. 牙齿萌出异常
- E. 牙齿结构形态均异常

- 112. 牙釉质发育不全症
- 113. 氟牙症
- 114. 畸形中央尖

(115 ~ 116 题共用备选答案)

- A. 木馏油
- B. 樟脑酚
- C. 碘仿糊剂
- D. 甲醛甲酚
- E. 氢氧化钙

- 115. 根尖孔破坏的感染渗湿根管封药用
- 116. 根尖孔未形成的年轻恒牙根管封药

(117 ~ 120 共用备选答案)

- A. 牙龈增生常覆盖牙冠的 2/3 以上
- B. 牙龈乳头红肿
- C. 牙龈线性红斑
- D. 牙龈鲜红肿大,松软脆弱,表面呈结节 或分叶状
- E. 龈乳头和边缘龈的坏死

下列疾病牙龈的特征病损是

- 117. 艾滋病
- 118. 浆细胞龈炎
- 119. 急性坏死性溃疡性龈炎
- 120. 遗传性牙龈纤维瘤病

(121 ~ 125 共用备选答案)

- A. 干髓术
 - B. 根管充填术
 - C. 塑化治疗
 - D. 根尖诱导成形术
 - E. 活髓切断术
- 121. 需拔除根管内 2/3 的牙髓的治疗
 - 122. 保留根管内的全部健康牙髓
 - 123. 去除根管内全部牙髓
 - 124. 保留根管内的全部神经失活的牙髓
 - 125. 不宜用拔髓针拔髓,而用边冲洗边扩锉的 方法清除坏死的牙髓残片,保护根尖部的 活组织不受损伤

(126 ~ 127 共用备选答案)

- A. 奶瓶龋
 - B. 静止龋
 - C. 猖獗龋
 - D. 环状龋
 - E. 急性龋
- 126. 乳前牙唇面、邻面龋较快发展成围绕牙冠 的广泛性龋的是
 - 127. 突然发生而范围广的龋蚀,很快发生牙髓 感染,下颌乳前牙也受到龋蚀的侵及的是

(128 ~ 129 共用备选答案)

- A. Down 综合征
- B. 掌跖角化 - 牙周破坏综合征
- C. 白细胞功能异常
- D. 艾滋病
- E. 坏死性溃疡性牙龈炎

128. 具有传染性的疾病是
129. 有智力障碍的疾病是

(130 ~ 134 共用备选答案)

- A. 疱疹性龈口炎
B. 唇疱疹
C. 手 - 足 - 口病
D. 鹅口疮
E. 复发性口疮
130. 好发于唇、颊、舌缘等,在角化完全的附着
· 龈和硬腭则少见,应诊断为

131. 好发于口腔前部黏膜、颊黏膜出现数个或
数十个米粒大小的疱疹,疱疹周围皮肤发
红,应诊断为
132. 好发于颊、舌、软腭及口唇部的黏膜,白色
的斑块不易擦掉,其诊断为
133. 好发于口唇、鼻孔周围面颊及外阴出现红
斑及水疱,自感刺痒、灼热,应诊断为
134. 好发于口腔黏膜、手掌、足底出现水疱、丘
疹等病损,5 ~ 7 天愈合,应诊断为

A3/A4 型选择题 (135 ~ 150 题)

答题说明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干道考题。请根据试题所提供的信息,在每一道
考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相
应字母所属的方框涂黑。

(135 ~ 138 共用题干)

患者,男,28 岁。下前牙剧烈肿痛 3 天就
诊。检查下颌 21|1 叩痛(+++)。相
应前庭沟红肿,压痛(+++),未探及牙
周袋。未受外伤,牙体未发现龋病或非龋
性疾病。

135. 其诊断是
A. 急性牙髓炎
B. 急性根尖周炎
C. 急性龈乳头炎
D. 慢性根尖周炎
E. 以上都不是
136. 应急处理方法是
A. 开髓引流
B. 拔髓引流
C. 药物止痛
D. 理疗
E. 针灸止痛
137. 应急处理后永久性治理方法是
A. 干髓治疗
B. 塑化治疗
C. 空管治理
D. 根管充填
E. 以上均不对
138. 如果开髓后,根管狭窄,最小号的扩孔钻

(锉)均不能进入根管内,根尖周骨质广
泛破坏,应采用哪项治疗

- A. 根管治疗
B. 根管塑化治疗
C. 根尖周刮治术
D. 根尖倒封闭术
E. 拔除

(139 ~ 141 题共用题干)

患者,女,14 岁。前牙唇侧龈乳头肿胀呈
球状突起,颜色暗红,松软光亮,探诊出血
明显,局部刺激物不明显,探诊未及附着
丧失。

139. 此患者最可能的诊断为
A. 急性龈乳头炎
B. 青春期龈炎
C. 妊娠期龈炎
D. 药物性牙龈肥大
E. 侵袭性牙周炎
140. 以下为造成该患者牙龈肿胀的原因,除外
A. 口呼吸
B. 激素水平的改变
C. 吐舌习惯
D. 前牙排列不齐
E. 刷牙不认真

141. 此患者下列治疗措施中哪一项不正确
- A. 牙周基础治疗
 - B. 教会患者正确控制菌斑的方法
 - C. 调节激素水平
 - D. 改正不良习惯
 - E. 炎症消退后牙龈形态仍未恢复正常的患者可行牙龈切除术

(142 ~ 144 共用题干)

患者,男,41岁。左侧后牙遇冷热刺激疼2个月。近1周来出现自发性痛。昨夜疼痛加重,但不能确定患牙位置。

142. 检查时最可能发现
- A. 叩痛(++)
 - B. 牙龈红肿
 - C. 深龋
 - D. 牙齿松动
 - E. 磨耗严重
143. 根据题干最有可能的诊断是
- A. 中龋
 - B. 深龋
 - C. 慢性牙髓炎急性发作
 - D. 慢性牙髓炎
 - E. 急性牙髓炎
144. 主诉牙进行温度测验的结果
- A. 无反应
 - B. (+)
 - C. 出现疼痛,但刺激去除后即刻消失
 - D. 出现疼痛,刺激去除后仍持续一段时间
 - E. 短暂的轻度或中度不适

(145 ~ 146 题共用题干)

患者,女,43岁。自觉左颊黏膜粗糙1个月,有时伴刺激痛。临床检查见双颊黏膜有网状白色条纹,左颊黏膜充血。

145. 以下哪项还可以作为本病的诊断依据
- A. 皮肤有 Wickham 纹
 - B. 外阴溃疡
 - C. 月经紊乱

D. 眼结膜充血

E. 口角炎

146. 以下哪项对做出诊断最为重要
- A. 直接免疫荧光检查
 - B. 组织病理检查
 - C. 脱落细胞涂片检查
 - D. 病损组织细胞培养
 - E. 病损甲苯胺蓝染色

(147 ~ 150 共用题干)

口腔预防保健人员在口腔调查问卷中发现群众对许多观点有不同的观点和认识,口腔预防保健人员对于不同的观点进行了相应的宣传。

147. 针对“氟化物有毒”的观点,宣传
- A. 氟化物有益健康
 - B. 氟化物有益口腔健康
 - C. 氟化物过多有害
 - D. 氟化物过少有损口腔健康
 - E. 除氟害兴氟利
148. 针对“人老了掉牙是正常现象”的观点,宣传
- A. 人老掉牙是自然现象
 - B. 人老牙不老
 - C. 人老掉牙时可用义齿修复
 - D. 健康牙齿可以伴终身
 - E. 老人不要拔牙
149. 针对“牙不疼不用看牙医”的观点,宣传
- A. 尽早看牙医
 - B. 定期口腔检查
 - C. 每2年看一次牙医
 - D. 牙疼及时看
 - E. 牙龈出血也要看
150. 针对“妊娠期不能刷牙”的观点,宣传
- A. 用饭后漱口代替
 - B. 改用牙签代替
 - C. 早晚坚持刷牙
 - D. 改用牙线代替
 - E. 减少刷牙次数