

走更远的路，才能看到更多的风景
爬更高的山，才能获得不同的视角



● 口腔颌面颈部动脉来源于

- A. 颈内动脉
- B. 颈外动脉
- C. 锁骨下动脉
- D. A + B
- E. A + B + C

【正确答案】 E



● 关于颈动脉窦描述哪项是错误的

- A. 是颈内动脉起始处或颈总动脉分叉处的膨大部分
- B. 窦壁内含有特殊压力感受器
- C. 可感受血液中二氧化碳的含量
- D. 可感受动脉压的刺激
- E. 手术不慎累及颈动脉窦可引起颈动脉窦综合征

【正确答案】 C

● 在舌腹左右伞襞与舌腹中线间的三角区内，由外向内排列的结构是

- A.舌深动脉、舌神经、舌深静脉
- B.舌神经、舌深动脉、舌深静脉
- C.舌深静脉、舌神经、舌深动脉
- D.舌深静脉、舌深动脉、舌神经
- E.舌神经、舌深静脉、舌深动脉

【正确答案】 C

● 舌系带与伞襞之间的三角区域内，清晰可见的结构是

- A.舌深静脉
- B.舌深动脉
- C.舌神经
- D.舌下神经
- E.舌下神经伴行静脉

【正确答案】 A

● 某例面部吸脂术，在抽吸颧弓下方脂肪时发生出血，其原因为

- A.颊动脉损伤
- B.面动脉损伤
- C.颞浅动脉损伤
- D.颞深动脉损伤
- E.面横动脉损伤

【正确答案】 E

● 颈部鉴别颈外动脉与颈内动脉的描述中，正确的是

- A.颈外动脉初在颈内动脉的前内侧，继而转至颈内动脉的前外侧
- B.颈外动脉无分支，颈内动脉有分支
- C.颈外动脉初在颈内动脉的后外侧，继而转至颈内动脉的后内侧
- D.暂时阻断颈内动脉，则触不到颞浅动脉或者颌外动脉的搏动
- E.颈外动脉较颈内动脉粗

【正确答案】 A

● 下列不是颈外动脉分支的是

- A.甲状腺上动脉
- B.枕动脉
- C.舌动脉
- D.椎动脉
- E.颞浅动脉

【正确答案】 D

● 颈总动脉分为颈内动脉和颈外动脉的部位是

- A.平胸锁关节处
- B.平甲状软骨上缘
- C.平甲状软骨下缘
- D.平舌骨大角尖
- E.平下颌角处

【正确答案】 B

● 在颈部平舌骨大角尖发自颈外动脉的分支是

- A. 甲状腺上动脉
- B. 舌动脉
- C. 面动脉
- D. 上颌动脉
- E. 颞下动脉

【正确答案】 B

● 舌动脉在舌骨肌前缘处分为哪两条终支

- A. 舌深动脉和舌背动脉
- B. 颞下动脉和舌背动脉
- C. 舌背动脉和舌下动脉
- D. 颞动脉和舌下动脉
- E. 舌下动脉和舌深动脉

【正确答案】 E

● 颈外动脉的两终支为

- A. 甲状腺上动脉及舌动脉
- B. 舌动脉及面动脉
- C. 面动脉及上颌动脉

D.上颌动脉及颞浅动脉

E.颞浅动脉及枕动脉

【正确答案】 D

● **面动脉的分支不包括**

A.颌下动脉

B.上唇动脉

C.下唇动脉

D.内眦动脉

E.咽升动脉

【正确答案】 E

● **下颌牙齿的血液供应来自**

A.舌动脉

B.下唇动脉

C.面动脉

D.颞浅动脉

E.上颌动脉

【正确答案】 E

● **以下关于口腔颌面颈部的静脉错误的是：**

A.分为浅静脉和深静脉两类

B.浅静脉接受浅层组织的血液，汇入深静脉

- C. 静脉血主要通过颈内静脉和颈外静脉向心脏回流
- D. 静脉的行径、分布大多与动脉一致
- E. 面部静脉较少，变异相对较少

【正确答案】 E

不属于口腔颌面部深静脉的是

- A. 翼静脉丛
- B. 上颌静脉
- C. 面总静脉
- D. 下颌后静脉
- E. 面静脉

【正确答案】 E

● 汇合形成面后静脉的是

- A. 面前静脉、颞浅静脉
- B. 颞浅静脉、上颌静脉
- C. 翼静脉丛、上颌静脉
- D. 面前静脉、耳后静脉
- E. 翼静脉丛、耳后静脉

【正确答案】 B

● 下颌后静脉和耳后静脉汇合成

- A. 面总静脉

- B.下颌后静脉
- C.上颌静脉
- D.颈内静脉
- E.颈外静脉

【正确答案】 E

● 颅内外静脉之间有很多交通静脉，不属于其交通静脉的是

- A.导血管
- B.板障静脉
- C.脑神经及血管周围静脉网
- D.眼静脉
- E.上颌静脉

【正确答案】 E

- A.翼丛
- B.面深静脉
- C.上颌静脉
- D.颞浅静脉
- E.面总静脉

- 与颅内外有广泛交通的是()
- 连接面静脉与翼静脉丛的静脉为()
- 下颌后静脉前支与面静脉汇合 ()

【正确答案】 A、B、E

● 面神经管内的分支有（ ）

- A.岩大神经、蹬骨肌神经、鼓索
- B.蹬骨肌神经、茎突舌肌神经、耳后神经
- C.鼓膜张肌神经、腭帆张肌神经、二腹肌神经
- D.耳后神经、茎突舌骨肌神经、二腹肌神经
- E.鼓膜张肌神经、茎突舌骨肌神经、腭帆张肌神经

【正确答案】 A

● 面瘫时额纹消失，累及受损的面神经分支为

- A.颈支
- B.颞支
- C.颊支
- D.颧支
- E.下颌缘支

【正确答案】 B

● 下列哪项不属于面神经

- A.颞支
- B.颧神经
- C.颊支
- D.下颌缘支

E.颈支

【正确答案】 B

● 患者临床检查发现下唇正常，上唇不正常，鼻唇沟变浅、腮腺无力，考虑可能累及受损的面神经分支为

A.颈支

B.下颌缘支

C.颞支

D.颧支

E.颊支

【正确答案】 E

● 腮腺手术中寻找面神经颊支的标志是（）

A.耳屏前

B.腮腺导管

C.腮腺上前缘

D.腮腺前缘

E.腮腺上缘

【正确答案】 B

● 面神经主干与乳突前缘的关系较为恒定，一般在

A.乳突尖平面处，距皮肤 2 ~ 3cm

B.距乳突尖平面上方约 1cm 处，距皮肤 3 ~ 4cm

- C.距乳突尖平面下方约 1cm 处，距皮肤 2~3cm
- D.距乳突尖平面上方约 1cm 处，距皮肤 2~3cm
- E.距乳突尖平面下方约 1cm 处，距皮肤 3~4cm

【正确答案】 D

● 关于面神经的论述哪项是错误的

- A.为混合性神经
- B.含运动纤维
- C.含交感纤维
- D.含味觉纤维
- E.含副交感纤维

【正确答案】 C

● 临床上分腮腺为浅、深叶的依据是

- A.颈外动脉穿经的平面
- B.下颌后静脉穿行的平面
- C.面神经主干及其分支的平面
- D.咬肌的前缘
- E.下颌支的后缘

【正确答案】 C

● 下列面神经走向的描述哪项是错误的

- A.穿内耳道底入面神经管

- B.经茎乳孔出颅
- C.在面神经管内发出三条分支
- D.以茎乳孔为界分为面神经管段和颅外段
- E.穿腮腺浅叶，扇形分布于表情肌

【正确答案】 E

● 分布于口轮匝肌的面神经分支是

- A.颞支
- B.颧支
- C.颊支
- D.下颌缘支
- E.颈支

【正确答案】 C

● 面神经从茎乳孔到开始分支的这一段为面神经主干，面神经主干的长度为

- A.1.0cm ~ 1.5cm
- B.1.5cm ~ 2cm
- C.2cm ~ 2.5cm
- D.2.5cm ~ 3cm
- E.3cm ~ 3.5cm

【正确答案】 B

● 颌下区的手术切口常采用低于下颌角及下颌缘 1.5~2.0cm 处其目的是为了**避免损伤**

- A.面静脉
- B.面动脉
- C.面神经下颌缘支
- D.面神经颈支
- E.下颌下腺

【正确答案】 C

- A.运动神经
- B.感觉神经
- C.交感神经
- D.副交感神经
- E.混合神经

- 面神经为
- 眼神经为
- 上颌神经为

【正确答案】 E B B

● 37.拔除上颌第一磨牙时需麻醉

- A.上牙槽中神经、腭前神经
- B.上牙槽后神经、腭前神经

- C.上牙槽前神经、鼻腭神经、腭前神经
- D.上牙槽后神经、上牙槽中神经、鼻腭神经
- E.上牙槽后神经、上牙槽中神经、腭前神经

【正确答案】 E

● 拔除上颌尖牙时需麻醉

- A.上牙槽中神经、腭前神经
- B.上牙槽后神经、腭前神经
- C.上牙槽前神经、鼻腭神经、腭前神经
- D.上牙槽后神经、上牙槽中神经、鼻腭神经
- E.上牙槽后神经、上牙槽中神经、腭前神经

【正确答案】 C

● 拔除下颌第一磨牙时，应麻醉哪组神经

- A.上牙槽后神经+腭前神经
- B.颊神经+舌神经+下牙槽神经
- C.下牙槽神经+舌神经+颏神经
- D.下牙槽神经+舌神经
- E.上牙槽中神经+上牙槽后神经+腭前神经

【正确答案】 B

● 拔除下颌第一前磨牙时，应麻醉哪组神经

- A.上牙槽后神经+腭前神经

- B. 颊神经+舌神经+下牙槽神经
- C. 下牙槽神经+舌神经+颏神经
- D. 下牙槽神经+舌神经
- E. 上牙槽中神经+上牙槽后神经+腭前神经

【正确答案】 D

