

第一单元

A1型选择题（1~62题）

答题说明

以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 结核性心包炎初期最关键的治疗是
 - A. 口服泼尼松
 - B. 抗结核治疗
 - C. 营养支持治疗
 - D. 心包穿刺引流
 - E. 口服利尿药
2. 不属于肺结核一线治疗药物的是
 - A. 吡嗪酰胺
 - B. 利福平
 - C. 链霉素
 - D. 异烟肼
 - E. 左氧氟沙星
3. 原发性高血压可逆性细动脉改变
 - A. 血管壁平滑肌萎缩
 - B. 血管纤维化
 - C. 血管痉挛
 - D. 内膜下蛋白质物质沉积
 - E. 血管腔狭窄
4. 对医务人员进行道德评价的首要标准是看其医疗行为是否有利于
 - A. 患者疾病的缓解和康复
 - B. 医学科学的发展和社会的进步
 - C. 人类生存环境的保护和改善
 - D. 减轻患者及其家庭的经济负担
 - E. 优生和人群的健康、长寿
5. 心理社会因素在发病、发展过程中起重要作用的躯体器质性疾病称为
 - A. 心理疾病
 - B. 神经症
 - C. 转换性障碍
 - D. 心身疾病
 - E. 躯体疾病
6. 健康维护计划的制订原则不包括
 - A. 健康为导向
 - B. 个人积极参与
 - C. 普适性
 - D. 综合利用
 - E. 动态性
7. 面对同样的社会应激，有人难以适应而得病；有人很快渡过难关。医学心理学解释此现象的基本观点为
 - A. 社会影响的观点
 - B. 情绪作用的观点
 - C. 人格特征的观点
 - D. 心身统一的观点
 - E. 主动调节的观点
8. DNA变性的结果是
 - A. 双链解开
 - B. 紫外线吸收降低
 - C. 凝固

E. 理化性质不发生任何改变

9. 心理冲突的类型不包括

- A. 双避冲突
- B. 双趋冲突
- C. 趋避冲突
- D. 多重趋避冲突
- E. 矛盾冲突

10. 门静脉高压症的主要临床表现不包括

- A. 脾大
- B. 呕血和黑便
- C. 肝掌
- D. 腹水
- E. 食管静脉曲张

11. 结节性甲状腺肿的病理特点是

- A. 滤泡上皮高柱状
- B. 滤泡上皮增生与复旧不一致
- C. 结节边界清楚、包膜完整
- D. 滤泡小而一致
- E. 结节常为多个，大小相等

12. 细菌荚膜主要功能

- A. 增强细菌的毒力
- B. 抵抗宿主细胞吞噬
- C. 繁殖作用
- D. 黏附作用
- E. 运动器官

13. 强心苷治疗心房颤动的机制主要是

- A. 缩短心房有效不应期
- B. 减慢房室传导
- C. 直接抑制心房颤动
- D. 抑制窦房结
- E. 延长心房不应期

14. 可通过母婴传播的传染病是

- A. 甲型病毒性肝炎

C. 流行性乙型脑炎

- D. 疟疾
- E. 狂犬病

15. 苯丙酮尿症是属于

- A. 染色体畸变
- B. 常染色体显性遗传
- C. 常染色体隐性遗传
- D. X连锁显性遗传
- E. X连锁隐性遗传

16. NHL 淋巴瘤最常发生部位

- A. 结肠
- B. 直肠
- C. 胃
- D. 回肠
- E. 十二指肠

17. 原核生物基因表达调控的基本结构单元是

- A. 增强子
- B. 密码子
- C. 转录因子
- D. 启动子
- E. 操纵子

18. 60kg 体重的正常成年人的血量为

- A. 2.8~4.0L
- B. 4.2~4.8L
- C. 5.0~7.0L
- D. 7.0~8.0L
- E. 1.0~2.0L

19. 子宫肌瘤钙化常发生在

- A. 青春期
- B. 生育期
- C. 妊娠期
- D. 围绝经期
- E. 绝经后

- A. 动脉压下降，颈静脉怒张和心音低钝
- B. 动脉压下降，心动过速和心音低钝
- C. 动脉压上升，颈静脉怒张和心音低钝
- D. 动脉压上升，奇脉和心音低钝
- E. 动脉压上升，奇脉和心音遥远

21. 卵巢皮样囊肿的特点

- A. 是最常见的卵巢良性肿瘤
- B. 有恶性程度的逆转倾向
- C. hCG 升高
- D. CA125 升高
- E. 具有男性化作用

22. 慢性肾炎合并高血压尿毒症，同时有水肿，下列药物先应用

- A. 双氢克尿噻与氨苯蝶啶
- B. 甘露醇
- C. 双氢克尿噻
- D. 速尿
- E. 利尿合剂

23. 可快速产热但持续短时间的激素是

- A. 皮质醇
- B. 醛固酮
- C. 甲状腺激素
- D. 乙酰胆碱
- E. 肾上腺素

24. 婚前医学检查，对确诊患有严重遗传病不宜生育者正确的处理方法是

- A. 可以结婚，但需要采取长效避孕措施或者实施结扎手术
- B. 可以结婚，但需提交书面声明，保证不生育
- C. 不能结婚
- D. 可以结婚，但必须符合晚婚规定
- E. 《婚姻法》未明确规定禁止结婚的，可以结婚

25. 下列病原菌中耐盐最强的食物病原菌是

- B. 沙门菌
- C. 致病性大肠埃希菌
- D. 葡萄球菌
- E. 肉毒梭菌

26. 二氧化碳在血液中运输的主要方式是

- A. 物理溶解
- B. 与水结合成碳酸
- C. 形成氧和血红蛋白
- D. 形成碳酸氢盐
- E. 与血浆清蛋白结合

27. 为预防甲状腺功能亢进症术后出现甲状腺危象，最关键的措施是

- A. 术后用冬眠合剂镇静
- B. 吸氧
- C. 术后给予氢化可的松
- D. 术后补钙
- E. 术前使基础代谢率降至正常范围

28. 关于艾滋病高危人群以下哪项错误

- A. 50 岁以上的人
- B. 男性同性恋
- C. 性乱者
- D. 静脉药瘾者
- E. 多次输血者

29. 桡骨头半脱位的治疗措施是

- A. 手法复位不必固定
- B. 切开复位内固定
- C. 切开复位韧带修复
- D. 手法复位外固定
- E. 切开复位外固定

30. 左心衰竭的临床表现主要是由

- A. 肺淤血、肺水肿所致
- B. 左心室扩大所致
- C. 体循环静脉压增高所致
- D. 肺动脉压增高所致

31. 对胸腔积液的患者，若作胸腔穿刺发现脓液并有臭味，应对脓液首先作下列哪项检查以确定病因

- A. 涂片找癌细胞
- B. 结核菌培养
- C. 化脓菌培养
- D. 厌氧菌培养
- E. 真菌涂片及培养

32. 证实幽门螺杆菌现症感染的检查方法中不包括

- A. 血清幽门螺杆菌抗体检测
- B. ^{13}C 尿素呼气试验
- C. 胃黏膜活检幽门螺杆菌培养
- D. 胃黏膜活检快速尿激酶试验
- E. 粪便幽门螺杆菌抗原检测

33. 反映均数抽样误差大小的指标是

- A. 全距
- B. 标准误
- C. 均数
- D. 标准差
- E. 变异系数

34. 口服补液盐轻度脱水按

- A. 50~80ml/kg
- B. 80~100ml/kg
- C. 90~120ml/kg
- D. 120~150ml/kg
- E. 150~180ml/kg

35. 血管扩张剂治疗心力衰竭的主要作用机制是

- A. 增强心肌收缩力
- B. 改善心肌供血
- C. 降低心脏前、后负荷
- D. 降低心肌耗氧量
- E. 减慢心率

- A. 呼吸骤停
- B. 闭合性液气胸
- C. 急性弥漫性腹膜炎
- D. 粉碎性胸腰椎骨折
- E. 轻度血压下降

37. 对甲类传染病患者实施强制隔离措施时，应当遵循的公共卫生伦理原则不包括

- A. 互相协同原则
- B. 信息公开原则
- C. 全社会参与原则
- D. 以患者为中心原则
- E. 社会公正原则

38. 正常人红细胞在不同浓度的低渗盐溶液中形态不同。在 0.5%NaCl 溶液中红细胞的形态是

- A. 正常
- B. 膨胀
- C. 缩小
- D. 破裂
- E. 先缩小后破裂

39. 肺炎球菌的致病力是由于

- A. 肺炎球菌产生的内毒素
- B. 肺炎球菌产生的外毒素
- C. 高分子多糖体荚膜对组织的侵袭作用
- D. 肺炎球菌感染引起肺部变态反应性炎症
- E. 内外毒素均起作用

40. 治疗顽固性心力衰竭首先进行的处理是

- A. 做血液超滤
- B. 使用非洋地黄类强心药
- C. 联合应用利尿剂
- D. 静脉应用血管扩张剂
- E. 寻找病因

41. 肺鳞癌首先经

- A. 血行转移

- C. 局部浸润
D. 支气管内膜扩散
E. 种植转移
42. 回肠肠痿患者所用的肠内营养制剂应该是
A. 以肽类为主
B. 以脂类为主
C. 增加维生素
D. 减少糖类
E. 增加纤维素
43. 伸直型桡骨下端骨折的畸形是
A. 垂腕型
B. 银叉型
C. 尺偏型
D. 爪型
E. 僵硬型
44. 正常细胞糖酵解途径中, 利于丙酮酸生成乳酸的条件是
A. 缺氧状态
B. 酮体产生过多
C. 缺少辅酶
D. 糖原分解过快
E. 酶活性降低
45. 下列关于主动脉狭窄的病理生理变化, 不正确的是
A. 左心室负荷降低
B. 左心室舒张末压升高
C. 左心室顺应性降低
D. 左心室肥厚
E. 左心房代偿性肥大
46. 癔症性瘫痪最重要的治疗方法是
A. 镇静
B. 针灸治疗
C. 心理治疗+药物治疗
D. 暗示疗法
47. 治疗甲型溶血性链球菌引起的亚急性感染性心内膜炎, 首选的抗生素是
A. 青霉素
B. 链霉素
C. 卡那霉素
D. 庆大霉素
E. 氯霉素
48. 诊断幽门梗阻最有价值的体征是
A. 振水音阳性
B. 肠鸣音亢进
C. 上腹部膨隆
D. 明显脱水
E. 上腹部固定压痛
49. 下列药物中, 具有强心作用的药物是
A. 呋塞米
B. 甘露醇
C. 氨茶碱
D. 乙酰唑胺
E. 氢氯噻嗪
50. 肝硬化时, 脾大的主要原因是
A. 脾窦扩张, 红细胞淤滞
B. 脾窦巨噬细胞增多
C. 脾内淋巴细胞聚集
D. 脾内纤维组织增生
E. 脾小体多量中性粒细胞浸润
51. 下列情况中, 不能行胃癌根治手术的是
A. 子宫直肠窝转移
B. 肝十二指肠韧带内淋巴结转移
C. 脾门部淋巴结转移
D. 癌组织浸润胰尾部时
E. 癌组织浸润横结肠时
52. 疫苗接种处方应保存几年
A. 2年
B. 3年

- D. 4年
- E. 5年

53. 下肢静脉血栓形成非手术治疗描述错误的是

- A. 卧床休息,抬高患者,适当使用利尿剂,以减轻肢体肿胀
- B. 溶栓
- C. 抗凝
- D. 可长期使用肝素治疗
- E. 使用祛聚药物能扩充血容量、稀释血液、降低黏稠度

54. 医疗机构在发现甲类传染病时,对疑似患者在明确诊断前,应在指定场所进行

- A. 随访
- B. 拘留
- C. 单独隔离治疗
- D. 同其他患者一起治疗
- E. 异地留观

55. 对球后溃疡的正确描述是

- A. 多发生在距幽门2~3cm以内
- B. 指十二指肠球部后壁溃疡
- C. 易并发出血
- D. 临床症状多不明显
- E. 内科治疗效果不好

56. 胆囊切除手术中,不适合胆总管探查指征的是

- A. 胆总管有扩张
- B. 曾有梗阻性黄疸史
- C. 胆囊水肿
- D. 术中胆管造影示胆管结石
- E. 胆总管触到结石

57. 肝硬化门脉高压诊断具有特征性意义的表现是

- A. 腹水

- C. 内分泌紊乱
- D. 出血倾向和贫血
- E. 侧支循环开放

58. 腹部手术后,原则上鼓励早期活动,其理由不包括

- A. 促进切口愈合
- B. 改善全身血液循环
- C. 减少深静脉血栓形成
- D. 减少肺部并发症
- E. 减少腹腔感染

59. 下列有关胆管的描述正确的是

- A. 左、右肝管汇合形成胆总管
- B. 胆囊管与胆总管汇合形成肝总管
- C. 胆总管分为十二指肠上段、后段和胰腺段
- D. 法特壶腹通常开口于十二指肠球部
- E. 胆总管长约4~8cm,直径约0.6~0.8cm

60. 观察某种新研制甲肝疫苗的预防效果,研究对象最好选择

- A. 甲肝高发区无免疫人群
- B. 医院中非肝病区患者
- C. 甲肝低发区无免疫人群
- D. 医院中血制品接触者
- E. 近期曾有甲肝暴发地区的人群

61. 人正常生活的最基本的心理条件是

- A. 人际和谐
- B. 情绪稳定
- C. 人格完整
- D. 智力正常
- E. 适应环境

62. 腹股沟直疝最有诊断意义的临床表现是

- A. 按压深环疝仍复出
- B. 容易发生嵌顿
- C. 疝囊颈位于腹壁下动脉外侧
- D. 疝包块呈梨形

A2 型选择题 (63~116 题)

答题说明

每一道试题是以一个小案例出现的,其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

63. 女,45岁。接触性阴道流血3月余。妇科检查:宫颈前唇有直径约2cm菜花状赘生物。镜下见异型细胞浸润性生长,巢状排列,可见病理核分裂象。最可能先转移到的器官是

- A. 子宫旁淋巴结
- B. 腹股沟淋巴结
- C. 肺
- D. 盆腔
- E. 脑

64. 男,22岁。半个月前感冒,咽部肿痛,治疗后好转,但发现有血尿。尿镜检:血尿(++++)、蛋白(±)。肾活检荧光检测:IgA和C3大量的块状沉积。患者可能的诊断为

- A. IgA肾病
- B. 系膜增生性肾小球肾炎
- C. 膜增生性肾小球肾炎
- D. 膜性肾病
- E. 微小病变性肾病

65. 男,10岁,间断右侧鼻腔出血。鼻出血(鼻衄)是临床常见的症状之一,可由多种疾病引起,出血部位多发生于

- A. 鼻腔顶
- B. 鼻中隔前下部
- C. 上鼻甲
- D. 中鼻甲
- E. 下鼻甲

66. 男,71岁。COPD患者,长期家庭氧疗,近10天因呼吸困难增加氧流量,1小时前被

血水肿,双肺呼吸音低,双侧巴氏征阳性。动脉血气(鼻导管吸氧1.5升/分), PaO_2 为71mmHg, PaCO_2 为76mmHg。该患者出现意识障碍最可能的原因是

- A. 电解质紊乱
- B. 脑梗死
- C. 感染中毒性脑病
- D. 二氧化碳潴留
- E. 氧中毒

67. 女,68岁。心悸、头晕1小时,既往高血压病史2个月,规律服用降压药,平时血压130~150/60~70mmHg。查体:BP80/50mmHg,心率40次/分。该患者血压降低最可能的原因是

- A. 左心室后负荷增加
- B. 左心室舒张功能损害
- C. 心包内压力增加
- D. 每搏输出量降低
- E. 左心室前负荷增加

68. 男,大学生。因被诊断为慢性肾衰竭而住院治疗。入院后出现失眠、苦恼和攻击行为。患者的这种角色变化属于

- A. 角色行为减退
- B. 角色行为强化
- C. 角色行为缺如
- D. 角色行为异常
- E. 角色行为冲突

69. 对某无工业污染山村的儿童生长发育智力发育和疾病发病状况的调查发现,该地区部分儿

其他异常。当地儿童所患的疾病最可能是

- A. 硒缺乏病
- B. 砷中毒
- C. 铅中毒
- D. 碘缺乏病
- E. 氟中毒

70. 一冠心病患者血中胆固醇 7.4mmol/L，低密度脂蛋白胆固醇 3.5mmol/L，三酰甘油 1.4mmol/L，宜用何种调脂剂

- A. 烟酸
- B. 益多酯
- C. 辛伐他汀
- D. 非诺贝特
- E. 吉非罗齐

71. 女，35岁。来医院健康体检。查体：BP 130/80mmHg，身高 165cm，体重 75kg，肝脾肋下未触及。实验室检查：ALT 75U/L，AST 40U/L，Y-GT 40U/L。B超：中度脂肪肝。该患者肝内蓄积的甘油三酯的主要来源是

- A. 小肠细胞合成
- B. 生酮氨基酸转变
- C. 肝细胞合成
- D. 脂肪组织转运
- E. 脂肪组织分解

72. 有 8 个某种传染病患者，他们的潜伏期分别为 2、1、21、7、12、1、4、13 天，其中位数是

- A. 4
- B. 5.5
- C. 7
- D. 12
- E. 9.5

73. 某心理治疗师的母亲出现了心理问题，其妹妹想让他给母亲进行心理治疗，但他却将母亲转给其他心理治疗师进行治疗。该心理治疗

- A. 保密原则
- B. 真诚原则
- C. 中立原则
- D. 回避原则
- E. 系统原则

74. 某研究者采用随机单盲临床试验比较两种降压药（非洛地平与贝那普利）对轻、中度原发性高血压患者的降压疗效。其单盲设计中不了解试验分组情况的人是

- A. 测量血压的护士
- B. 实施治疗的医生
- C. 负责设计的研究者
- D. 统计分析人员
- E. 接受治疗的患者

75. 男，49岁。胃溃疡病史 25 年，反复发作，每予抑酸对症治疗可好转。2 个月来，又有疼痛发作，经内科治疗 8 周不见好转，且逐渐消瘦，最大可能是

- A. 消化性溃疡复发
- B. 消化性溃疡癌变
- C. 药物抗药，不敏感
- D. 复合溃疡
- E. 多发溃疡

76. 女，30岁。患 1 型糖尿病，出现恶心、食欲缺乏 3 天，神志不清 2 小时。查体：面色潮红，呼吸深快，意识障碍。诊断方面最可能是

- A. 糖尿病酮症酸中毒
- B. 糖尿病高渗性昏迷
- C. 乳酸性酸中毒
- D. 糖尿病合并尿毒症酸中毒
- E. 肺部感染

77. 男婴，6 个月。患法洛四联症，近 2 天反复于哭闹时突然四肢抽搐，发绀加重，神志不清，呼吸急促，持续时间 2~3 分钟，主要原因是

- B. 肺动脉栓塞
- C. 心力衰竭
- D. 脑炎
- E. 心包炎

78. 男, 45 岁。反复肝功能异常多年, 尿少、双下肢水肿 2 年, 加重 2 周。口服呋塞米 20mg, 3 次/日, 尿量由 500ml/d 增至 3500ml/d。1 天来昏睡, 呼之有反应。患者意识障碍最可能的原因是

- A. 脑血管意外
- B. 肝肺综合征
- C. 肝性脑病
- D. 肝肾综合征
- E. 低血容量性休克

79. 男, 60 岁。进行性吞咽困难半年, 入院经 X 线钡餐透视诊断为食管癌。该病最常见的组织学类型

- A. 鳞状细胞癌
- B. 腺癌
- C. 未分化癌
- D. 腺鳞癌
- E. 小细胞癌

80. 男, 75 岁。车祸致多发骨折及脾破裂, 行脾切除术后 5 天, 卧床制动。今晨突发胸闷气促, 伴意识不清。查体: T37.4°C, P 105 次/分, R25 次/分, BP 94/58mmHg, SaO₂90%。引起该患者上述表现最可能的原因是

- A. 自发性气胸
- B. 急性左心衰竭
- C. 心肌梗死
- D. 脑出血
- E. 肺栓塞

81. 女, 65 岁。腹部下坠感伴腰酸 1 年余, 发现外阴有肿物脱出 6 个月。G₄P₃。妇科查体: 患者平卧用力向下屏气时, 可见宫颈和部分宫

构是

- A. 骶结节韧带
- B. 子宫主韧带
- C. 子宫圆韧带
- D. 子宫阔韧带
- E. 卵巢固有韧带

82. 女, 35 岁。进行性四肢乏力 1 年, 早晨较轻, 下午加重。既往有胸腺瘤病史、否认甲状腺功能亢进症病史。运动疲劳试验阳性。目前临床考虑为重症肌无力, 给予胆碱酯酶抑制剂后症状缓解, 但随之最可能出现的新症状是

- A. 腹泻
- B. 心动过速
- C. 瞳孔扩大
- D. 口干
- E. 呼吸困难

83. 刘某有家族遗传病史, 怀孕后担心胎儿健康, 到某医疗机构进行遗传病诊断。后因医疗纠纷投诉至卫生监督机构。经查, 该医疗机构未取得遗传病诊断资质。根据规定, 负责遗传病诊断许可的卫生行政部门是

- A. 县级卫生行政部门
- B. 设区的市级卫生行政部门
- C. 各级卫生行政部门
- D. 国务院卫生行政部门
- E. 省级卫生行政部门

84. 女, 50 岁。因子宫肌瘤行全子宫切除术。术中医生发现患者左侧卵巢有病变应切除, 在未征得患者及其家属同意的情况下, 将左侧卵巢与子宫一并切除。术后患者恢复良好。该案例中, 医生违背的临床诊疗伦理原则是

- A. 知情同意原则
- B. 患者至上原则
- C. 守信原则
- D. 最优化原则
- E. 保密原则

85. 女, 12 岁。近几个月常感觉疲倦、头昏乏力、心悸。学习注意力不集中, 记忆力减退。实验室检查: 血红蛋白 90g/L, 原卟啉 > 500 μ g/L。该患者最可能的原因是

- A. 锌缺乏
- B. 铁缺乏
- C. 钙缺乏
- D. 碘缺乏
- E. 维生素 D 缺乏

86. 女, 37 岁。突发心悸 10 分钟, 心电图示心率 164 次/分, P 波与 QRS 波无固定关系, QRS 波时限 > 0.12 秒, 可见室性融合波, 最可能的诊断是

- A. 心房扑动
- B. 房性心动过速
- C. 室性心动过速
- D. 交界区心动过速
- E. 窦性心动过速

87. 男, 35 岁。肛门持续性疼痛 3 天, 局部有肿块突出, 无便血。查体: 肛门旁有直径为 1cm 的肿物, 呈暗紫色, 质硬, 有触痛。最可能的诊断是

- A. 血栓性外痔
- B. 肛门周围皮下脓肿
- C. 内痔脱出
- D. 肛裂
- E. 直肠息肉

88. 男, 18 岁。转移性右下腹痛 16 小时, 伴恶心、呕吐。16 小时前右下腹有局限性压痛, 4 小时前疼痛范围扩大。查体: 体温 38.8 $^{\circ}$ C, P92 次/分, 腹部膨胀, 全腹肌紧张, 压痛、反跳痛 (+), 以右下腹为重, 肠鸣音消失。血常规: WBC18.6 $\times 10^9$ /L, N0.91, 病情加重的主要解剖学原因是

- A. 阑尾蠕动弱而慢, 阻塞的粪便残渣不易排出
- B. 阑尾与盲肠相通的开口狭窄易梗阻

- D. 阑尾动脉是终末血管, 易痉挛坏死
- E. 阑尾壁内淋巴组织丰富, 易化脓

89. 男, 30 岁。近年来反复发作腹泻, 常因精神刺激、饮酒或劳累等诱发或加重, 粪便每日 2~10 次不等。查体: 一般情况中等, 除左下腹及下腹正中处有轻度压痛外余无异常发现。实验室检查: 血红蛋白 110g/L, 中性粒细胞 0.78, 大便有大量脓细胞、红细胞, 多次细菌培养 (-)。乙状结肠镜检查见直肠及乙状结肠黏膜呈弥漫性充血、出血、水肿, 血管纹消失, 有多个散在浅表小溃疡。诊断考虑为

- A. 溃疡性结肠炎
- B. 肠结核
- C. 阿米巴性痢疾
- D. 细菌性痢疾
- E. 直肠癌

90. 女, 26 岁。心悸、多汗、手颤 3 个月。无明显突眼, 甲状腺 I 度弥漫性肿大。血游离 T₃、T₄ 增高, TSH 降低。肝肾功能正常, 血 WBC6.8 $\times 10^9$ /L。诊断为甲亢。既往无甲亢病史。治疗选择

- A. 核素 ¹³¹I 治疗
- B. 甲状腺部分切除术
- C. 抗甲状腺药物治疗
- D. 放疗
- E. 抗甲状腺药物治疗后核素 ¹³¹I 治疗

91. 男, 54 岁。阵发性胸痛 1 个月余, 均发生于夜间睡眠中, 每次持续约 30 分钟, 胸痛发作时心电图 ST 段一过性抬高, 最可能的诊断是

- A. 急性心肌梗死
- B. 急性心包炎
- C. 变异型心绞痛
- D. 稳定性心绞痛
- E. 初发劳力型心绞痛

右乳头表面痂皮，可见鲜红色糜烂创面，涂片细胞学检查见大而异形、胞质透明细胞，这种细胞称为

- A. 印戒细胞
- B. R-S 细胞
- C. 佩吉特 (Paget) 细胞
- D. 浆细胞
- E. 类上皮细胞

93. 男，55 岁。因急性阑尾炎穿孔入院。行阑尾切除术后第 6 天，出现发热，体温上升至 39.0°C，伴有腹泻及里急后重。查体：心肺未见明显异常，手术切口无红肿、渗出。此时首选的检查是

- A. 粪常规
- B. 胸部 X 线片
- C. 直肠指诊
- D. 腹部 X 线片
- E. 腹部 B 超

94. 国外某镇一学者开展了一项持续多年的啤酒狂欢节饮酒者与心血管疾病死亡关系的研究。研究初，有 70 名啤酒狂欢节饮酒者和 1500 名非饮酒者。研究结束时，7 名啤酒狂欢节饮酒者死于心血管疾病，45 名非啤酒狂欢节饮酒者死于心血管疾病。该研究为

- A. 病例对照研究
- B. 横断面研究
- C. 队列研究
- D. 临床试验
- E. 生态学研究

95. 女婴，1 个月。人工喂养为主。体检发现血 Hb 偏低。目前最适宜添加的辅食是

- A. 肝泥
- B. 鸡蛋羹
- C. 米粉
- D. 西红柿花
- E. 苹果泥

96. 女，18 岁。发热、咽痛伴阵发性刺激性咳嗽 1 周，咳少量黏痰。查体：T39°C，左肺可闻及少量湿啰音。胸部 X 线片示左上肺淡薄片状阴影。血白细胞总数及中性粒细胞计数正常。经阿奇霉素治疗 7 天后复查胸部 X 线片示病灶大部分吸收。最可能感染的病原体是

- A. 肺炎链球菌
- B. 结核分枝杆菌
- C. 腺病毒
- D. 肺炎支原体
- E. 金黄色葡萄球菌

97. 女，64 岁。突发气急 4 小时，伴咳嗽、咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。高血压病史 10 余年。查体：BP190/110mmHg。心率 110 次/分，律齐，双肺可闻干啰音及细湿啰音。治疗措施不正确的是

- A. 静脉推注呋塞米
- B. 静脉推注美托洛尔
- C. 静脉滴注硝普钠
- D. 静脉推注吗啡
- E. 高流量吸氧

98. 男，30 岁。上腹隐痛，与饮食有关已 4 年。此次突然上腹部剧痛，不敢深呼吸。查体：面色苍白，上腹部压痛明显，伴反跳痛及腹肌紧张，下腹轻度压痛。血 WBC $15 \times 10^9/L$ ，N0.8。为明确诊断，首先应检查

- A. 腹部立位 X 线平片
- B. 紧急钡餐透视
- C. 腹腔穿刺
- D. 急查血淀粉酶
- E. 紧急静脉胆道造影

99. 某患者因腹泻、呕吐入院。心电图：ST 段水平压低，T 波倒置，U 波增高，最可能的病因是

- A. 高钾血症
- B. 低钾血症

- D. 洋地黄效应
- E. 洋地黄中毒

100. 男, 65 岁。逐渐出现语速迟缓、语量减少、口语不流利和找词困难, 但能理解家人和医生的指令。受损可能性最大的部位是

- A. 中央后回的下部
- B. 中央前回的上部
- C. 中央旁小叶的前部
- D. 额下回的后部
- E. 缘上回的上部

101. 女, 58 岁。体检发现血压高, 平素无不适, 其父亲于 60 岁时死于急性心肌梗死。查体: 血压 155/100mmHg, 实验室检查血清总胆固醇 5.68mmol/L, 对该患者高血压的诊断应为

- A. 1 级, 高危
- B. 2 级, 高危
- C. 2 级, 很高危
- D. 2 级, 中危
- E. 1 级, 很高危

102. 男, 20 岁。3 天前受凉后出现咳嗽、咳白黏痰, 发热 39°C, 胸片示左下肺大片渗出影, 予青霉素静点, 如有效则最先出现的是

- A. 胸片示片状阴影消散
- B. 咳嗽好转
- C. 体温降至正常
- D. 痰色转黄
- E. 痰量减少

103. 男, 69 岁。持续上腹痛伴呕吐 6 小时, 腹痛逐渐加重, 蜷曲位稍减轻, 发病前曾与朋友聚餐。查体: 巩膜无黄染, 上腹部肌紧张, 无反跳痛, Murphy 征阴性, 肠鸣音 3 次/分。最可能的诊断是

- A. 急性胃炎
- B. 急性胰腺炎
- C. 急性胆囊炎

- E. 急性肠梗阻

104. 女, 16 岁。低热伴乏力、食欲缺乏、恶心、呕吐 3 天, 来诊当日发现巩膜黄染。实验室检查: ALT 860U/L, TBil 120 μ mol/L。出生时曾注射乙肝疫苗。本病的病理特点不包括

- A. 假小叶形成
- B. 肝细胞气球样变性
- C. 肝细胞点状坏死
- D. 炎症细胞浸润
- E. 毛细胆管内胆栓形成

105. 男, 33 岁。有溃疡性结肠炎病史, 4 天前出现脓血便, 未行系统治疗。1 天前又出现高热、明显腹胀。体格检查: 腹膨隆, 明显压痛和反跳痛, 肠鸣音减弱。X 线腹部平片可见结肠扩张, 结肠袋形消失。此患者最可能出现的并发症是

- A. 结核性腹膜炎
- B. 自发性腹膜炎
- C. 中毒性巨结肠
- D. 肠穿孔
- E. 结肠狭窄

106. 男, 65 岁。因腹水服用利尿剂 2 周。3 天来出现少语寡言及随地便溺。5 年前诊断为肝硬化。目前行为异常的原因首先考虑为

- A. 神经症
- B. 脑血管意外
- C. 肝性脑病
- D. 电解质紊乱
- E. 代谢性酸中毒

107. 女, 20 岁。3 个月来发热、盗汗、胸痛、腹胀。查体: 巩膜无黄染, 颈静脉无怒张, 腹部移动性浊音 (+)。腹水: 比重 1.020, 蛋白定量 40g/L, 白细胞计数 600 $\times 10^6$ /L, 单核细胞 0.80。最可能的诊断为

- A. 缩窄性心包炎

- C. 肝硬化腹水
- D. 原发性腹膜炎
- E. 结核性腹膜炎

108. 男, 35 岁。呕血并黑便 3 小时。既往有十二指肠溃疡病史 5 年。目前不宜选择的检查是

- A. 凝血功能
- B. 肝功能检查
- C. 胃镜
- D. 腹部 B 超
- E. 上消化道 X 线钡餐造影

109. 男, 30 岁。饥饿性上腹痛 2 年, 进食后可缓解。胃镜检查: 十二指肠溃疡愈合期, 快速尿素酶试验阳性。最有效的治疗方案是

- A. 奥美拉唑+枸橼酸铋钾+克拉霉素
- B. 法莫替丁+阿莫西林+克拉霉素
- C. 西咪替丁+克拉霉素+左氧氟沙星
- D. 奥美拉唑+硫糖铝
- E. 奥美拉唑+阿莫西林+替硝唑+果胶铋

110. 女, 28 岁。活动后心悸、气短 1 个月。既往有游走性关节肿痛病史。查体: 双颊呈紫红色, 叩诊心包饱满, 心尖部可闻及舒张期强杂音。该患者最可能的诊断是

- A. 主动脉瓣关闭不全
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 肺动脉瓣狭窄
- E. 二尖瓣关闭不全

111. 女, 48 岁。胸痛每次发作 2~3 分钟, 含硝酸甘油 1~2 秒后疼痛即消失。最可能的诊断是

- A. 心绞痛
- B. 心脏神经症
- C. 心肌梗死
- D. 胸膜炎

112. 某医疗机构 1 周内收治多名患手足口病的小学生, 未按规定履行报告职责, 也未及时采取控制措施, 致使疫情扩散。县卫生行政部门得知此情况后立即启动应急预案, 及时控制了疫情, 同时对事件进行调查, 认为该医疗机构行为违法且情节严重, 依法作出处理。该处理是

- A. 责令改正
- B. 通报批评
- C. 吊销《医疗机构执业许可证》
- D. 给予警告
- E. 暂停执业活动

113. 女, 40 岁。产后卧床 5 天, 突发左下肢肿胀、疼痛。查体: 左股三角区压痛阳性, 左大腿肿胀, 皮温升高, 小腿前静脉扩张, 无压痛。该患者血栓形成最可能的部位是

- A. 股静脉
- B. 小隐静脉
- C. 腘静脉
- D. 大隐静脉
- E. 髂-股静脉

114. 男, 65 岁。排便习惯改变、腹胀、乏力、消瘦 2 个月, 直肠指诊(-), 粪便潜血(+), 为明确诊断最适宜的检查是

- A. 腹部 X 线平片
- B. 血 CEA
- C. 腹部 B 超
- D. 腹腔镜
- E. 结肠镜

115. 男, 40 岁。今晨咯血 150ml, 无发热。幼时起反复咳嗽、咳痰。查体: T36.8°C, BP120/70mmHg, 左肺可闻及湿啰音。该患者最可能的诊断是

- A. 肺结核
- B. 支气管扩张症
- C. 支气管肺癌

E. 支原体肺炎

116. 男, 35 岁。半小时前被自行车撞伤左胸, 伤后疼痛, 活动后加重, 呼吸困难逐渐加重。查体: P110 次/分, 气管向右移位, 皮下气肿 (+)。其诊断可能性最大的为

- A. 闭合性气胸
- B. 张力性气胸
- C. 肋骨骨折
- D. 肋骨骨折并气胸
- E. 肋骨骨折并张力性气胸

A3/A4 型选择题 (117~129 题)

答题说明

以下提供若干个案例, 每个案例有若干个考题。请根据提供的信息, 在每题的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(117~119 题共用题干)

女, 28 岁。妊娠 2 个月, 到某大学附属医院妇产科接受人工流产手术, 接诊医师在给患者检查时, 旁边有 10 多位男女见习医学生。患者要求见习医学生出去, 被接诊医师拒绝, 随后医师边操作边给医学生讲解。术后患者质问医师为何示教未事先告知, 医师认为患者在医院无隐私, 后患者以隐私权被侵犯为由, 要求当地卫生行政部门进行处理。

117. 基于该案例, 下列说法符合伦理的是
- A. 临床教学观摩应征得患者同意
 - B. 患者应无条件配合接诊医师的教学工作
 - C. 对于不接受临床示教的患者不应做人工流产手术
 - D. 教学医院的患者没有拒绝临床教学观摩的权利
 - E. 教学医院就诊的患者没有要求保护隐私的权利

118. 基于该案例, 该患者就诊期间未被满足的心理需要为
- A. 尊重的需要

- C. 归属与爱的需要
- D. 自我实现的需要
- E. 安全的需要

119. 基于该案例, 卫生行政部门给予当事医师警告处分。处分的依据是

- A. 医师法
- B. 药品管理法
- C. 行政处罚法
- D. 母婴保健法
- E. 精神卫生法

(120~121 题共用题干)

女, 38 岁。左乳房肿块 2 个月。无疼痛、发热。查体: 左乳外上象限 5.5cm×3cm 肿块, 质硬, 边界不清楚, 无压痛, 与皮肤轻度粘连, 与胸肌无粘连; 左腋窝扪及一 2cm×1cm 质硬淋巴结, 孤立, 活动, 无触痛; 颈及锁骨上未扪及肿大淋巴结。胸片及肝脏 B 超未见异常。

120. 该患者初步诊断左乳腺癌, 其临床分期是
- A. T₃N₁M₀
 - B. T₂N₁M₀

C. T₂N₂M₀

E. T₄N₂M₀

121. 为明确诊断并决定新辅助化疗方法最佳的检查方法是

- A. 手术切除活检
- B. 乳腺 B 超
- C. 细针针吸细胞学
- D. 空心针穿刺活检
- E. 血清肿瘤标志物检测

(122~123 题共用题干)

女, 68 岁。下腹痛、腹泻半年, 呈隐痛, 无明确定位, 近 2 月来感乏力, 便中带血, 入院检查。查体: 口唇面色苍白, 右下腹压痛, 可触及 5cm×3cm, 边界欠清的包块, 质地硬, 轻压痛, Hb 78g/L。

122. 为明确诊断, 最有价值的检查方法是

- A. 纤维结肠镜检查
- B. 大便潜血试验
- C. 钡剂灌肠检查
- D. 直肠指诊
- E. CEA 测定

123. 该患者最可能的诊断是

- A. 结肠息肉
- B. 结肠癌
- C. 溃疡性结肠炎
- D. 肠结核
- E. 肠梗阻

(124~126 题共用题干)

男, 23 岁。突然晕倒 2 小时。5 天前因车祸撞伤左下胸部, 曾卧床休息 2 天。查体: P140 次/分, R30 次/分, BP75/60mmHg, 神志清, 面色苍白, 左下胸有皮肤瘀斑, 腹部膨隆, 轻度压痛, 反跳痛 (+), 移动性浊音 (+), 肠鸣音减弱。

124. 最可能的诊断是

- A. 小肠破裂
- B. 结肠破裂
- C. 胃破裂
- D. 脾破裂
- E. 肾破裂

125. 为尽快明确诊断, 首选的辅助检查是

- A. 腹部 MRI
- B. 胸部 X 线片
- C. 腹部 B 超
- D. 腹部 CT
- E. 腹部 X 线片

126. 最佳的处理方法是

- A. 小肠修补术
- B. 结肠修补术
- C. 胃修补术
- D. 脾切除术
- E. 肾切除术

(127~129 题共用题干)

男性, 60 岁, 1 年来在生气或劳累时发生左胸前区闷痛。伴左后背部酸痛, 有时在休息时也有发生。心电图未见异常。

127. 采集病史时应特别注意询问

- A. 胸痛部位、性质、放射部位、诱因及缓解方式
- B. 吸烟、饮酒史
- C. 冠心病家族史
- D. 近期心电图检查结果
- E. 超声心动图检查情况

128. 最有价值的无创检查方法是

- A. Holter 动态心电图检查
- B. 心脏 X 线检查
- C. 超声心动图
- D. 运动放射性核素心肌灌注显像

129. 心电图负荷试验的适应症是

- A. 不稳定型心绞痛
- B. 心肌梗死后心绞痛

C. 心肌梗死急性期

- D. 心肌梗死合并心律失常
- E. 稳定型心绞痛或胸痛原因未明

B1 型选择题（130~150 题）

答题说明

以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

（130~131 题共用备选答案）

- A. 直腿抬高试验
- B. 拾物试验
- C. Mills 征
- D. Hoffmann 征
- E. 抽屉试验

130. 对于腰椎结核诊断有意义的是

131. 对交叉韧带损伤诊断有意义的是

（132~133 题共用备选答案）

- A. 尿细菌培养加药物敏感试验
- B. 尿红细胞形态分析
- C. 尿脱落细胞检查
- D. 尿道分泌物涂片
- E. 尿液成分分析

132. 有助于肾小球肾炎诊断的检查是

133. 有助于膀胱肿瘤诊断的检查是

（134~136 题共用备选答案）

- A. 碱液反流性胃炎
- B. 输出袢梗阻
- C. 倾倒综合征
- D. 慢性不完全性输入袢梗阻

134. 切除术后，表现为上腹部剧烈疼痛，呕吐物量少，不含胆汁，最可能的原因是

135. 胃大部切除术后，进餐 2 小时出现头昏、面色苍白、出冷汗，最可能的原因是

136. 胃大部切除术后 2 年，剑突下持续性疼痛，进食后加重，常有胆汁性呕吐，呕吐后仍有疼痛，抗酸剂无效。

（137~138 题共用备选答案）

- A. 卡马西平
- B. 碳酸锂
- C. 氟西汀
- D. 利培酮
- E. 氯丙嗪

137. 属于非典型抗精神分裂症药物的是

138. 属于选择性 5-羟色胺重吸收抑制剂的是

（139~140 题共用备选答案）

- A. 全神贯注
- B. 精确操作
- C. 合理配伍
- D. 镇静从容
- E. 争分夺秒

139. 药物治疗对医生的道德要求是

(141~143 题共用备选答案)

- A. 常发生在进油腻餐后
 - B. 过食、饮酒后发生
 - C. 腹痛在剧烈活动后发生
 - D. 持续性腹痛阵发加重
 - E. 转移性疼痛
141. 急性胆囊炎发病与饮食的关系
142. 急性胰腺炎发病与饮食的关系
143. 胆石症合并胆道感染时腹痛为

(144~145 题共用备选答案)

- A. 碱性磷酸酶
 - B. 谷氨酸氨基转移酶
 - C. 甲胎蛋白
 - D. 白蛋白
 - E. 丙氨酸氨基转移酶
144. 反映肝硬化肝功能减退的指标是
145. 继发性肝癌一般不会发生变化的指标是

(146~148 题共用备选答案)

- A. 患者血压明显升高。查体：血压 200/130mmHg (26.6/16.9kPa)，眼底出血、渗出、视神经乳头水肿。实验室报告：肾功能不全
- B. 患者血压明显升高，伴有剧烈头痛、呕吐、

抽搐

- C. 患者平日有心悸、胸痛、劳力时气促、起立或运动时眩晕。查体：胸骨左缘第 3~4 肋间可闻较粗糙的喷射性收缩期杂音，屏气时杂音增强
 - D. 患者一周前出现发热、全身无力，现自觉心悸、胸闷。查体：心率 120 次/min，偶闻室性期前收缩。实验室回报 CK、GOT (AST)、LDH 增高
 - E. 患者气急，端坐呼吸。查体：心脏扩大，听诊可闻及第四心音奔马律，双下肢水肿。超声心动图报告：左心室腔明显扩大
146. 符合恶性高血压的是
147. 符合扩张型心肌病的是
148. 符合病毒性心肌炎的是

(149~150 题共用备选答案)

- A. 粉尘粒径 < 20 μm
 - B. 粉尘粒径 < 15 μm
 - C. 粉尘粒径 < 10 μm
 - D. 粉尘粒径 < 5 μm
149. 可吸入性粉尘指
150. 呼吸性粉尘指

第二单元

A1型选择题（1~58题）

答题说明

以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 下列疾病导致左心室前负荷增加的是

- A. 肺动脉高压
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 高血压
- D. 肺动脉瓣狭窄
- E. 主动脉瓣关闭不全

2. 重症糖尿病患者施行择期手术前，血糖和尿糖应控制在

- A. 血糖 5.6~11.2mmol/L，尿糖（+~++）
- B. 血糖小于 5.6mmol/L，尿糖（-）
- C. 血糖小于 11.2mmol/L，尿糖（-）
- D. 血糖小于 5.6mmol/L，尿糖（+）
- E. 血糖大于 11.2mmol/L，尿糖（+）

3. 口服药物被肠壁和肝脏代谢后进入体循环的药量明显减少的现象称为

- A. 重吸收
- B. 首过消除
- C. 首剂效应
- D. 生物转化
- E. 肠肝循环

4. 晚期产后出血常见的原因是

- A. 胎盘、胎膜残留
- B. 胎盘附着面感染
- C. 产后滋养细胞肿瘤
- D. 剖宫产术后子宫伤口裂开

5. 肉眼观察肾体积明显缩小，质地变硬，表面有大的不规则瘢痕凹陷，该病变性质最可能是

- A. 晚期肾小球肾炎
- B. 局灶性节段性肾小球肾炎
- C. 轻微病变性肾小球肾炎
- D. 良性高血压病引起的萎缩肾
- E. 慢性肾盂肾炎

6. 子宫内膜异位症的确诊依据是

- A. 典型的病史
- B. B型超声检查
- C. 血 CA125 升高
- D. 病理组织学检查
- E. 妇科检查

7. 患者感到周围的环境和事物失去了色彩生机好像与自己隔了一层膜。该表现属于

- A. 幻想
- B. 人格解体
- C. 梦样状态
- D. 朦胧状态
- E. 非真实感

8. 以下关节中，类风湿关节炎较少累及的是

- A. 髋关节
- B. 手指关节
- C. 跖趾关节
- D. 近端指间关节

9. 下腹部手术拆线时间一般为术后

- A. 7~9 日
- B. 4~5 日
- C. 13~14 日
- D. 6~7 日
- E. 10~12 日

10. 急性脊髓炎的可能诱因是

- A. 疫苗接种
- B. 肠道感染
- C. 败血症
- D. 肺炎
- E. 强直性脊柱炎

11. 下列属于冠状动脉粥样硬化性心脏病主要危险因素的是

- A. 脑力劳动者
- B. 生活节奏感
- C. 肥胖
- D. 进取心强
- E. 长期饮酒

12. 小儿特有的能量需求是

- A. 食物热力作用
- B. 排泄丢失
- C. 活动所需
- D. 生长发育
- E. 基础代谢

13. 下列不属于急性一氧化碳中度中毒表现的是

- A. 判断力降低
- B. 腹痛
- C. 运动失调
- D. 视物模糊
- E. 全身乏力

14. 溢出性蛋白尿的主要成分为

- A. IgG

C. 白蛋白

- D. β_2 微球蛋白
- E. Tamm-Horsfall 蛋白

15. 下列关于中毒的诊治过程的描述, 错误的是

- A. 待毒物标本检验结果汇报后治疗
- B. 了解工作环境、毒物接触史
- C. 留取可能含毒物的相关标本
- D. 了解既往史、药物服用史
- E. 进行系统的体格检查

16. 下列药物中能用于治疗阿尔茨海默病(老年性痴呆)的药物是

- A. 多巴胺
- B. 卡比多巴
- C. 吡拉西坦
- D. 羧甲司坦
- E. 司坦夫定

17. 关于产前筛查不正确的是

- A. 产前筛查试验不是确诊试验
- B. 筛查阳性结果意味患病风险升高
- C. 阴性结果提示正常
- D. 胎儿结构异常常用超声影像学筛查
- E. 胎儿非整倍体常在早/中孕期行母血清学筛查

18. 诊断胎儿窘迫的可靠依据是

- A. 宫缩时胎心减慢, 宫缩周期可恢复
- B. 胎儿头皮血 pH7.28
- C. 胎心监护出现变异减速
- D. 胎动时胎心率为 170 次/分
- E. 胎心监护出现频发晚期减速

19. 机体发生创伤后, 营养状况的评估指标中不包括的是

- A. 血小板测定
- B. 体重

- D. 皮褶厚度
E. 淋巴细胞测定
20. 决定肾结核的治疗方法，除全身情况外主要依据
- A. 膀胱刺激症状
B. 血尿程度
C. 尿中找到结核杆菌
D. 膀胱镜检查所见
E. 静脉尿路造影或逆行肾盂造影
21. 高危儿主要指
- A. 产后感染
B. 高危产妇分娩的新生儿
C. 出生体重 $\geq 2500\text{g}$
D. 新生儿的兄姐有婴儿期死亡
E. 孕龄 ≥ 37 周或 < 42 周
22. 肠外营养时，最易发生的并发症是
- A. 吸入性肺炎
B. 急性胆管炎
C. 急性胰腺炎
D. 急性胃肠炎
E. 全身性感染
23. 不属于精神分裂症常见症状的是
- A. 阳性症状
B. 冲动行为
C. 记忆力减退
D. 阴性症状
E. 情感症状
24. 表现为排尿突然中断的疾病是
- A. 尿道结石
B. 肾结石
C. 膀胱结石
D. 肾结核
E. 肾癌
- A. 生后 2~3 天出现黄疸
B. 一般情况良好
C. 足月儿 14 天内消退
D. 足月儿不超过 $204\mu\text{mol/L}$ (12mg/dl)
E. 结合胆红素超过 $25\mu\text{mol/L}$
26. 前臂尺、桡骨双骨折青年患者，经手法复位失败，此时应采取的合理治疗，是
- A. 小夹板同定，3 周后再手术治疗
B. 石膏管型固定，3 周后再手术治疗
C. 持续骨牵引治疗
D. 手术切开复位内固定加外固定
E. 待骨折愈合后，再行矫形手术
27. 人体铁吸收率最高的部位是
- A. 十二指肠及空肠上段
B. 空肠及回肠上段
C. 升结肠及横结肠上段
D. 胃及十二指肠上段
E. 回肠及升结肠上段
28. 关于急性宫颈炎，下列何项是不正确的是
- A. 急性宫颈炎常见病原菌是淋球菌感染
B. 淋球菌引起的急性宫颈炎侵入较深，通过淋巴管引起蜂窝织炎
C. 链球菌、葡萄球菌引起的急性宫颈炎多见于感染性流产或产褥感染呈浅表扩散
D. 急性宫颈炎以全身治疗为主
E. 急性宫颈炎不伴全身症状
29. 风湿性疾病中以唾液腺炎症为主要病理改变的疾病是
- A. ANCA 相关血管炎
B. 系统性硬化症
C. 系统性红斑狼疮
D. 类风湿关节炎
E. 干燥综合征
30. 急性肾小球肾炎治疗不包括

- B. 抗感染
- C. 低盐及限制液体入量
- D. 糖皮质激素
- E. 利尿

31. 对诊断甲状腺破坏所致甲状腺毒症有重要意义的表现是

- A. 甲状腺肿大
- B. 血 T₃、T₄↑, 甲状腺摄 ¹³¹I 率明显↓
- C. 血 T₃、T₄↑, 甲状腺摄 ¹³¹I 率明显↑
- D. TgAb 与 TPOAb 常明显↑
- E. TSH 明显↓

32. 最容易出现缺血性骨坏死的骨折是

- A. 股骨颈骨折
- B. 股骨转子间骨折
- C. 胫骨干骨折
- D. 桡骨远端骨折
- E. 肱骨外科颈骨折

33. 不符合精神检查原则的是

- A. 在交谈过程中需注意非言语性交流
- B. 建立良好的医患关系
- C. 先问一般性问题, 后问实质性问题
- D. 先提开放式问题, 后提封闭式问题
- E. 对患者的症状可与其辩论纠正

34. 甲状腺切除术后发生了饮水呛咳, 是术中损伤了

- A. 颈丛神经
- B. 喉返神经
- C. 喉上神经内支
- D. 副神经
- E. 喉上神经外支

35. 不属于腺垂体靶腺的是

- A. 甲状腺
- B. 睾丸
- C. 胰腺

E. 卵巢

36. 最常见脑膜刺激征阳性的疾病是

- A. 脑栓塞
- B. 脑血栓形成
- C. 高血压脑病
- D. 短暂性脑缺血发作
- E. 蛛网膜下腔出血

37. 关于肠梗阻临床表现的描述, 正确的是

- A. 低位肠梗阻腹胀及腹痛不明显
- B. 低位小肠梗阻 X 线检查可见多个气液平面
- C. 高位肠梗阻呕吐物多为粪性
- D. 高位肠梗阻较低位肠梗阻腹胀明显
- E. 低位肠梗阻呕吐症状出现早

38. 导致肺水肿最直接的原因是

- A. 肺动脉压升高
- B. 右心室压升高
- C. 肺静脉压升高
- D. 左心室舒张压升高
- E. 右心房压升高

39. 下列哪项不是子宫收缩过强的临床特点

- A. 持续性腹痛、拒按
- B. 病理性缩复环
- C. 血尿
- D. 子宫痉挛性狭窄环
- E. 指压宫底凹陷

40. 我国规定 1 岁内必须完成的计划免疫是

- A. 卡介苗
- B. 乙脑疫苗
- C. 流脑疫苗
- D. 流感疫苗
- E. 甲肝疫苗

41. 引起病人右侧眼睑下垂, 右侧瞳孔散大的最可能原因是



- B. 动眼神经麻痹
- C. 小脑幕切迹疝
- D. 糖尿病眼底病
- E. 右侧视神经损害

42. 下列表现最能提示非肾小球源性血尿的是

- A. 尿红细胞呈多形性
- B. 红细胞形态均一
- C. 尿沉渣见红细胞管型
- D. 没有血凝块
- E. 没有肉眼血尿

43. 肾细胞癌最常见的病理类型是

- A. 嫌色细胞癌
- B. 透明细胞癌
- C. 未分类肾细胞癌
- D. 乳头状肾细胞癌
- E. 集合管癌

44. 内生软骨瘤的 X 线表现, 是

- A. 溶骨性骨破坏
- B. 葱皮样骨膜反应
- C. 日光放射状骨膜反应
- D. 膨胀性低密度区内夹杂钙化斑块
- E. 密度增高的肿瘤骨

45. 下列疾病中哪种不容易发生生殖器异常出血

- A. 颗粒细胞瘤
- B. 黄体萎缩不全
- C. 老年性阴道炎
- D. 卵巢纤维瘤
- E. 子宫内膜异位症

46. 肾挫伤的急诊处理是

- A. 肾修补
- B. 留置导尿
- C. 手术探查
- D. 肾穿刺引流

47. Dugas 征表现阳性的是

- A. 肩关节脱位
- B. 桡骨头半脱位
- C. 肱骨外科颈骨折
- D. 肘关节脱位
- E. 锁骨骨折

48. 脊髓型颈椎最常见的临床表现

- A. 恶心呕吐
- B. 四肢无力, 行走及持物不稳
- C. 眩晕, 头痛
- D. 颈肩痛, 压头试验阳性
- E. 猝倒, 视觉障碍

49. 不会引起病理性颅内压增高的是

- A. 脑震荡
- B. 颅内肿瘤
- C. 脑积水
- D. 颅内出血
- E. 狭颅症

50. 不属于器官特异性自身免疫病的是

- A. 原发性免疫性血小板减少症
- B. 恶性贫血
- C. 重症肌无力
- D. 慢性甲状腺炎
- E. 类风湿关节炎

51. 营养性缺铁性贫血的血象特点是

- A. RBC 减少比 Hb 减少明显
- B. 粒细胞分叶多
- C. MCH=32Pg
- D. 红细胞中央淡染区扩大
- E. 粒细胞左移

52. 患者感觉大脑已被电脑控制, 自己是机器人, 此症状是

- A. 关系妄想
- B. 被害妄想

- D. 物理影响妄想
- E. 超价观念

53. 属于枕左前位分娩机制的项目, 正确的是

- A. 下降动作呈持续性
- B. 进入骨盆入口时, 胎头呈俯屈状态
- C. 俯屈动作完成后, 胎头以枕额径通过产道
- D. 胎头颅骨最低点达骨盆最大平面时, 出现内旋转
- E. 内旋转动作完成于第一产程末期

54. 胃癌扩散至横结肠, 其最可能的转移方式属于

- A. 血性转移
- B. 淋巴转移
- C. 直接浸润
- D. 跳跃转移
- E. 腹膜种植转移

55. 关于子宫下段, 下列哪项是错误的

- A. 系由子宫峡部形成, 非孕时长约 1cm
- B. 临产后由于子宫收缩极性的缘故, 峡部被拉长形成子宫下段
- C. 下段为被动扩张段, 随产程进展而越来越长越薄
- D. 子宫上下段肌壁厚薄不同, 在产程中上、

下段交界处在子宫内面形成一环状隆起, 称生理性缩复环

E. 子宫下段常被产科医师选择为剖宫术子宫切开处

56. 门静脉高压症患者出现食管胃底曲张静脉破裂大出血, 易并发

- A. 肝性脑病
- B. 急性肾衰竭
- C. 急性肝衰竭
- D. 肺水肿
- E. 急性心力衰竭

57. 子宫脱垂最常见的病因是

- A. 习惯性便秘
- B. 肥胖体型
- C. 长期重体力劳动
- D. 分娩损伤
- E. 慢性咳嗽

58. 判断小儿体格发育最常用指标是

- A. 动作发育能力
- B. 语言发育程度
- C. 智能发育水平
- D. 神经反射发育
- E. 体重、身高、头围

A2 型选择题 (59~111 题)

答题说明

每一道试题是以一个小案例出现的, 其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

59. 男, 20岁。踢球时突然过性意识丧失, 后自行恢复。发作时无四肢抽搐和口吐白沫。超声心动图示舒张期室间隔与后壁厚度之比为1.7, SAM现象阳性。该患者意识丧失最可能

- A. 血管迷走性晕厥
- B. 体位性低血压
- C. 肥厚型梗阻性心肌病
- D. 限制型心肌病

60. 女, 60 岁。心悸、多汗、消瘦 2 年。症状加重伴咽痛、发热 1 周。恶心、呕吐、腹泻 1 天。查体: $T40.2^{\circ}\text{C}$, $P180$ 次/分, 大汗淋漓, 甲状腺弥漫性 II 度肿大, 可闻及血管杂音。不适当的处理措施是

- A. 抗甲状腺药物
- B. 复方碘溶液
- C. 积极控制感染
- D. 糖皮质激素
- E. 使用阿司匹林降温

61. 女, 20 岁。足癣多年, 近 1 周发热, 右小腿出现片状红斑, 腹股沟淋巴结肿大、疼痛。最可能的致病菌是

- A. 乙型溶血性链球菌
- B. 铜绿假单胞菌
- C. 梭状芽孢杆菌
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. 表皮葡萄球菌

62. 男, 1 岁半。生后半年出现尿有骚臭味, 经常呕吐, 1 岁时发现智力较同龄儿落后。查体: 目光呆滞, 皮肤白皙, 毛发浅黄, 为明确诊断的检查是

- A. 血苯丙氨酸
- B. 血 T_3 、 T_4
- C. 染色体核型分析
- D. 头颅 CT
- E. 脑电图

63. 女, 64 岁。2 型糖尿病病史 10 年, 近 2 个月出现双下肢水肿。查体: $BP140/100\text{mmHg}$, 神志清楚, 营养差, 甲状腺无肿大, 双肺未闻及干湿啰音, 心率 70 次/分, 律齐, 肝脾未触及, 双下肢明显水肿。实验室检查: 空腹血糖 9.6mmol/L , 血清胆固醇 7.6mmol/L , 低密度脂蛋白胆固醇 4.6mmol/L , 血浆白蛋白 28g/L 。为明确水肿原因, 首先应进行检查的是

- A. 双肾 CT

- C. 糖化血红蛋白
- D. 胰岛素释放试验
- E. 尿蛋白定量

64. 女, 20 岁。发热、贫血、出血 10 天, 伴关节痛。查体: 肝脾轻度肿大, 颈部淋巴结肿大。血常规: 白细胞计数 $35 \times 10^9/\text{L}$, 血红蛋白 60g/L , 血小板 $80 \times 10^9/\text{L}$ 。首先考虑为

- A. 风湿热
- B. 病毒感染
- C. 急性白血病
- D. 淋巴瘤
- E. 系统性红斑狼疮

65. 男, 63 岁。2 型糖尿病 14 年, 血压升高 5 年, 尿蛋白定量 2.6g/d , 血肌酐 $132\mu\text{mol/L}$ 。其蛋白尿性质应为

- A. 肾小球性
- B. 功能性
- C. 肾小管性
- D. 溢出性
- E. 分泌性

66. 男, 32 岁。腹泻 3 个月, 大便每日 7~10 次, 稀便, 无脓血及黏液。有吸毒史 2 年。查体: $T37.5^{\circ}\text{C}$, 消瘦, 神志清楚, 肛门周围可见疱疹。实验室检查: 粪便镜检偶见白细胞。为明确诊断, 最重要的检查是

- A. 抗单纯疱疹病毒 IgM
- B. 抗-EBV IgM
- C. 结核抗体
- D. 抗-CMV IgM
- E. 抗-HIV

67. 一男孩, 10 岁。右膝部疼痛跛行 2 年, 有夜间痛, 检查右膝活动良好, 右髌不能伸直, 大腿肌肉萎缩, 血沉 28mm/h 。X 线片示髌关节骨质疏松, 诊断优先考虑为

- A. 髌关节类风湿性滑膜炎

- C. 髌关节一过性滑膜炎
- D. 髌关节风湿性滑膜炎
- E. 膝关节滑膜结核

68. 男, 70 岁。双手指间关节疼痛 2 年, 每天晨僵数分钟。查体: T36.6°C, P70 次/分, R 18 次/分, BP100/70mmHg, 皮肤未见皮疹, 心肺腹未见异常, 双手远端指间关节 Heberden 结节, 双手近端指间关节骨性膨大。血沉正常, ASO (-), RF (-)。可选择的一线治疗药物是

- A. 秋水仙碱
- B. 甲氨蝶呤
- C. 柳氮磺吡啶
- D. 双氯芬酸钠
- E. 青霉素

69. 男孩, 2 岁。车祸受伤致左大腿疼痛、活动明显受限 2 小时。查体: 左大腿中段肿胀, 异常活动。X 线片示左股骨中段骨不连续, 重叠 2cm, 向外成角 5°, 无明显旋转。最适宜的治疗方法是

- A. 切开复位内固定
- B. 小夹板外固定
- C. 垂直悬吊牵引
- D. 石膏外固定
- E. 闭合复位内固定

70. 男, 60 岁。无痛性肉眼血尿 2 个月, 尿中偶有血块, 伴膀胱刺激症状。B 超见膀胱右侧壁见一枚 1.5cm×2cm 带蒂软组织影。应考虑的诊断是

- A. 膀胱结石
- B. 腺性膀胱炎
- C. 膀胱异物
- D. 膀胱憩室
- E. 膀胱肿瘤

71. 早产儿, 胎龄 32 周。生后 3 小时出现呼吸困难、呻吟。胸部 X 线片示双肺透亮度降低,

- A. 地塞米松
- B. 持续气道正压通气
- C. 头罩吸氧
- D. 纠正酸中毒
- E. 抗生素

72. 女, 48 岁。双手关节反复肿痛伴晨僵 1 年余, 近 2 周来疼痛加重伴晨僵, 活动后可缓解。首先考虑的诊断是

- A. 骨性关节炎
- B. 痛风
- C. 银屑病关节炎
- D. 类风湿关节炎
- E. 风湿性关节炎

73. 男, 65 岁。活动时胸痛 1 年, 加重 1 个月。查体: 胸骨右缘第 2 肋间可闻及 4/6 级收缩期喷射性杂音, 向颈部传导。该患者最合理的治疗措施是

- A. 口服硝酸酯类药物
- B. 口服 β 受体拮抗剂
- C. 冠状动脉介入治疗
- D. 口服钙通道阻滞剂
- E. 主动脉瓣置换术

74. 男, 80 岁。高血压病史 10 余年, 长期服用钙通道阻滞剂, 1 个月前因血压控制不满意加用美托洛尔 25mg bid。近 1 周觉乏力、倦怠、间断黑矇。查体: BP 110/70mmHg, 心率 50 次/分, 心律不齐, 各瓣膜听诊区未闻及杂音。心电图示 PR 间期逐渐延长直至 QRS 波群脱落, 最恰当的处理是

- A. 将美托洛尔调整为 25mg qd
- B. 将美托洛尔调整为 12.5mg bid
- C. 植入永久起搏器
- D. 停用美托洛尔
- E. 将美托洛尔更换为地尔硫草 30mg tid

75. 女, 33 岁。半年来逐渐出现坐立不安, 搓

感觉大脑迟钝，行动迟缓。可初步诊断为

- A. 焦虑症
- B. 恐惧性焦虑障碍
- C. 精神分裂症
- D. 应激相关障碍
- E. 抑郁症

76. 女，60岁。晨起后突感右上肢无力，持物掉落，伴言语不利，休息半小时后缓解。既往有高血压、糖尿病病史。查体：未见脑神经异常，四肢运动、感觉及共济运动正常。最可能的诊断是

- A. 低血糖
- B. 短暂性脑缺血发作
- C. 高血压脑病
- D. 癫痫单纯部分性发作
- E. 脑出血

77. 初产妇，25岁，妊娠41周，宫缩规律，枕左前位，胎心144次/分，宫口开大3cm，胎头未衔接，最可能符合本产妇实际情况的骨盆测量数值是

- A. 对角径13cm
- B. 髂棘间径25cm
- C. 坐骨棘间径10cm
- D. 髂嵴间径27cm
- E. 骶耻外径17cm

78. 女，68岁。顺产3个子女，腰骶部疼痛2年，站立时明显，休息时缓解，近半年行走时自觉有块状物自阴道口脱出，妇科检查：平卧位时用力向下屏气，宫颈达处女膜缘阴道口，可见宫颈。其子宫脱垂分度是

- A. II度重型
- B. I度轻型
- C. III度
- D. II度轻型
- E. I度重型

厌油腻30天，尿频1周。平素月经规律。最可能的诊断是

- A. 妊娠剧吐
- B. 急性胃炎
- C. 病毒性肝炎
- D. 肾盂肾炎
- E. 早孕反应

80. 男，35岁。因发热5天，尿少1天，于1月10日就诊。查体：T 37.8℃，P 108次/分，BP 80/55mmHg，面部潮红，球结膜充血水肿，腋下可见出血点。实验室检查：血WBC $19 \times 10^9/L$ ，异型淋巴细胞15%，尿蛋白(+++)。首先考虑的诊断是

- A. 急性肾盂肾炎
- B. 肾综合征出血热
- C. 伤寒
- D. 钩端螺旋体病
- E. 流感

81. 女，38岁。发热、腹泻2天。每日排便5~8次。查体：T 37.8℃，腹软，左下腹压痛(+)。实验室检查：血白细胞计数 $11 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.72。粪便镜检：WBC 20/HP，RBC 10/HP，潜血(+)。最可能的诊断是

- A. 食物中毒
- B. 急性肠炎
- C. 霍乱
- D. 消化道出血
- E. 急性细菌性痢疾

82. 正常小儿，身高88cm，体重12.5kg，出牙16颗，现会双脚跳，会用勺子吃饭。其最可能的年龄是

- A. 1岁
- B. 3岁
- C. 2岁
- D. 4岁
- E. 5岁

83. 男, 20 岁。车祸撞伤右上腹部 1 小时。查体: T37.0°C, P110 次/分, R20 次/分, BP 90/70mmHg。痛苦貌, 皮肤苍白, 右上腹皮肤瘀斑, 触痛明显, 移动性浊音 (+)。抢救首选的扩容液体是

- A. 低分子右旋糖酐
- B. 10%葡萄糖溶液
- C. 浓缩红细胞
- D. 5%葡萄糖溶液
- E. 平衡盐溶液

84. 女, 16 岁。3 天来低热伴乏力、食欲缺乏、恶心、呕吐, 来诊当日家长发现眼黄。出生时增注射乙肝疫苗。实验室检查: ALT860U/L, TBil120 μ mol/L。最可能的诊断是

- A. 戊型肝炎
- B. 丁型肝炎
- C. 丙型肝炎
- D. 乙型肝炎
- E. 甲型肝炎

85. 女婴, 1 天, 足月产。出生 1 分钟 Apgar 评分 3 分。查体: P90 次/分, R30 次/分, 嗜睡, 面色微绀, 前囟饱满, 心音低钝, 四肢肌张力差, 拥抱反射消失。最可能的诊断是

- A. 新生儿肺透明膜病
- B. 新生儿湿肺
- C. 新生儿缺氧缺血性脑病
- D. 胎粪吸入综合征
- E. 新生儿低血糖

86. 新生儿, 足月顺产, 出生体重 3000g。1 分钟 Apgar 评分: 呼吸 0, 心率 1, 皮肤颜色 1, 弹足底反应 1, 肌张力 1, 以下处理措施中, 属于初步复苏步骤的是

- A. 气管插管, 正压通气
- B. 肾上腺素经脐静脉注入
- C. 清理呼吸道
- D. 胸外心脏按压

87. 男, 18 岁。右足和右小腿被开水烫伤, 有水疱伴剧痛。创面基底部肿胀发红。该患者烧伤面积和深度的诊断为

- A. 5%浅II度
- B. 5%深II度
- C. 10%浅II度
- D. 10%深II度
- E. 30%浅II度

88. 女, 54 岁。白带增多, 均匀稀薄, 有臭味, 阴道黏膜无明显充血, 阴道 pH 为 5.0, 线索细胞阳性。最可能的诊断是

- A. 急性淋病
- B. 细菌性阴道病
- C. 滴虫阴道炎
- D. 外阴阴道念珠菌病
- E. 老年性阴道炎

89. 女, 19 岁。夜间排尿后突然右下腹剧痛, 随后感恶心, 并呕吐 2 次。平素月经规则。妇科检查: 子宫右侧可触及手拳大小囊实性包块, 触痛, 推移后疼痛加剧。首先考虑

- A. 急性阑尾炎
- B. 急性附件炎
- C. 卵巢黄体破裂
- D. 卵巢囊肿蒂扭转
- E. 输卵管妊娠破裂

90. 小儿, 5 岁。发热 10 天, 热型不定, 伴刺激性咳嗽, 咳出少量黏稠痰。查体: 精神尚可, 双肺呼吸音粗糙及少许喘鸣音。X 线显示肺门阴影明显增浓。根据病例诊断最大的可能是

- A. 呼吸道合胞病毒肺炎
- B. 腺病毒肺炎
- C. 葡萄球菌肺炎
- D. 支原体肺炎
- E. 衣原体肺炎

91. 女, 25 岁。乏力 3 个月。查体:

规：蛋白(++)，颗粒管型 2~3 个/低倍视野。血 BUN12.3mmol/L，Scr276.8 μ mol/L。针对该患者，不应采取的措施是

- A. 控制血压
- B. 根据尿量适当限水
- C. 高蛋白饮食
- D. 低钠饮食
- E. 低磷饮食

92. 男，50 岁。持续高热、头痛、恶心、呕吐、食欲缺乏伴腹泻 3 天。查体：皮肤及巩膜轻度黄染，面部及前胸部明显充血，双腋下可见细小的出血点。实验室检查：血 WBC18.2 $\times 10^9$ /L，PLT60 $\times 10^9$ /L，ALT80U/L，TBil45 μ mol/L，尿蛋白(+++)。最可能的诊断是

- A. 流行性脑脊髓膜炎
- B. 中毒型细菌性痢疾
- C. 急性黄疸型肝炎
- D. 败血症
- E. 肾综合征出血热

93. 女，20 岁。双下肢水肿伴口腔溃疡半年。24 小时尿蛋白定量 4g，ANA1：320，抗 dsDNA 抗体阳性。最可能的诊断是

- A. 原发性肾小球肾炎
- B. 系统性血管炎
- C. 干燥综合征
- D. 系统性硬化病
- E. 系统性红斑狼疮

94. 男，40 岁。突发右腰部剧痛 3 小时，疼痛向右下腹放射，伴恶心、呕吐。最可能的疾病是

- A. 胆石病
- B. 急性胆囊炎
- C. 上尿路结石
- D. 急性阑尾炎
- E. 肾盂肾炎

缩 8 小时，无头盆不称，胎心 148 次/分，宫口开大 3cm，S+1。目前应做的是

- A. 静推地西泮
- B. 继续观察产程进展
- C. 静滴缩宫素
- D. 人工破膜
- E. 静滴硫酸镁

96. 男，50 岁，湖北渔民。腹胀、乏力、纳差 3 年，尿少、全身浮肿 1 个月。无饮酒史及病毒性肝炎史。查体：T 36.2 $^{\circ}$ C，慢性病容，消瘦，巩膜无黄染，有蜘蛛痣，腹膨隆，脾肋下平脐，腹水征(+)，下肢凹陷性水肿。最可能的诊断是

- A. 丙肝肝硬化
- B. 结核性腹膜炎
- C. 乙肝肝硬化
- D. 血吸虫病
- E. 结肠癌

97. 新生儿，23 天。发热 3 天，吃奶差。查体：T39 $^{\circ}$ C，精神差，前囟饱满，脐部可见脓性分泌物。对诊断最有意义的检查是

- A. 血降钙素原
- B. 血培养+脑脊液
- C. 头颅 CT
- D. 血常规+CRP
- E. 血电解质

98. 女，55 岁。间断上腹部不适 2 年。经检查诊断为“慢性胃炎并幽门螺杆菌感染”。医师建议其服用奥美拉唑 20mg、阿莫西林 1000mg、克拉霉素 500mg，均每日 2 次。上述药物的服用疗程应为

- A. 1~2 天
- B. 3~5 天
- C. 7~14 天
- D. 20~30 天
- E. >30 天

99. 女, 42 岁。肉眼血尿 1 个月余。静脉尿路造影 (IVU) 显示双肾功能正常, 右肾盂有充盈缺损 $1.5\text{cm}\times 1.2\text{cm}$, 尿细胞学检查发现肿瘤细胞。治疗方法首选

- A. 放疗
- B. 右肾输尿管全切术
- C. 化疗
- D. 右肾切除术
- E. 肿瘤切除术

100. 男, 35 岁。上腹部间断隐痛 3 年, 与饮食有关, 间有黑便。实验室检查: 血红蛋白 75g/L , 红细胞计数 $3.1\times 10^{12}/\text{L}$, 白细胞计数 $5.9\times 10^9/\text{L}$, 血小板 $130\times 10^9/\text{L}$ 。患者贫血最大可能是以下哪种

- A. 营养不良性贫血
- B. 缺铁性贫血
- C. 慢性肝病贫血
- D. 巨幼细胞贫血
- E. 溶血性贫血

101. 男, 21 岁。手足麻木, 双下肢无力 1 天, 大小便正常。2 周前曾有低热、腹泻。查体: 神志清楚, 脑神经无明显异常, 四肢肌张力降低, 双上肢肌力 3 级, 双下肢肌力 1~2 级, 远端重, 腱反射消失, 双侧腓肠肌压痛 (+), 病理征未引出, 无明显感觉异常。心电图和头颅 CT 未见明显异常。最可能的诊断是

- A. 脑梗死
- B. 周期性瘫痪
- C. 吉兰-巴雷综合征
- D. 脑出血
- E. 视神经脊髓炎

102. 男婴, 10 个月。长期腹泻, 近 1 个月发现其面色渐发黄, 不愿活动, 外观虚胖, 皮肤散在出血点, 头部时而震颤, 该患儿血象应有的改变是

- A. 红细胞以大者为多, 其总数减低大于血红

B. 红细胞以大者为多, 其总数减低小于血红蛋白减低

C. 红细胞以小者为多, 其总数减低大于血红蛋白减低

D. 红细胞以小者为多, 其总数减低小于血红蛋白减低

E. 红细胞与血红蛋白成比例减低

103. 男, 17 岁。右大腿下端肿痛 2 月余。摄片见股骨下端有境界不清的骨质破坏区、骨膜增生及放射状阴影, 两端可见骨膜三角, 最可能的诊断是

- A. 骨结核
- B. 骨髓炎
- C. 骨肉瘤
- D. 骨巨细胞瘤
- E. 骨软骨瘤

104. 女, 25 岁。停经 19 周。剧烈腹痛、发热 1 天, 无阴道流血。血常规: $\text{WBC} 14\times 10^9/\text{L}$, $\text{N} 0.76$ 。B 超提示单胎妊娠合并子宫肌壁间肌瘤, 直径 10cm 。最可能的诊断是子宫肌瘤合并

- A. 囊性变
- B. 感染
- C. 肉瘤变
- D. 玻璃样变
- E. 红色样变

105. 健康婴儿, 前囟约 1.5cm , 未出牙, 身高 60cm , 体重 6kg , 能笑出声, 不能辨认熟人和陌生人, 不能独坐。最可能的月龄是

- A. 8 个月
- B. 6 个月
- C. 2 个月
- D. 4 个月
- E. 10 个月

106. 女, 30 岁。出现阴道分泌物增多, 伴有鱼腥味, 性生活后加重。妇科检查: 外阴阴道

附于阴道壁。该患者诊断应考虑为

- A. 滴虫阴道炎
- B. 外阴阴道假丝酵母菌病
- C. 急性淋病
- D. 萎缩性阴道炎
- E. 细菌性阴道病

107. 男, 20 岁。右大腿前皮肤烧伤 3 小时。面积约为 8%, 布满数个大水疱, 创面湿润, 痛觉明显。其创面处理应是

- A. 苯扎溴铵消毒烧伤处, 包扎
- B. 烧伤处涂碘酒, 覆盖敷料
- C. 将水疱消毒后穿刺抽液, 定时换药
- D. 消毒后将水疱全部剪除, 包扎
- E. 暴露伤口, 观察

108. 女, 35 岁。因误服有机磷农药半小时, 意识障碍逐渐加重入院。经洗胃、导泻、应用阿托品、氯解磷定, 对症支持等治疗后意识恢复, 症状好转。3 天后患者突然出现视物模糊、面瘫、呼吸困难, 并再次出现意识障碍, 大小便失禁。查体: T36.7°C, P65 次/分, R15 次/分, BP135/75mmHg, 肌力 3 级, SpO₂93%。目前出现的情况最可能的原因是

- A. 有机磷中毒加重
- B. 急性有机磷中毒迟发型脑病
- C. 中间型综合征
- D. 急性脑卒中
- E. 急性有机磷中毒迟发型多发性神经病变

109. 男, 70 岁。晨起时出现说话不流利, 只能讲一两个简单的字, 但能理解别人言语, 也能理解书写的东西, 读出来有困难。既往有高

血压、高脂血症病史。查体: 言语不利, 四肢肌力正常。病变部位应在优势半球

- A. 缘上回
- B. 顶叶角回
- C. 颞上回后部
- D. 额下回后部
- E. 颞中回后部

110. 男, 40 岁。从 3 米高处坠落后短暂昏迷 20 分钟。查体: P70 次/分, BP125/70mmHg。神志清楚, 左眶青紫, 左鼻孔流出血性液体, 神经系统无明显阳性体征。头颅 CT 发现少量颅内积气。应采取的处理措施是

- A. 填塞鼻腔压迫止血
- B. 应用抗生素预防性治疗
- C. 冲洗鼻腔
- D. 开颅手术止血
- E. 腰穿释放血性脑脊液

111. 男, 27 岁。病程 5 年, 性格孤僻, 不上班, 将自己的东西都卖掉, 流浪街头, 睡门洞, 在饭店讨饭吃, 时有自言自语, 经常呼唤着因病过世的母亲的名字。精神检查: 意识清, 衣着不整, 表情淡漠, 对人冷淡, 常对人冷笑, 孤僻离群, 时有奇怪想法, 如“不能利用出现的一种倾向掩盖另一种倾向”。躯体及神经系统检查无异常。对该患者的诊断是

- A. 分裂性人格
- B. 精神分裂症
- C. 抑郁症
- D. 精神发育迟滞
- E. 脑器质性精神障碍



A3/A4 型选择题 (112~129 题)

答题说明

以下提供若干个案例，每个案例有若干个考题。请根据提供的信息，在每题的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(112~114 题共用题干)

女婴，10个月。腹泻伴呕吐5日。大便10余次/日，呈蛋花汤样，呕吐2~3次/日，尿量减少。查体：体重8kg，眼窝凹陷，皮肤弹性差，四肢尚暖。实验室检查：钠125mmol/L，粪便镜检WBC0~2个/HP。

112. 患儿可能的诊断是

- A. 轮状病毒肠炎
- B. 金黄色葡萄球菌肠炎
- C. 空肠弯曲菌肠炎
- D. 抗生素相关性腹泻
- E. 真菌性肠炎

113. 该患儿腹泻脱水的程度与性质是

- A. 重度低渗性脱水
- B. 中度等渗性脱水
- C. 中度低渗性脱水
- D. 轻度低渗性脱水
- E. 轻度等渗性脱水

114. 第一天补液所采用的液体种类是

- A. 1/4 含钠液
- B. 1/3 含钠液
- C. 1/2 含钠液
- D. 2/3 含钠液
- E. 等张含钠液

(115~117 题共用题干)

女，30岁。月经增多、经期延长1年余。

异常，宫颈散在囊肿，子宫近11周妊娠大小，表面有多个质硬突起，最大直径约6cm，附件未触异常。实验室检查：Hb90g/L。

115. 首先考虑的诊断

- A. 子宫内膜癌
- B. 宫颈癌
- C. 子宫畸形
- D. 子宫肌瘤
- E. 子宫腺肌病

116. 最恰当的处理为

- A. 筋膜内子宫切除术
- B. 筋膜外子宫切除术
- C. 子宫肌瘤切除术
- D. 阴道上子宫切除术
- E. 改良根治性子宫切除术

117. 术后合理的处理为

- A. GnRHa 治疗半年
- B. 米非司酮治疗半年
- C. 达那唑治疗半年
- D. 孕激素治疗半年
- E. 随访观察

(118~120 题共用题干)

男孩，1岁3个月。面色苍黄2个月。原可独走，现站立不稳。生后母乳喂养，未添加辅食。查体：表情呆滞，四肢抖动，舌苔薄，呈地图状。血常规：Hb 88g/L，RBC $2.1 \times 10^{12}/L$ 。

118. 最可能的诊断是

- A. 营养性巨幼细胞性贫血
- B. 脑性瘫痪
- C. 苯丙酮尿症
- D. 缺铁性贫血
- E. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症

119. 为明确诊断, 首选的检查是

- A. 头颅 CT
- B. 血清叶酸、维生素 B₁₂ 测定
- C. 血苯丙氨酸测定
- D. 血清铁蛋白测定
- E. 血清钙、磷、碱性磷酸酶测定

120. 最适当的治疗是

- A. 低苯丙氨酸饮食
- B. 肌注维生素 B₁₂
- C. 口服铁剂
- D. 康复治疗
- E. 肌注维生素 D

(121~122 题共用题干)

男, 17 岁, 高中生。怕出门, 不愿见人, 不去上课, 纠缠父母出钱给自己做美容手术半年。原因是半年来反复照镜子发现自己的鼻子比以前变大了, 难看了。说班上的同学都讥笑他, 出门就感觉别人在说他, 别人的眼光看他时很特别, 能使他头痛。父母不愿出钱就说父母不关心他, 父母不是亲生的, 曾说要去亲子鉴定。

121. 如给予药物治疗, 下列不属于抗精神分裂症药的是

- A. 氟哌啶醇
- B. 三氟拉嗪
- C. 氟西汀
- D. 氯氮平
- E. 氟奋乃静

122. 该患者不存在的精神症状是

- A. 关系妄想
- B. 物理影响妄想
- C. 非血统妄想
- D. 被控制妄想
- E. 非幻觉性知觉障碍

(123~124 题共用题干)

女, 65 岁。劳累后心绞痛病史 2 年, 近 1 周胸痛发作频繁。2 时前因情绪激动再次发作, 疼痛较前加剧, 含服硝酸甘油不缓解, 伴恶心。糖尿病病史 8 年。心电图: U、III、aVF 导联 ST 段弓背向上抬高伴 T 波倒置。

123. 最有助于明确诊断的实验室检查是

- A. 尿淀粉酶
- B. 尿酮体
- C. 血肌酸激酶
- D. 血肌钙蛋白
- E. 血淀粉酶

124. 患者就诊过程中出现头晕、黑矇, BP 70/60mmHg, 心率 35 次/分。给予阿托品治疗后症状无改善。需立即给予的治疗措施是

- A. 营养心肌治疗
- B. 植入临时心脏起搏器
- C. 抗凝治疗
- D. 植入永久心脏起搏器
- E. 硝酸酯类药物

(125~126 题共用题干)

女, 25 岁。发热伴下肢和腹部皮肤瘀斑 5 天, 查体: 双下肢和腹部皮肤有多处瘀斑, 双侧颈部、腋窝和腹股沟可触及淋巴结肿大, 活动无压痛, 最大者为 2cm×2.5cm; 胸骨压痛(+), 腹软, 肝肋下 1.5cm, 脾肋下 2cm。化验: Hb78g/L, WBC18×10⁹/L, 分类可见原始细胞

125. 为明确诊断, 首选的检查是

- A. 骨髓细胞学检查
- B. 淋巴结活检
- C. 骨髓活检
- D. 腹部 B 超
- E. ANA 谱

126. 明确诊断后, 首选的治疗措施是

- A. ABVD 方案化疗
- B. VDLP 方案化疗
- C. 给予大剂量糖皮质激素
- D. DA 方案化疗
- E. CHOP 方案化疗

(127~129 题共用题干)

男, 35 岁。腰痛伴右侧下肢放射性痛 3 个月, 无明显发热、盗汗。查体: 右侧直腿抬高试验阳性, 小腿前外侧和足底感觉减退, 背伸肌力减退。

127. 最可能的诊断是

- A. 腰椎间盘突出症
- B. 腰肌劳损
- C. 腰椎肿瘤
- D. 腰椎结核
- E. 强直性脊柱炎

128. 最可能的病变部位是

- A. L₂~3
- B. L₃~4
- C. L₁~2
- D. L₄~5
- E. L₅~S₁

129. 最适合的治疗方法是

- A. 联合应用抗生素
- B. 卧床休息, 牵引理疗
- C. 抗结核药物治疗
- D. 单纯椎板减压手术
- E. 髓核摘除术

B1 型选择题 (130~150 题)

答题说明

以下提供若干组考题, 每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(130~132 题共用备选答案)

- A. 单侧眼睑下垂
- B. 单侧额纹消失
- C. 单侧鼻唇沟浅
- D. 单侧舌肌萎缩
- E. 单侧角膜反射消失

130. 单侧三叉神经损害可出现的表现是

132. 单侧舌下神经损害可出现的表现是

(133~134 题共用备选答案)

- A. 噻唑烷二酮类
- B. 格列奈类
- C. α -葡萄糖苷酶抑制剂
- D. 磺脲类

133. 容易引起严重低血糖的药物是
134. 少肝脏葡萄糖输出的药物是

(135~136 题共用备选答案)

- A. 切口分类及愈合记录为“Ⅰ/甲”
B. 切口分类及愈合记录为“Ⅲ/丙”
C. 切口分类及愈合记录为“Ⅱ/甲”
D. 切口分类及愈合记录为“Ⅱ/乙”
E. 切口分类及愈合记录为“Ⅳ/甲”
135. 腹股沟疝修补术, 切口愈合良好
136. 右胫腓骨开放骨折, 清创内固定后切口愈合良好

(137~138 题共用备选答案)

- A. 中上腹痛、体重下降、贫血
B. 上腹痛、饥饿及夜间进食后缓解
C. 上腹痛、呕逆
D. 反酸、烧心、胸骨后疼痛
E. 右上腹痛、黄疸、贫血
137. 十二指肠溃疡的典型临床表现
138. 胃食管反流病的典型临床表现

(139~140 题共用备选答案)

- A. 夜间胰岛素作用不足
B. 夜间曾发生过低血糖
C. 夜间胰岛素作用过多
D. 晨胰岛素分泌过多
E. 清晨皮质醇等胰岛素对抗激素分泌增多所致
139. Somogyi 效应原因是
140. 黎明现象的原因是

(141~142 题共用备选答案)

- A. NK 细胞
B. B 细胞
C. 肥大细胞

- E. 浆细胞
141. 呈递抗原的是
142. 分泌抗体的是

(143~145 题共用备选答案)

- A. 化妆品引起的接触性皮炎
B. 青霉素引起的过敏性休克
C. 输血反应引起的红细胞破坏
D. 花粉引起的支气管哮喘
E. 注射异种动物血清引起的血清病
143. 属于Ⅳ型超敏反应的是
144. 属于Ⅱ型超敏反应的是
145. 属于Ⅲ型超敏反应的是

(146~148 题共用备选答案)

- A. 肾小球微小病变
B. 系膜增生性 IgA 肾病
C. 膜性肾病
D. 毛细血管内增生性肾小球肾炎
E. 系膜毛细血管性肾小球肾炎
146. 男性, 32 岁, 上呼吸道感染 2 天后出现肉眼血尿, 血压正常, 尿常规蛋白阳性, 尿红细胞满视野, 24 小时尿蛋白定量 3.8g, 血浆白蛋白 29g/L, 血肌酐 110 μ mol/L
147. 男性, 9 岁, 眼睑及双下肢水肿 3 天, 血压正常, 尿常规蛋白阳性, 无尿红细胞, 24 小时尿蛋白定量 5.4g, 血浆白蛋白 27g/L, 血肌酐 95 μ mol/L
148. 男性, 29 岁, 双下肢水肿、间断性肉眼血尿 3 个月, 血压增高, 血红蛋白 89g/L, 尿常规蛋白阳性, 尿红细胞满视野, 24 小时尿蛋白定量 4.1g, 血浆白蛋白 26g/L, 血肌酐 264 μ mol/L, 血补体 C3 降低

(149~150 题共用备选答案)

- A. 乙肝疫苗第三针
B. 百白破混合制剂第二针

D. 麻疹疫苗第一针

E. 脊髓灰质炎糖丸第一次

149. 4 个月婴儿，应接种

150. 6 个月儿童，应接种

